the patronage of the Government of Bengal, and dedicated, by permission, to the Governor General of India.

NCYCLOPÆDIA BENGALENSIS,

Or a series of publications in English and Bengali,

Compiled from various sources,

DN HISTORY, SCIENCE, AND LITERATURE,

EDITED

BY THE REV. '. M. BANERJEA.

The following are some of the subjects which the teries will embrace,—viz.

NCIENT HISTORY;—Egypt, Babylon, Greece, Rome,

MANNERS, CUSTOMS, OPINIONS, &c. of the Egypns, the Babylonians, the Persians, the Greeks, the other Asiatic nations.

Modern History;—Of Europe, England, India, Bengal, America; &c.

Science;—Geography, Mathematics, Natural Philosophy, Astronomy, Metaphysics, Moral Philosophy, &c.

BIOGRAPHY; —Of eminent men,—Politicians, scholars, &c.—European and Asiatic, ancient and modern, more after the simple form of Cornelius Nepos than of the elaborate one of Plutarch.

MISCELLANEOUS READINGS;—Containing detached access of various kinds, adapted to the comprehension

of the natives of Bengal. Anecdotes, orations, speca accounts of travels and voyages may be embodied these.

- 1. The volumes of this Encyclopædia are not to be necessaly inseparable from one another, except when they are parts one and the same work.
- 2. They are generally not to consist of more than 300 pag or less than 100 pages each.
- 3. The editor cannot determine at present how many numl are to be published yearly; the publishers cannot, therefore, precisely what the annual cost of the series will be to subst bers. The value of the numbers annually published will perha average from 10 to 15 Rs.
- 4. To subscribers advancing 12 Rs. (which may be estimate as the average amount of subscription per annum) a discount 20 per cent. will be allowed. Accounts will be rendered annually of the advances received and the books supplied.
- 5. To charitable and benevolent institutions subscribing for large number of copies a discount of 20 per cent. will be allow
- 6. Besides the Diglot edition in English and Bengali, other edition will be printed only in Bengali.

PRICE.

Of Numbers containing 100 pages,	Rs.	1	per	copy.	
Of Numbers containing 150 pages,		1	4	"	
'Numbers containing 200 pages,		2	0	>)	
Of Numbers containing 300 pages,		2	8	"	
The Numbers will be neatly printed	on	fine	E	nglish	pa.
and bound in English Calico :—size, der	ny l	2mo			

ALREADY PUBLISHED.

No. I. Hist. of	Rome part I.	(Diglot	Edition.)	•
,,	"	(Bengali	Edition.)	4
"	"	Ditto to	native students	0
No. II. Geomet	ry part I.	(Diglot	Edition.)	2
2)	7 2	(Bengali	Edition.)	Jį'
"	,, •		native students	

No. II.

to the Government of Benzal, and dedicated, by permission,

NCYCLOPÆDIA BENGALENSIS,

Or a series of publications in English and Bengali,

COMPILED FROM VARIOUS SOURCES,

IN HISTORY, SCIENCE, AND LITERATURE,

EDITED

BY THE REV. K. M. BANERJEA.

" ψυγης ιατρειον"

Dead. Sec. 1 19.

Mathematics.

GEOMETRY.

PART I.

CALCUTTA:

OSTELL AND LEPAGE, AND P. S. D'ROZARIO AND CO.

1846.

বিদ্যাকলুক্রম

অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা।

শ্রী কৃষ্ণনোহন বন্দ্যোপাধ্যায়দারা সংগৃহীত।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

ক্ষেত্ৰ তত্ত্ব

১ খণ্ড

ইউক্লিডের প্রথম তিন অধ্যায়। জান প্লেফেয়রের ব্যাখ্যাত্মসারে ও উলিএম ওয়ালেসের অতিরিক্ত লিখনাত্মসারে অস্কুবাদিত।

কলিকাতা লালদীঘির নিকট রোজারিও সাহেবের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইং ১৮৪৬ শক ১৭ ৩৮

TO THE HON'BLE C. H. CAMERON,

President of the Council of Education.

Hon'ble Sir,

The criticisms which have appeared in the Newspapers on the first Number of the Encyclopædia Bengalensis, present a few questions for consideration, on which I beg leave to solicit your advice and direction. It is your known interest in the cause which the Encyclopædia is intended to subserve that emboldens me thus to presume upon your kindness and trespass upon your time. I need not here repeat how anxious I feel to conduct the Encyclopædia as efficiently as circumstances will possibly allow; and I am the more solicitous for the favour of your opinion inasmuch as it must, on the one hand, rectify whatever may have been amiss in the execution of my plan, and be calculated to remove, on the other hand, whatever misapprehensions may have existed in any quarter.

The questions that have arisen are first, with reference to the general plan of the undertaking; second, with reference to the mode of conducting it.

Ist.—In order to produce a series of works adapted to the present state of the Hindu mind, and with the special object of drawing the attention of the Native community to the history and science of Europe, my proposal has been, as you are aware, to draw as largely and as freely, as may appear requisite, from all sources that may be deemed suitable,—only consistently with the acknowledged rules of literary courtesy, and with justice to the authors whose works may be handled. I set out with the History of Rome, partly because it was the history of a nation from whom

the materials of European civilization were more immediately derived, partly because this history was entirely unknown to vernacular readers. I adopted Eutropius as my text, because it was a good compendium of this history, as authentic as any school-book now in use, and capable of being dilated or contracted at pleasure without injustice to the author, who has not inserted in his narrative anvthing that might be called characteristic of himself. If I introduced additional matter from other sources, it was to render the history the more interesting; and by proclaiming this act in the title page, I thought I guarded sufficiently against any mistake on the part of the reader, who might easily conclude from thence that my object was to represent the history and not the historian. To represent the historian, i. e. to exhibit the mode in which a writer constructs his narrative, might be premature so far as Bengali readers are concerned. Where the history is already known, the reader may dwell with great interest on the peculiar modes in which certain master minds have delivered it; but where the history itself is unknown, such philosophical discrimination could hardly be expected When a new story is related to us, we desire first of all to make ourselves masters of the narrative itself; -we begin afterwards to discriminate between the different ways in which different persons relate it. In the infancy of a literature, a digest of various testimonies may answer a great object by giving a general view of certain historical facts. The facts being once understood, the reader may be enabled afterwards to consider the strength or weakness of the several witnesses supporting them. It was under impressions of this kind that I got up the first number. If my views were wrong, I would thankfully receive correction.

2nd.—My Encyclopædia is, as you are aware, intended especially for Bengali readers, and therefore my attention is first and principally directed to the Bengali. However important the object which the English is intended to subserve may be, it is subordinate to the Bengali. The Diglot edition is indeed designed to promote the study of both. English and Bengali,—to accelerate the progress of the Native mind in the two careers (as you called them in your address to students) now open to Indian scholars in the province of Bengal. Still the Bengali is in my work the more important of the two. (a)

My effort has been and shall continue to be, to present the history and science of Europe in as attractive and simple a dress as the subjects and the state of the Bengali language will allow. With this view it has been my practice to hear portions of my MSS, read by Pundits and other Vernacular scholars,—to note the passages where they might happen to stumble in the course of an un-premeditated reading,—to introduce improvements where the passages required to be amended,—to ask the opinion of learned scholars where difficulties presented themselves, and in these ways to render the work as elegant and perspicuous as circumstances would allow. The introductory essay on the study of history, (b) and the History of Rome, in the

⁽a) I must here apologize for a few erroneous expressions in English which crept into the text; and I have to thank the editor of the *Hurkarn* for the mistake pointed out. The mistake did not however occur in the Bengah text.

⁽b) This essay I had delivered, before it was printed; as a discourse, at a meeting of intelligent and respectable Hindu gentlemen. The following speech by the president has been forwarded to me as an authenticated extract from the records of their Society:—

[&]quot;The Reva, K. M. Bancrjea read a Bengali Paper on the study of History.

[&]quot;Baboo Kissory Chand Mittra then rose and said that he was sure be expressed the sentiments of the whole meeting when he declared that the

first number I had tested in these several ways, and may perhaps state, without the guilt of presumption, that the experiments proved all very favorable.

paper just read by his Revd. and respected friend was a very interesting and valuable one; the subject was handled very ably, and the principles of historic evidence analysed in a manner that could not fail to come home to "the business and bosoms" of those who, he hoped and trusted, were soon to receive, through the liberality of Government, a sound and useful education through the medium of their vernacular language. He could not but admire the Bengali of the paper. It was not only chaste and devoid of oriental flourish, but as elegant and classical as the language under the present circumstances could be rendered. He (Baboo Kissory Chand) looked forward to the publication of such essays (as the one just read) as a new era in the history of the Bengali language, the improvement and cultivation of which was intimately connected with the regeneration of his fatherland That the language was imperfect, was no reason why it should not be cultivated and improved. True, that it was destitute of a healthy literature. True, that it was madequate to the expression of subtle metaphysical distinctions. True, that it wanted a scientific nomenclature. But its deficiencies ought to operate as so many fresh * arguments for its improvement with those who are interested in the wellbeing of their country, as the vernacularization of European literature and science was a consummation devoutly to be wished. He would therefore conclude by saying that his Revd triend, by his exertions in furtherance of this good work, has entitled himself not only to the thanks of the society but to the gratitude of his countrymen."

> Cossinain Duet, Secy. H. F. S.

The same essay was submitted for perusal to a gentleman of the civil service, J. Muar Esq. of Azimghur, whose experience as an oriental scholar and established reputation to Sanscrit authorship render his opinion of no common value. He says:

"I like very much the substance and strain of your introductory remarks on the use and criteria of History, and think the whole is the very soil of thing calculated to be extensively useful in the present state of the native mind."

A portion of the History of Rome was shown to Capt. Marshall of the College of Fort William. His opinion is contained in the following letter:

"MY DEAR SIR, July 11th, 1845.

"I have the pleasure to return the specimen of your Translation of the History of Rome. I have suggested a few alterations which are not of much importance. I am of opinion, that the style is simple and pleasing, and well adapted for the perusal of young people. The matter is also I think well selected, and as amusing as so compendious a narrative could possibly be made. Your little work would in my opinion answer admirably for a School Class book for jumor Students.

"I remain, My dear S.r "Yours very truly, "G. MARSHALL.

[&]quot;P.S. I have made a note at the end of your MSS"

My plan in historical narratives is to adopt as simple a style as possible. Where words are required that are not in common use, I draw from the Sanserit, if that can be readily done, without having recourse to far-fetched inventions. Where an idea can be easily expressed by a Persian or Hindoostani word, already current, I make no scruple to adopt it, in case no Sanserit or Bengali word can be found equally apt for the purpose. Where Persian or Hindoostani words have been almost naturalized in Bengali, I do not fastidioasly reject them, even though there may be corresponding Bengali words with the same meaning. In such cases I use the Bengali and the Hindoostani indifferently, only taking care not to shock my readers

"The work appears to be written in very plant, and sample language, intelligible almost to every native who pretends to the least knowledge of his literature, and although not a close translation, it conveys the sense of the English very faithfully.

"I think the work tought with much benefit to the Zillah Schools be introduced in them. It will give the box's a great deal of useful information and prepare atten for subjects they will afterwards learn in English; and as there is no translation in Bengali of the History of Rome that I know of, except a part of the the Solome of Ancient History by Mr. Pearson, which has not afforded satisfaction on account of its idiomatical defects, the present work will be a desirable addition to the existing Bengali literature, especially if the forthcoming parts be written may as plain and simple a bryle as the specimen you have kindly sent me, and which I herewith return."

¹ also requested Mr Lodge, the Inspector of Government Colleges and Schools to send the work at sheets to the Schools in the Muffasil for any suggestions the pumins might have to offer. The following letter from the head master of the Walmapore School to the address of Mr. Lodge reports the result of this test.

[&]quot;With much pleasure Lacknowledge the receipt of your letter of the 2nd instant ac ompound by a few pages of the rater led Energionadia Bengalouss. I have read fine Bengalo translation of n, and made our Pundit and the ventacular school Teacher do the same; and to ascertian whether they clearly understood it, required them to explain almost every sentence, which they did very well, there is only one wird (2[55]) to which they were at a loss to attach the correct idea, and it must be acknowledged that it is sloom used to convey the meaning it is intended to represent, that of garbing, and without a circumocution there is no word in the Bengali language that can express the idea. With the exception of this single observation, which is scarcely worth mentioning, there is nothing else to be remarked on. The Pundits here speak highly of its language and consider it purely idomatical.

by disregarding their taste in this respect. The word thou sand, for instance, I have sometimes translated by hazar, sometimes by sahasra. It is, I think, an advantage where foreign words may be introduced into a language, such as the Bengali now is, consistently with perspicuity and without shocking the national feelings of the people. This is, I think, the legitimate way of enriching the vocabulary of such a language. Where a Sanscrit word, though expressing originally the idea I intend to convey, has by the lapse of ages obtained a different signification, I do not hesitate to use some popular term having the same meaning, though it may be of foreign derivation. I have for instance generally translated ship by jahaj, though this is neither Sanscrit nor Bengali; because the Sanscrit mauha, though exactly corresponding to the Latin navis, is now used in Bengali to express a boat rather than a ship.

Scientific terms I borrow from the English when the Sanscrit fails to produce any, either ready-made, or capable of being easily invented. In Geometry and Algebra, however, I have scarcely experienced any difficulty in procuring terms, since the Sanscrit vocabulary here is very The Lilavati, the Vijanita, the Goladhyaya have supplied me almost with every thing I wanted. The Rekha Ganita, or Euclid in Sanscrit, and Colebrooke's Algebra have been of great use to me in this number on Geometry. A number of terms proposed by the accomplished Bapu Deva of the Sanscrit College, Benares, and obligingly sent to me by the late principal of that institution, has also been of great service. Still however I have been obliged to transfer one or two European expressions to the Bongali. The word Rhombus, for instance, is rendered in the Sanscrit Enelid by such a cumbrous term that I thought it would be better to adopt the European expression itself, and explain it in the definition, than introduce a long unclassical Sanscrit term. (c) If ρομβος or ρεμβω conveyed any meaning that would render the idea of an equilateral parallelogram obvious, I would think of inventing a word which might have the same radical signification.

The favourable reception which the first number has obtained from the native community, may, I presume, be considered an auspicious commencement. Upwards of two hundred copies have already been disposed of, chiefly among native purchasers; and if the demand from this quarter continue as great as it has hitherto been, the first number will be out of print before the second makes its appearance. The native press has likewise pronounced a very favourable verdiet. I have not seen the criticisms of the native editors in the original, but agreeably to the accounts which the English papers have given they are encouraging to the undertaking. (d)

Under these circumstances I beg leave to solicit the favor of your advice on the subjects adverted to. The sanction of your opinion, as far as you may approve of what has

⁽c) The word for rhombus in the Sanscrit Euclid is Vishama-Kona-sama-chatni bhujiim, literally, unequal-angled-equi-quadrilateral.

⁽d) "Encyclopædix Bengalens is.—Some of our native centemporaries have reviewed the first volume, containing Roman History, and are decidedly of opinion that the publication of the work will form an wra in the history of vernacular literature. They find fault with the criticisms of the English papers, and are disposed to believe that instead of doing any good they are calculated to discourage the Revd, editor in the prosecution of his landable undertaking. They speak very highly of the Bengali of Krishna Mohan, and say that it is as cloquent and classical as the language in its present imperfect state could be rendered "—Beng, Hurkaru, Feb. 23, 1846.

I feel it right to state that a writer has since appeared in one of the native *papers enunciating the universal negative that "not a single letter in the Benuals of the work is intelligible" and then, entering into personal reflections against the author and against those who have ventured to pronounce a favourable opinion on the publication.

been done, and the benefit of your correction, where you may consider it open to censure, must be of the greatest advantage to the undertaking.

I have already, Hon'ble Sir, trespassed too long upon your time; but I cannot conclude a statement like this without appending a few remarks on the present number of the series. The perspicuity of the following Bengali version of the first three books of Euclid was, agreeably to my usual practice, tested by being submitted to the perusal of pundits, who had not studied the subject through the medium of the English. The elements of Euclid could scarcely be expected in any language to be wholly intelligible to a beginner from an unpremeditated off-hand reading; but the pundits to whom I handed over these sheets went through them so well, and followed the demonstrations so closely. step by step, that I think I can safely say the result of the test proved much more satisfactory than I could possibly have expected. The case of one of these pundits was in particular so very striking that I cannot refrain from stating it more minutely. In the correction of the proof-sheets. I had the happiness to secure the assistance of one of the passed students of the Government Sanscrit College at Calcutta, who is now attached as Bengali tutor to one of the metropolitan institutions, under the superintendence of the Council of Education. This accomplished scholar, with no other preparation than the perusal of the 1st Prop. in the Rekha Ganita, mastered the demonstrations, as he went over the proof-sheets, with a quickness that was as surprising as the evidences of his really understanding them were satisfactory. Literal errors sometimes occurred in the proof-sheets, which occasioned a discrepancy between the demonstrations and the diagrams to which they referred. These errors, though fit

FROM THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF EDUCATION

то

THE REV. K. M. BANERJEA.

Calcutta, April, 1846.

SIR,—I have received your letter of February 26, in which you solicit my advice and direction as to the future conduct of your work with reference to the criticisms which have appeared in the Newspapers.

I understand you to speak of such criticisms as have some foundation, or at least an appearance of foundation in reason. These appear to me to be reducible to three heads: viz. criticisms upon your English style, upon your mode of translating Eutropius, upon your selection of that writer's work.

They who find fault with your English style do not perhaps advert to the fact that the English in your book is quite subordinate to the Bengali. Whether it is actually a translation of the Bengali, or not, it is for the present purpose to be considered as a translation.

It cannot be fairly criticised, if it is regarded as an original and independent English work. In writing the Bengali Introductory Remarks on the study of History, which is an original and independent work, you had to consider, not in the spirit of a servile flatterer, but in the spirit of an indulgent Instructor, what might be agreeable to the taste of those whom you were addressing. In writing the English you had nothing to aim at but such a correct representation of what you had already said in Bengali, as would enable the Council of Education and such part of the British nation as take an interest in the matter, to judge of your work.

Peculiarities of expression, that is to say what would be peculiarities in an original English Book, are not therefore in my opinion blemishes in your composition. When you submitted your MS, to me for criticism, I never thought of effacing those peculiarities. If I had done so, the English would no longer have been an accurate reflection of the Bengali.

The Council of Education want to know exactly what you are saying to your countrymen. The portion of the English Public here and at home who are interested in the improvement of Bengali literature, will no doubt be desirous of learning what style of reasoning, what illustrations, what turns of thought, are considered by a Bengali scholar likely to captivate the attention and stimulate the mental activity of his race.

If you had undertaken to write an original English Book, you would, I doubt not, have endeavoured to think and to express yourself like an Englishman. But such an endeavour would have been out of place in your Encyclopædia.

It is quite true, however, that some careless expressions have escaped you in composing, and me in reading your composition.

Perhaps in the circumstances amidst which we are placed, some errors of this kind are inevitable. We must do our best to prevent them, and certainly can have no complaint to make against those who point out our failures.

The criticisms upon your plan of translating Eutropius freely and interspersing additional matter from various sources appear to me unfounded.

To translate freely and to intersperse foreign matter, while you are professing to adhere closely to your original, would be morally wrong, because it would mislcad.—But to do this, as

you have done, with distinct proclamation of your intention; can only be improper, if at all, in a literary point of view.

If you, or any one who may aspire to emulate you as an Instructor of the people of Bengal, were, in introducing Thucydides to your countrymen, to deal with him as you have dealt with Eutropius, you would be justly obnoxious to censure. But why? Because the work is a model of historical composition, and because the writer is a most trustworthy narrator of the events of his own age and country.

If you ever do publish a Bengali Thucydides, I am quite sure that you will endeavour to show him to your countrymen exactly as he is. You will never dream of altering his text. If you have any remark of your own to make upon the Peloponnesian war, or wish to draw attention to what other writers have said, you will add notes to your edition.

You would have too much reverence for so grand a work of art to think of adding a sentence to it. Such an interpolation would be as offensive as if a sculptor or painter of the present day were to add a figure to a group of Phidias or Raphael.

Neither would you think of inserting a story out of Plutarch in the midst of the testimony which the great witness of the Peloponnesian war has delivered to posterity.

So also with regard to such an author as Livy. Though he relates facts remote from his own time, and aims rather at the glorification of Roman warriors and statesmen than at truth, still if you were to translate his beautiful narrative, you would no doubt remember that the main object of your translation would be, not to exhibit the History of Rome, but the work of Livy.

But can any one think that Eutropius has any claim to this kind of consideration? A writer with no other pretension than that of having made for the use of the Emperor Valens, in a

degenerate age, a careful Epitome of Roman History from the foundation of the city?

Eutropius' book is no model which it would be a sort of sacrilege to touch. Eutropius is no authority for the facts he relates. You did not want to show the people of Bengal how he tells a story, you did not mean to call him as a witness to facts which happened hundreds of years before he was born.

What you wanted was an epitome of Roman History, and finding it done to your hand by Eutropius, you very wisely translated and added to him, instead of epitomizing Roman History yourself.

No one can be deceived as to the real nature of your work, because you have distinctly pointed it out. Whether what you have added to Eutropius was fit to be added for the instruction of your countrymen, is another question. I believe nobody has said it was not.

There yet remains a further and more important question, viz. whether the epitome of Roman History which you have published, ought to have had the first place or any place at all in your Encyclopædia.

Assuming that the epitome ought to have a place, I should say that the question whether, with reference to its intrinsic qualities, it ought to have the first place, is scarcely worth considering. My advice would have been "of those things which you intend to insert, begin with that which you can soonest get ready."

I am far too glad to see a beginning made in this new Bengali literature to care whether, in a work intended to be miscellaneous, the first article can be proved to have irresistible intrinsic claims to the particular position which it occupies.

But ought such an epitome of Roman History to have any place at all in your Encyclopædia?

I think that it ought: I believe that the History of Rome is a most important study for your countrymen, for the reason which you have assigned in the letter you have addressed to me, and also for another reason of more special application to British India, on which want of time and space prevents me from entering at present. I believe that those who are beginning the study of any history (whether nations or individuals) should not be at once introduced to elaborate, detailed, and critical works, and I believe also that only in works of that kind can an account of the labours of such critics as the great Niebuhr, by which men's faith in much of Roman History has been shaken, be properly introduced.

Upon this subject I can refer you to something much more satisfactory and conclusive than any reasoning of my own; I mean the opinion, and the grounds on which it rests, of the late Dr. Arnold, himself a profound historian, a devoted admirer and follower of Niebuhr, and one of the most successful instructors of youth:—

"Now it is not so much our object," he says, "to give boys useful information, as to facilitate their gaining it hereafter for themselves, and to enable them to turn it to account when gained. The first is to be effected by supplying them on any subject with a skeleton which they may fill up hereafter. For instance, a real knowledge of history in after life is highly desirable, let us see how education can best facilitate the gaining of it. It should begin by impressing on a boy's mind the names of the greatest men of different periods, and by giving him a notion of their order in point of time and the part of the earth on which they lived. This is best done by a set of pictures bound up together in a volume, such, for

instance as those which illustrated Mrs. Trimmer's little histories, and to which the author of this article is glad to acknowledge his own early obligations. Nor could better service be rendered to the cause of historical instruction than by publishing a volume of prints of universal history, accompanied by a very short description of each. Correctness of costume in such prints, or good taste in the drawing, however desirable, if they can be easily obtained, are of very subordinate importance; the great matter is that the print should be striking, and full enough to excite and to gratify curiosity. By these means, a lasting association is obtained with the greatest names of history, and the most remarkable actions of their lives, while their chronological arrangement is learnt at the same time from the order of the pictures; a boy's memory being very apt to recollect the place which a favorite print holds in a volume, whether it comes towards the beginning, middle, or end, what picture comes before it, and what follows it. Such pictures should contain as much as possible the poetry of history; the most striking characters, and most heroic actions, whether of doing or of suffering; but they should not embarrass themselves with its philosophy, with the causes of revolutions, the progress of society, or the merits of great political questions. Their use is of another kind; to make some great name, and great action of every period familiar to the mind; that so in taking up any more detailed history or biography, (and education should never forget the importance of preparing a boy to derive be. nefit from his accidental reading) he may have some association with the subject of it, and may not feel himself to be on ground wholly unknown to him."

Now the Epitome of Eutropius contains just such short descriptions as would be fit to accompany the historical

prints which Dr. Arnold recommends. The descriptions with the prints would be the best thing. But you have not got the prints; and the descriptions without them are the next best thing. We have very good evidence I think that this was Dr. Arnold's own view of the matter; for the passage I have been quoting is to be found in an article which he contributed to the Quarterly Journal of Education; that article begins with an account of Rugby School, over which he presided with so much credit and success; and if you look in that account for the method in which Roman History was studied by Dr. Arnold's Pupils at Rugby, you will find that he made them begin, as you are making your countrymen begin, with Eutropius.

I dare say nobody ever thought of blaming Dr. Arnold for this. But your enterprize, on account of its novelty, its boldness, and its magnitude, naturally and not unreasonably invites criticism. And therefore it has been objected to you that the early part of what you have given as Roman history, though handed down to us by antiquity, has been proved untrustworthy by modern researches and modern criticisms.

But I think you were right nevertheless to exhibit in the first instance to the nation you have undertaken to instruct, (as Dr. Arnold, we have seen, exhibited to his scholars) the History of Rome as it was transmitted to posterity by the Romans themselves.

For such researches and criticisms as those of Niebuhr would be wholly out of place in a work intended for the purposes described in the above extract from Arnold, much more out of place even than "the philosophy," "the causes of revolutions, the progress of society," "and the merits of great political questions," with which he justly says such a work ought not to be embarrassed.

Those narratives which the Roman people received and transmitted to us as the history of their ancestors, cannot now be cast aside as so much useless trash. They are not to be treated as mere fraudulent inventions.

A fabricated story of the sinking of the French man-of-war Vengeur found its way not long ago into history, and kept its place there for some years. Very lately the true story came to light. I have not the means of referring to Mr. Carlyle's account of the way in which the truth was discovered; but, if I recollect rightly, the French Government most readily and courteously afforded access to its official records; and if I am not mistaken in this, it may be worth your while to look for the account, and to give this part of it as a striking proof of the sincere desire for historic truth which animates the Governments of Europe, and which is a characteristic mark of high civilization. No honest and intelligent man would now think of repeating the fabricated story, or if he did repeat it for some special purpose, would take care to point out the fraud to his readers.

But the early History of Rome ought not to be classed with such a fabrication as this. The fact that during long ages it was received by the people of Rome as the genuine history of their progenitors, that it was no tissue of falsehoods woven by deceifful men with a view to impose upon the credulous, ought to secure it from such an association. I do not think we are less called upon to read it now than before Niebuhr wrote. Niebuhr himself never intended that it should be blotted out, nor that it should be held up to scorn as a mere fraudulent invention. I could prove this by numerous passages in his great work; I will quote one, which sufficiently evinces what he thought of those ancient accounts and which will at the same time demonstrate how vain an attempt it would be to give his opinion a place in your Epitome.

After relating the first part of the story of Romulus and Remus, the great historical critic thus muses upon his subject.

"This is the old tale, such as it was written by Fabius, and sung in ancient sacred lavs down to the time of Dionvsius. It certainly belongs to anything rather than history; its essence is the marvellous; we may strip this of its peculiarities, and pare away and alter, until it is reduced to a possible every day incident; but we ought to be firmly convinced, that the caput mortuum which will remain, will be anything but a historical fact. Mythological tales of this sort are misty shapes, often no more than a fata morgana, the prototype of which is invisible, the law of its refraction unknown; and even were it not so, still it would surpass any powers of reflexion, to proceed so subtly and skilfully, as to divine the unknown prototype from these strangely blended forms. But such magical shapes are different from mere dreams, and are not without a hidden foundation of real truth. The name of dreams belongs only to the fictions imagined by the later Greeks, after the tradition had become extinct, and when individuals were indulging a wanton license in altering the old legends; not considering that their diversity and multiplicity had been the work of the whole people, and was not a matter for individual caprice to meddle with." Niebuhr's History of Rome. Translation of Hare and Thirlwall. I. 219.

This extract, I say, from Niebuhr's stupendous work, not only serves to show the value he set upon early Roman history; but also proves decisively how utterly unfitted his speculations, or even their results, are, to be communicated to beginners in history.

· If it should be said that, although such a passage as this is unfitted for that purpose, an explanation of it might be

given instead of the passage itself; the answer is, that any explanation, which should make such a passage as this intelligible to an uninstructed mind (be it the mind of a person or of a people) would be nothing less than a course of lectures on Mythical and Historical narration and their mutual relations.

Before I close this letter it will be proper to advert to the method which Dr. Arnold has pursued in his History of Rome in consequence of the labours of Niebuhr.

In the preface to that work he says -

"The form and style in which I have given the legends and stories of the first three centuries of Rome may require some explanation; I wished to give these legends at once with the best effect, and at the same time with a perpetual mark, not to be mistaken by the most careless reader, that they were legends and not history. There seemed a reason, therefore, for adopting a more antiquated style, which otherwise of course would be justly liable to the charge of affectation."—Arnold's History of Rome, Preface, 10.

It is obvious that this plan of distinguishing the early from the later and more authentic portions of history by differences of style, could not be adopted in an Epitome, because such a work affords no room for exhibition of style; and it could not be attempted in a Bengali work, because the existing literature of that language does not supply the various models of which such an attempt pre-supposes the existence.

I think, then, you may rest in the assurance that you have done wisely in translating into Bengali the common story of the early ages of Rome, without attempting for the present to explain what relation this story bears to an authentic narration of real facts.

· The time will come, I hope, but we must not expect it to come very quickly, when you, or those who tread in your footsteps, may show Niebuhr himself to Bengali eyes capable of looking at him not with blank astonishment, but with intelligent admiration.

I am, Sir,

With much esteem,
Your obedient Servant,
C. II, CAMERON.



_ Though the ancient Hindus had, to a great extent, cultivated the sciences of Algebra and Geometry, and though the elements of Euclid themselves were translated into Sanscrit in the days of Rajah Jayasingha, the subjects may now be said to be entirely new to the natives of Bengal, except where they have studied them in English. The following extract from Lord Brougham's essay on the objects, advantages, and pleasures of science may therefore be an appropriate introduction to a branch of knowledge of which the Bengalee reader has no conception. explanation of the signs of Algebraic notation, taken from the introductory part of Whewell's Mechanical Euclid, is intended to enable the reader to understand the summary given at the end of each proposition in Algebraic characters. The summary it is thought will help to impress the truths demonstrated the more strongly upon the learner's mind, and to show the relation between Algebra and Geometry.

OBJECTS, ADVANTAGES, AND PLEASURES OF SCIENCE.

INTRODUCTION.

In order fully to understand the advantages and the pleasures which are derived from an acquaintance with any Science, it is necessary to become acquainted with that Science; and it would therefore be impossible to convey a complete knowledge of the benefits conferred by a study of the various Sciences which have hitherto been cultivated by philosophers, without teaching all the branches of them. But a very distinct idea may be given of those benefits, by explaining the nature and objects of the different Sciences: it may be shown, by examples, how much use and gratification there is in learning a part of any one branch of knowledge; and it may thence be inferred, how great reason there is to learn the whole.

It may easily be demonstrated, that there is an advantage in learning, both for the usefulness and the pleasure of it. There is something positively agreeable to all men, to all at least whose nature is not most grovelling and base, in gaining knowledge for its own sake. When you see anything for the first time, you at once derive some gratification from the sight being new; your attention is awakened, and you desire to

পদার্থ বিদ্যার প্রয়োজন, ফল, এবং আংমাদি

কোন পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা করিলে যে উপকার ও আমোদ জন্মে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে ঐ বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, কিন্তু পণ্ডিতেরা যে ২ বিবিধ বিদ্যার অন্তুশীলন করিয়াছেন তাহার সমস্ত শাখায় উপদেশ না দিলে যদিও সাধারণ পাঠকের নিকটে বাছল্যরূপে উপকার বিস্তার করা অসাধ্য তথাপি ঐ বিবিধ বিদ্যার বিষয় ও তাৎপর্য্য বর্ণনা করিলে ফলের অন্তুভব যংকিঞ্জিৎ স্পন্ট হইতে পারে—কতিপয় উদাহরণ দেখাইলে বোধগম্য হইবে যে বিদ্যার কোন বিশেষ শাখাতে নিপুণ হইলে কেমত উপকার ও আহ্লাদ জন্মে এবং সমস্ত শাখায় পরিপক্ হওয়া যে যুক্তিনিদ্ধ তাহা ছই এক বিশেষ শাখার ফল দর্শনে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বিদ্যা যে হিতকারিণী তাহা বিদ্যাধ্যয়নের উপকার ও আমোদ উভয়ের বিবেচনা দ্বারা সহজে উপপন্ন হইতে পারে—কেবল জানার্থে বিদ্যোপার্জনে প্রবৃত্ত সকল লোকেরই বাস্তবিক কিঞ্চিৎ হর্ষ জন্মিয়া থাকে যাহার মনে তাহা না জন্মে তাহার স্বভাব অতি অধন ও নীচ। যথন কোন বস্তুতে প্রথমতঃ দৃষ্টি পাত হয় তথন সূতনত্ব হেতুক সে দর্শনে তৎক্ষণাৎ অবশ্য কিঞ্চিৎ স্থামূভব আইসে পরে মনঃসংযোগ হইলে তদ্বিয়ে আরো অধিক জ্ঞানের আকাজ্জা হয়, যদি ঐ বস্তুতে কিছু বিশেষ শিল্প শক্তি থাকে অর্থাৎ যদি তাহা কোন প্রকার যন্ত্র কিয়া কল হয় তবে তাহা কিরূপে নির্মাণ হইয়াছে কি প্রকারে

know more about it. If it is a piece of workmanship, as an instrument, a machine of any kind, you wish to know how it is made—how it works—and what use it is of. If it is an animal, you desire to know where it comes fromhow it lives-what are its dispositions, and, generally, its nature and habits. You feel this desire, too, without at all considering that the machine or the animal may ever be of the least use to yourself practically; for, in all probability, you may never see them again. you have a curiosity to learn all about them, because they are new and unknown. You accordingly make inquiries; you feel a gratification in getting answers to your questions, that is, in receiving information, and in knowing more, -in being better informed than you were before. If you happen again to see the same instrument or animal, you find it agreeable to recollect having seen it formerly, and to think that you know something about it. If you see another instrument or animal, in some respects like, but differing in other particulars, you find it pleasing to compare them together, and to note in what they agree, and in what they Now, all this kind of gratification is of a pure and disinterested nature, and has no reference to any of the common purposes of life; yet it is a pleasure—an enjoyment. You are nothing the richer for it; you do not gratify your palate or any other bodily appetite; and yet it is so pleasing, that you would give something out of your pocket to obtain it, and would forego some bodily enjoyment for its sake. The pleasure derived from Science is exactly of the like nature,

চলে ও কি প্রয়োজন এ সমস্ত জানিবার ইচ্ছা জন্মে, অথবা উক্ত বস্তু যদি কোন জন্তু হয় তবে কোন্ দেশে তাহার উৎপত্তি কেমত স্বভাব কেমত রীতি কেমত সংস্কার কিরূপেই বা প্রাণ ধারণ করে এ সকল অবগত হওনের বাঞ্চা জন্মে—তখন আপনাদের কোন উপকারের উদ্দেশে এই২ বৃত্তান্ত জানিবার ইচ্ছা হয় এমত নহে কেননা ঐ প্রকার বস্তু কিম্বা জন্তু পুনর্কার দৃষ্টি গোচর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই কেবল সূতন ও অপরিচিত এই বলিয়াই উহার সমস্ত বৃক্তান্ত অবগত হইতে বাসনা হয়—এই রূপে সকল বিষয়ের অন্তুসন্ধানে প্রবৃত্তি জম্মে —আর যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার উত্তর পাইলে অর্থাৎ তদিষয়ের অবগতিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে সন্তুটি হয়, যদি পুনশ্চ ঐ যন্ত্র কিষা জন্তু দৃষ্টি গোচর হয়, তবে পূর্ব্বে এক বার চাক্ষ প্রতাক হইয়াছিল তাহা স্মরণে আমোদ জন্মে— তদ্বিয়ে কিঞ্চিং অনুসন্ধান হইয়াছে এজন্য স্থুখবোধ হয়, আর যদি এমত কোন যন্ত্র কিম্বা জন্তু দৃষ্টি গোচর হয় যাহা কোন২ বিষয়ে প্রথম বস্তুর সমান কোন২ বিষয়ে প্রথম হইতে ভিন্ন তবে দুএর তুলনাতে মনের আহ্রাদ হয়—তাহাদের কি২ ভাবে সাদৃশ্য কি২ ভাবে বৈলক্ষণ্য ইহার বিবেচনাতে স্থখবোধ হয়—আর এপ্রকার আমোদ নির্দাল ও নিস্পৃহ, ইহাতে অর্থাসক্তি নাই তথাপি সস্তোষ জনক ও স্থুখদ, এ জ্ঞানেতে ধনের বৃদ্ধি হয় না ইহাতে উদরের তুষ্টি কিম্বা অন্য কোন ইব্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ হয় না—তথাপি এমত স্কুখামুভব হয় যে তজ্জন্য কিঞ্চিং বায় করিতেও বৈরক্তি হয় না এবং তাহার প্রাপ্তির নিমিত্তে কোন শারীরিক স্থুখভোগ ত্যাগ করিতে হইলেও লোকে সম্বর হয়। পদার্থ বিদ্যাতে যে সুখ জন্মে তাহা

or, rather, it is the very same. For what has just been spoken of is, in fact, Science, which in its most comprehensive sense only means *Knowledge*, and in its ordinary sense means *Knowledge reduced to a System*; that is, arranged in a regular order, so as to be conveniently taught, easily remembered, and readily applied.

The practical uses of any science or branch of knowledge are undoubtedly of the highest importance; and there is hardly any man who may not gain some positive advantage in his worldly wealth and comforts, by increasing his stock of information. But there is also a pleasure in seeing the uses to which knowledge may be applied, wholly independent of the share we ourselves may have in those practical benefits. pleasing to examine the nature of a new instrument, or the habits of an unknown animal, without considering whether or not they may ever be of use to ourselves or to any body. It is another gratification to extend our inquiries, and find that the instrument or animal is useful to man, even although we have no chance ourselves of ever benefiting by the information: as, to find that the natives of some distant country employ the animal in travelling; -nay, though we have no desire of benefiting by the knowledge; as for example, to find that the instrument is useful in performing some dangerous surgical operation. The mere gratification of curiosity; the knowing more to-day than we knew yesterday; the understanding clearly what before seemed obscure and puzzling; the conএই প্রকার—বরং স্বরূপতঃই এই, কেননা এইরূপ জ্ঞানই পদার্থ বিদ্যা, ইহাকেই ইংরাজিতে সাএন্স বলে, অতি ব্যাপক ভাবে ইহার অর্থ জ্ঞান, সাধারণ লোকিক ব্যবহারে ইহার অর্থ নিয়মিত জ্ঞান—অর্থাৎ এ জ্ঞান এমত শৃষ্খলা পূর্বক বর্ণিত যে ইহার অনায়ানে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে এবং সহজ্ঞে স্বরণ ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এবম্ভত বিদ্যার প্রত্যেক শাখাতে ফলতঃ যে উপকার হয় তাহা নিঃসন্দেহ জাত মহৎ। জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে প্রায় সকলেই সাংশারিক ধন ও স্থথ প্রাপণে বাস্তবিক কুতার্থ হয় কিন্তু আমরা ঐহ বিষয়ের যে২ অংশ স্বয়ং ভোগ করিতে পাইব জ্ঞানেতে তদ্বাতিরিক্ত আরো অনেক প্রয়োজন দেখা যাইতেছে তদ্দর্শনেও আমোদ জন্মে, কোন মূতন যন্ত্রের গঠন কিয়া কোন অবিদিত জন্তুর ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলে আপনা-দের কিয়া অন্য কাহারো লাভালাভ না ভাবিয়া যে সন্তোষ জন্মে তাহা পূর্ব্বে কহা গিয়াছে পরে আরো অধিক তত্ত্ব করিয়া যদি অবগতি হয় যে ঐ যন্ত্রে কিম্বা জন্ততে কোনং মনষ্যের উপকার আছে তবে তাহাতে আপনাদের কখন কিঞ্চিৎ লাভ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও সে জ্ঞানে পুনশ্চ স্থথবোধ হয়, তাহার প্রমাণ এই—যদি ঐ জন্তকে কোন দ্র দেশস্থ লোকে বাহন স্বরূপে ব্যবহার করে তথাপি আপনাদের ইফাপত্তি না থাকিলেও দে জ্ঞানে আমোদ জন্মে আর যদি বোধ হয় যে ঐ যন্ত্র বিশেষ প্রাণ সংশয় পীড়াতে শরীরের কোন অঙ্গচ্ছেদ্ করণার্থে নির্দ্মিত হইয়াছে তবে আপনাদের এমত উপকারের অংশী হইতে বাসনা না থাকিলেও পরিতোষ হয়। কেবল জ্ঞানের আকাজ্ফা পূর্ণ করা—কল্য যাহা২ জানিতাম অদ্য তাহার অতিরিক্ত জানা—পূর্বে যাহা অস্পট ও বুদ্ধির অগো-চর ছিল তাহা এক্ষণে হৃদয়ঙ্গন করা-সামান্য সত্যের চিন্তা

templation of general truths, and the comparing together of different things,—is an agreeable occupation of the mind; and, beside the present enjoyment, elevates the faculties above low pursuits, purifies and refines the passions, and helps our reason to assuage their violence.

It is very true, that the fundamental lessons of philosophy may, to many, at first sight, wear a forbidding aspect, because to comprehend them requires an effort of the mind somewhat, though certainly not much, greater than is wanted for understanding more ordinary matters; and the most important branches of philosophy, those which are of the most general application, are, for that very reason, the less easily followed, and the less entertaining when apprehended, presenting as they do few particulars or individual objects to the mind. In discoursing of them, moreover, no figures will be at present used to assist the imagination; the appeal is made to reason, without help from the senses. But be not, therefore, prejudiced against the doctrine, that the pleasure of learning the truths which philosophy unfolds is truly above all price. Lend but a patient attention to the principles explained, and giving us credit for stating nothing which has not some practical use belonging to it, or some important doctrine connected with it, you will soon perceive the value of the lessons you are learning, and begin to interest yourselves in comprehending and recollecting them; you will find that you have actually learnt something of science, while mereএবং বিবিধ পদার্থের পরস্পার তুলনা—এ সমস্ত মানসিক ব্যাপার হর্ষ জনক, এবং এ ব্যাপারে ক্ষণিক সুখ বোধ ব্যতি-রিক্ত মনও উন্নতি পাইয়া অধম ক্রিয়া হেয় করে, আর অস্তঃ-করণের ভাব শুদ্ধ ও পরিষ্কার হয়, এবং রাগাদির অত্যাচার দমনার্থে বিবেক শক্তি তেজস্বিনী হয়।

দর্শন শাস্ত্রের মূল স্থত্র অনেকের পক্ষে প্রথমতঃ বিরক্তি জনক বিষয়ের ন্যায় প্রতীত হয় ইহা সত্য বটে কেননা তাহা হৃদয়ঙ্গন করা নিতান্ত হুষ্কর না হইলেও সামান্য বিষয়াপেকা যৎকিঞ্চিৎ অধিক বুদ্ধি চেষ্টার অপেক্ষা করে। দর্শন বিদ্যার অতি মহা২ শাখার প্রয়োগ অতি ব্যাপক হওয়াতেই তাহার অনুশীলন চুষ্কর এবং তল্লিমিত্তেই বোধ জন্মিলেও বহু আমোদ অনুন না—কেননা এমত ব্যাপক লক্ষণে বিশেষ ব্যক্তি প্রকরণের 🗫 বি হেতুক কোন পদার্থের মানসিক প্রত্যক্ষ হয় না—আর আমিও এই সকল বিষয়ের আলোচনাতে মনের কল্পনা সহজ করণার্থে সম্প্রতি কোন সাবয়ব দৃষ্টান্তের উদ্দেশ করিব না, এম্বলে বাহেন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া কেবল বিবেক শক্তিকেই সত্যের মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিব কিন্তু এই কারণে বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিওনা যে দর্শন শাস্ত্রে নিষ্পন্ন সত্য যথার্থ অমূল্য ধন নহে—এ বিদ্যার মূল স্থত্তের ব্যাখ্যা যদি ধৈর্য্য পূর্বক অবধান কর আর যদি বিশ্বাস কর যে আমুরা অনর্থক ও নিতান্ত নিষ্প্রোজন কথার উল্লেখ করিব না এবং যাহাতে কোন মহার্থক উপদেশ নাই এমত বচনেরও ঞ্চপ্তাব করিব না তবে ইহার মাহান্য্য শীঘ্র বুঝিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আপনারাই যতুশীল হইবা তথন দেখিতে পাইবা যে পদার্থ বিদ্যার অভিপ্রায় ও প্রয়োজন মাত্র বিবেচ-শ্রতে বিষয়ের যৎকিঞ্চিং উপদেশ বিস্তার হইয়া থাকে, পরে কোন্থ অঙ্গের নির্দশন পরীক্ষা করিয়া সমস্ত বিষয় শিক্ষাতে

ly engaged in seeing what its end and purpose is; you' will be enabled to calculate for yourselves, how far it is worth the trouble of acquiring, by examining samples of it; you will, as it were, taste a little, to try whether or not you relish it, and ought to seek after more; you will enable yourselves to go on, and enlarge your stock of it; and after having first mastered a very little, you will proceed so far as to look back with wonder at the distance you have 'reached beyond your earliest acquirements.

The Sciences may be divided into three great classes: those which relate to Number and Quantity-those which relate to Matter—and those which relate to Mind. The first are called the Mathematics, and teach the properties of numbers and of figures; the second are called Natural Philosophy, and teach the properties of the various bodies which we are acquainted with by means of our senses; the third are called Intellectual or Moral Philosophy, and teach the nature of the mind, of the existence of which we have the most perfect evidence in our own reflections; or, in other words. they teach the moral nature of man, both as an individual and as a member of society. Connected with all the sciences, and subservient to them, though not one of their number, is History, or the record of facts relating to all kinds of knowledge.

MATHEMATICAL SCIENCE.—The two great branches of the *Mathematics*, or the two mathematical sciences, are *Arithmetic*, the science of number, from the Greek word signifying number; and Geometry, the science of

শারিবা—ইহার অল্লাংশের আস্থাদ পাইলে মিউরস কিনা এবং আরো অধিকাংশ অন্তুসন্ধান কর্ত্তব্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে পারিবা—এই রূপে উত্তরোত্তর ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যার রাশি বৃদ্ধি করিতে পারিবা এবং প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইয়া পরে এত দূর পর্যান্ত বোধগন্য করিতে পারিবা যে তখন ভামাদের আদ্য অবস্থার জ্ঞান মনে করিলে চমৎকার বোধ

পদার্থ বিদ্যা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—প্রথমতঃ সংখ্যাও রাশি সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়তঃ পদার্থ সম্বন্ধীয়, তৃতীয়তঃ নানসিক ব্যাপার সম্বন্ধীয়—প্রথমোক্ত শ্রেণীর নাম ইংরাজিতে মাথেমেটিক্ল কহে অর্থাৎ গণিত শাস্ত্র, ইহাতে অঙ্ক এবং ক্ষেত্রের গুণ শিখায়,—দ্বিতীয়ের নাম ইংরাজিতে ন্যাচুরল কিলসফি অর্থাৎ স্বাভাবিক বস্তুত্ত্ব, ইহাতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্ম যাব্দানীয় বস্তুর গুণ শিখায়—তৃতীয়ের নাম মানসিক তত্ত্ব কিয়া নীতি বিদ্যা, ইহাতে আপনাদের বিবেচনাতেই সম্পূর্ণ প্রমেয় যে মন তাহার স্বভাব প্রকাশ করে এবং আপনাদের ও সাধারণ সমাজের সম্বন্ধে মহুষ্যের ধর্মাধর্ম্ম কি তাহা অবগত করায়, এই বিদ্যার সংযুক্ত আর এক উপকারিণী শাখা আছে—তাহা স্বতন্ত্ররূপে গণ্য নহে তাহার নাম পুরাবৃত্ত অর্থাৎ সকল প্রকার বিদ্যা সম্বন্ধীয় ঘটনার বিবরণ।

অথ মাথেমেটিক বিদ্যা।—মাথেমেটিক বিদ্যার ছই মহতী বো. উভয়ই পৃথক২ মাথেমেটিক বিদ্যা বাচ্য হইতে পারে, মৃতঃ গণিত অর্থাৎ অঙ্ক গণনা ইহাকে ইংরাজিতে আরিণ্- figure, from the Greek words signifying measure of the earth,—land-measuring having first turned men's attention to it.

When we say that 2 and 2 make 4, we state an arithmetical proposition, very simple indeed, but connected with many others of a more difficult and complicated kind. Thus, it is another proposition, somewhat less simple, but still very obvious, that 5 multiplied by 10, and divided by 2 is equal to, or makes the same number with, 100 divided by 4-both results being equal to 25. So, to find how many farthings there are in 1000l., and how many minutes in a year, are questions of arithmetic which we learn to work by being taught the principles of the science one after another, or, as they are commonly called, the rules of addition. subtraction, multiplication, and division. Arithmetic may be said to be the most simple, though among the most useful of the sciences; but it teaches only the properties of particular and known numbers, and it only enables us to add, subtract, multiply, and divide But suppose we wish to add, subtract, those numbers. multiply or divide numbers which we have not yet ascertained, and in all respects to deal with them as if they were known, for the purpose of arriving at certain conclusions respecting them, and, among other things, of discovering what they are; or, suppose we would examine properties belonging to all numbers;

ু টিক কহে, দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্র তত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষেত্রের পরিমাণাদি বিদ্যা, ইহাকে ইংরাজিতে জিওমেত্রি কহে ছই গ্রীক শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি বাক্যার্থ ভূমি পরিমাণ।

দ্বিসংখ্যক অক্ষের যোগে চারি হয় এই সামান্য কথাতেও গণিতের উল্লেখ আছে এ কথা অতি সহজ বটে কিন্তু ইহার সহিত অনেক প্রকারে নিশ্রিত এবং কঠিন বহু বিধ কথার সংযোগ আছে—যথা পাঁচকে দশ গুণ করিয়া পরে ছুই দিয়া হরণ করিলে এক শতকে চারি দ্বারা বিভাগের তুল্য ফল প্রাপ্তি হয় কেননা উভয় পক্ষেই লব্ধি ২৫, একথা পূর্ব্বাপেকা কিঞ্চিৎ কঠিন তথাপি অতি স্পাই। তদ্ৰূপ ১০০০ তঙ্কাতে কত পয়সা অথবা একবৎসরে কত পল ইহাও গণিতের প্রশ্ন। এ বিদ্যার মূল অর্থাৎ সঙ্কলন ব্যবকলন হরণ পূরণের ধারা ক্রমে২ শিখিলে আমরা এবম্বিধ প্রশ্ন সাধিতে পারি— পদার্থ বিদ্যার মধ্যে গণিত প্রকরণ অতি সহজ হইলেও ইহার প্রয়োজন অতি ব্যাপক। কিন্তু ইহাতে কেবল দৃষ্ট অর্থাৎ বিশেষ ২ বিদিত অক্টের গুণ জানা যায় এবং ইহার দারা আমরা ঐ অক্ষের যোগ বিয়োগ হরণ পূরণ করিতে দক্ষম হই, পরস্তু অদৃশ্য অর্থাৎ অনিশ্চিত ও অবিদিত অঙ্কের যোগ বিয়োগাদি করিতে যদি চাহি এবং তদ্বিষয়ক কোন সিদ্ধির নিমিত্তে অর্থাৎ তাহাদের নিরূপণ ও নির্ণয়ার্থে যদি দুউ ও বিদিত অক্ষের ন্যায় তাহাদের সমস্ত ব্যাপারে নিযুক্ত ছুইতে ইচ্ছা করি—অথবা যদি অঙ্ক মাত্রের সাধারণ গুণ ক্রীক্ষা করিতে চাহি—তবে এই২ কার্য্য গণিতের বিশেষ ক্রিব ছারা সাধিতে হইবে, তাহার নাম বাৃাপক গণিত অর্থাৎ

this must be performed by a peculiar kind of arithme tic, called Universal arithmetic, or Algebra*. common arithmetic, you will presently perceive, carries the seeds of this most important science in its bosom. Thus, suppose we inquire what is the number which multiplied by 5 makes 10? This is found if we divide 10 by 5-it is 2: but suppose that, before finding this number 2, and before knowing what it is, we would add it, whatever it may turn out, to some other number; this can only be done by putting some mark, such as a letter of the alphabet, to stand for the unknown number, and adding that letter as if it were a known number. Thus, suppose we want to find two numbers which, added together, make 9, and multiplied by one another, make 20. There are many which, added together, make 9; as 1 and 8; 2 and 7; 3 and 6: and so on. We have, therefore, occasion to use the second condition, that multiplied by one another they should make 20, and to work upon this condition before we have discovered the particular numbers. We must, therefore, suppose the numbers to be found, and put letters for them, and, by reasoning upon those letters, according to both the two conditions of adding and multiplying, we find what they must each of them be in figures, in order to fulfil or answer the conditions. Algebra teaches the rules for conducting this

^{*} Algebra, from the Arabic words signifying the reduction of fractions; the Arabs having brought the knowledge of it into Europe.

ধীজ গণিত, ইংরাজিতে ইহাকে আল্জিব্রা* কহে। কিঞ্ছিৎ প্রীববেচনা করিলে বোধগম্য হইবে যে সামান্য গণিতের মধ্যেই এই ব্যাপক বিদ্যার বীজ আছে—যথা যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কোন অঙ্ককে পাঁচ দিয়া গুণ করিলে দশ হয়? তবে দশকে পাঁচ দিয়া হরণ করিলে ইহার উত্তর পাওয়া যায় বটে অর্থাং ২— কিন্তু এই অঙ্ক (ছুই)পাইবার পূর্বে এবং ইহার নির্দেশ হইবার অগ্রে ইহাকে যাবৎ তাবৎ জ্ঞান করিয়া যদি অন্য কোন অঙ্কেতে যোগ করিতে হয় তবে এ কার্য্য সাধিবার জন্য কোন অক্ষর কিয়া চিহ্নকে ঐ অদৃশ্য অক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ কিছার কিয়া চিহ্নকে ও অদৃশ্য অক্টের আতানার স্বরূপ লিথিয়া দৃষ্ট অঙ্কের ন্যায় যোগ করিতে হইবে—তাহার উদাহরণ শুন-পরস্পর যোগ করিলে ৯ হয় এবং গুণ করিলে ২০ হয় এমত অঙ্ক দ্বয় কি? এ প্রশ্রে পরস্পর যোগ ় করিলে ৯ হয় এমত অনেক অঙ্কদ্বয় আছে যথা ১ এবং ৮, ২ ্বিএবং ৭, ৩ এবং ৬ ইত্যাদি অতএব পরস্পর গুণ করিলে ্বে ২০ হয় প্রশ্নের এই দ্বিতীয় কোটি অবলম্বন করিতে হইবে এবং এই কোট্যমুসারে গণনা না করিলে ইফ্ট অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত অঙ্কদন্য পাওয়া যাইবে না—তন্নিমিক্তে এই অঙ্ক-দ্বয়কে প্রাপ্ত বোধ করিয়া তাহার পরিবর্<mark>ত্তে কোন অক্ষর</mark> লিথিতে হইবেক এবং পরস্পার যোগ ও গুণ এই কোটিদ্বয়া-মুসারে ঐ অক্ষরদ্বয় লইয়া বিচার করিলে তাহারা কি২ অঙ্ক হইবে ভাহা নিশ্চয় করা যায়, এই রূপ বিচার পূর্বক ফল সাধনের বিহিত ধারা বীজ গণিতে ব্যক্ত হয়, এই বিদ্যাতে দৃষ্ট অঙ্কের সহিত অদৃশ্য অঙ্কের কোন প্রকার সম্বন্ধমাত

^{*} আল্জিব্রা শব্দ আরবি ভাষা হইতে উৎপন্ন ইহার অর্থ ্রিভিনাক্ষের ক্রপান্তর—আরবি লোকেরা এ বিদ্যা ইউরোপে শ্রীনে।

reasoning, and obtaining this result successfully; and, by means of it we are enabled to find out numbers which are unknown, and of which we only know that they stand in certain relations to known numbers, or to one another. The instance now taken is an easy one; and you could, by considering the question a little, answer it readily enough; that is, by trying different numbers, and seeing which suited the conditions; for you plainly see that 5 and 4 are the two numbers sought; but you see this by no certain or general rule applicable to all cases, and therefore you could never work more difficult questions in the same way; and even questions of a moderate degree of difficulty would take an endless number of trials or guesses to answer. Thus a shepherd sold his flock for 801.; and if he had sold four sheep more for the same money, he would have received one pound less for each sheep. To find out from this, how many the flock consisted of, is a very easy question in algebra, but would require a vast many guesses, and a long time to hit upon by common arithmetic*: And questions infinitely more difficult can easily be solved by the rules of algebra. In like manner, by arithmetic you can tell the properties of particular numbers; as, for instance, that the number 348 is divided by 3 exactly, so as to leave nothing over: but algebra teaches us that it is only one of an infinite variety of numbers, all divisible by 3, and any one of which you can tell the moment you see it: for

^{*} It is 16.

জানিয়াই অথবা কএক অদৃশ্য অঙ্কের পরস্পার সম্পর্ক বুঝিয়াই গণনা দ্বারা তাহাদের নির্ধারণ করা যায়। উপরি ভাগে যে উদাহরণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সহজ্ঞ—কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে এ প্রশ্নের সাধন অনায়াসে হইবে, কতিপয় অস্ক লইয়া প্রশ্নের কোটিবয়ামুসারে পরীক্ষা করিলে অভীষ্ট অঙ্ক শীম্র জানা যাইবে অর্থাৎ এ স্থলে জিজ্ঞাসিত ৫ এবং ৪ অক্লেশে বোধ গম্য হইবে—কিন্তু এ জ্ঞান সামান্য এবং নিশ্চিত ও সর্ব্বত্র ব্যাপক স্থৃত্রাধীন না হওয়াতে কোন কঠিনতর প্রশ্ন হইলে এ প্রকারে সাধা যায় না অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন না হইলেও অনভব ও আশঙ্কা দারা একে২ পরীক্ষা করিয়া উত্তর দিলে অসংখ্য পরীক্ষা ও কল্পনা করিতে হইবে তাহার এক উদাহরণ এই— কোন রাথাল এক পাল মেষ ৮০০ টাকায় বিক্রয় করিল যদি ঐ টাকায় আর চারিটা মেষ অধিক দিত তবে এক২ মেষের ুমূল্য ১০ টাকা করিয়া নূয়ন হইত ইহাতে তাহার পালের মেষ সংখ্যা কত*? বীজ গণিতে এ প্রশ্ন অতি সহজ কিন্তু সামান্য গণিতদারা সাধিতে হইলে ইহার যথার্থ উত্তরের জন্য অনেকানেক কল্পনা ও পরীক্ষা করিতে হইবে যাহাতে অনেক কাল ব্যয়ের আবশ্যক পরস্তু বীজ গণিতে এতদপেক্ষা অসংখ্য প্রকারে কঠিনতর প্রশ্নও সহজে প্রতিপাদ্য হয়। সামান্য গণিত দারা কোন্ বিশেষ অঙ্কের কার্য্য করা যায় বটে যথা ৩৪৮ ৩ দিয়া হৃত হইলে লব্ধি শুদ্ধ হয় কিছু অবশিষ্ট থাকে না কিন্তু বীজ গণিতে অবগতি হইবে যে ৩৪৮ ন্যায় অসংখ্য প্রকার অঙ্ক আছে সকলেই ও দারা হৃত হইলে অবশিষ্ট কিছু থাকে না আর দর্শন মাত্রে সে প্রকার অঙ্কের পরিচয় হয় কেননা তাহার এক বিচিত্র লক্ষণ এই যে যে২ অক্ষরের পাতে

^{*} উত্তর ১৬

they all have the remarkable property, that if you add together the figures they consist of, the sum total is divisible by 3. You can easily perceive this in any one case, as in the number mentioned, for 3 added to 4 and that to 8 make 15, which is plainly divisible by 3; and if you divide 348 by 3, you find the quotient to be 116, with nothing over. But this does not at all prove that any other number, the sum of whose figures is divisible by 3, will itself also be found divisible by 3, as 741; for you must actually perform the division here, and in every other case, before you can know that it leaves nothing over. Algebra, on the contrary, both enables you to discover such general properties, and to prove them in all their generality.

By means of this science, and its various applications, the most extraordinary calculations may be performed. We shall give, as an example, the method of Logarithms, which proceeds upon this principle. Take a set of numbers going on by equal differences; that is to say, the third being as much greater than the second, as the second is greater than the first, and the common difference being the number you begin with; thus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, in which the common difference is 1: then take another set of numbers, such that each is equal to twice or three times the one before it, or any number of times the one before it, but the common multiplier being the number you begin with: thus, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128; write this second set of numbers under the first,

সে অক্ক লিখিত হয় তাহা একত্র যোগ করিলে ও ছারা নিরবশেষে ভাগ হইতে পারে, উদাহরণ দেখিলে এ লক্ষণ সহজে বোধগম্য হইবে যথা পুর্ব্বোক্ত ৩৪৮ ইহার তিন অক্ষর একত্র করিলে ৩, ৪, এবং ৮ যোগে ১৫ হয় ইহা ও ছারা শুদ্ধ রূপে ভাজ্য স্পাই দেখা যাইতেছে এবং ৩৪৮ সংখ্যাও ও ছারা ভক্ত হইলে লক্ষি ১১৬, অবশিই কিছু থাকিবে না, কিন্তু কোন২ বিশেষ উদাহরণে উক্ত লক্ষণের সঙ্গতি দেখিয়া তাহাতেই সামান্য রূপে নির্ণয় করা যায় না যে যে২ অক্ষরের পাতে কোন সংখ্যা হয় তাহারা একত্র যোগে যদি ও ছারা নিরবশেষে ভাজ্য হয় তবে সে সংখ্যাও ৭৪১ ন্যায় ও ছারা শুদ্ধ ভাজ্য হইবে, কেননা ভাগ হার না করিলে নিশ্চয় হইতে পারেনা যে অবশিই কিছু নাই, কিন্তু বীজ গণিতের রীতি ছারা সাধন করিলে এই ২ সামান্য গুণ সপ্রমাণ উপপন্ন হইতে পারে।

এই বিদ্যার নানা প্রকার প্রয়োগ দ্বারা অতি আশ্চর্য্ ২ গণনা হইতে পারে, লগারিথন নামক এক চনংকার গণনা এই বিদ্যার স্থত্রেতে সাধ্য হয়, তাহার উদাহরণ উল্লেখ করি—কএক সমানান্তর অন্ধ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া লিখ, অর্থাৎ কএক অন্ধকে এমত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ কর যে দ্বিতীয় অন্ধ প্রথম হইতে যতোধিক অতিরিক্ত তৃতীয়প্ত যেন দ্বিতীয় হইতে ততোধিক অতিরিক্ত হয়—আর ইহাদের সামান্য অন্তর অর্থাৎ যে সংখ্যান্মারে প্রথম হইতে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় অতিরিক্ত হইবে সেই সংখ্যক অন্ধকে আদ্য অন্ধ কর, যথা ২, ২, ৬, ৪, ৫, ৬, ইত্যাদি, ইহাদের সামান্য অন্তর ১। পরে আর কএক অন্ধের এমত এক শ্রেণী ক্রমশঃ লিখ যে প্রত্যেক অন্ধ যেন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব অন্ধের দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ অ্ববা অন্য কোন সংখ্যক গুণ হয় আর এই সামান্য গুণকের সংখ্যা যেন আদ্য অন্ধ হয় যথা ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১২৮

or side by side, so that the numbers shall stand opposite to one another, thus,

1	2	3	4	5	6	7
2	4	8	16	32	64	128

you will find, that if you add together any two of the upper or first set, and go to the number opposite their sum, in the lower or second set, you will have in this last set the number arising from multiplying together the numbers of the lower set corresponding or opposite to the numbers added together. Thus, add 2 to 4, you have 6 in the upper set, opposite to which in the lower set is 64, and multiplying the numbers 4 and 16 opposite to 2 and 4, the product is 64. In like manner, if you subtract one of the upper numbers from another, and opposite to their difference in the upper line, you look to the lower number, it is the quotient found from dividing one of the lower numbers by the other opposite the subtracted ones. Thus, take 4 from 6 and 2 remains, opposite to which you have in the lower line 4; and if you divide 64, the number opposite to 6, by 16, the number opposite to 4, the quotient is 4. The upper set, are called the logarithms of the lower set. which are called natural numbers; and tables may, with a little trouble, be constructed, giving the logarithms of all numbers from 1 to 10,000 and more: so that, instead of multiplying or dividing one number by another, you have only to add or subtract their logarithms, and then you at once find the product or the

্ইত্যাদি। এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণী প্রথমোক্তের নীচে অথবা পার্মেলিখ যেন শ্রেণী মধ্যন্থ অঙ্ক সমূহ প্রত্যেকে পরস্পর সন্মধন্থ হয় যথা

8 ¢ ৮ ১৬ ৩২ ৬৪ ১২৮ এক্ল যদি উপরিস্থ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কোন চুই অঙ্ককে একত্র যোগ কর অর্থাৎ চিক দেও আর এই ঠিক দিয়া যত পাও সেই অঙ্কের তলে যে অঙ্ক আছে তাহাতে যদি নিরীক্ষণ কর তবে দেখিবা যে প্রথম শেণীর যে ছুই অঙ্ক ঠিক দিয়াছ তাহাদের তলত দিতীয় শেনীর চুই অঙ্ককে পরস্পর গুণ করিলে ঐ নিরীক্ষিত অঙ্ক ফল পাইবা—যথা প্রথম শেণীর মধ্যে যদি ২ এবং ৪ একত্র ঠিক দেও তবে ৬ পাইবা এই অঙ্কের তলে অথবা সম্মুখে দিতীয় শেণীতে ৬৪ আছে আর যে हरे अक ठिक मिना (अथीर २ जेवर ८) जाशाम्त जनस् ' অথবা সম্মুখন্থ দিতীয় শ্রেণীর অঙ্ক দ্বয় ৪এবং ১৬ দেখিবা, এই ছুই অঙ্ককে পরস্পর গুণ করিলে ৬৪ ফল পাইবা। তদ্রুপ যদি প্রথম শ্রেণীর কোন অঙ্ক অন্য অঙ্ক হইতে ব্যবকলন কর অর্থাৎ বাকি কাট এবং তাহাতে অবশিষ্ট যাহা পাইবা তাহার ' তলস্থা সম্থন্থ দিতীয় শ্রেণীর অক্ষেযদি দৃষ্টি কর তবে দেখিবা যে বাঁকি কাটিবার উক্ত ছুই অঙ্কের তলস্থ অঙ্ক দ্বয়ের একটিকে অন্য দারা ভাগ করিলে ঐ দিতীয় শ্েণীর দৃষ্ট অঙ্ক निक्कि हम यथी, यि ७ हहेरि ८ वाकि काँगे उर्दे अवेगिके २ থাকিবে ইহার তলে দ্বিতীয় শেণীতে ৪ দেখিবা অতএব ৬ ' সম্বাথস্থ অঙ্ক অর্থাৎ ৬৪ ইহাকে যদি ৪ সম্বাথস্থ অঙ্ক অর্থাৎ ১৬ দারা ভাগ কর তবে ৪ লব্ধি পাইবা, এই প্রকারে প্রথম শ্ণীত অঙ্ককে দিতীয় শ্ৰেণীত অঙ্কের লগারিথম বলা যায় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে স্বাভাবিক অঙ্ক কহা যায়। আর কিঞ্ছিৎ পরিশ্ম করিলে ১ অবধি ১০০০০ অথবা ভাহার অধিক পর্যান্ত [্]সকল অক্টের লগারিথম এই রূপে গণনা করিয়া শেণী বন্ধন পূর্বাক লেখা যাইতে পারে অতএব যখন কোনই অঙ্কের

quotient in the tables. These are made applicable to numbers far higher than any actually in them, by a very simple process; so that you may at once perceive the prodigious saving of time and labour which is thus made. If you had, for instance, to multiply 7,543,283 by itself, and that product again by the original number, you would have to multiply a number of 7 places of figures by an equally large number, and then a number of 14 places of figures by one of 7 places till at last you had a product of 21 places of figuresa very tedious operation; but, working by logarithms, you would only have to take three times the logarithm of the original number, and that gives the logarithm of the last product of 21 places of figures, without any further multiplication. So much for the time and trouble saved, which is still greater in questions of division; but by means of logarithms many questions can be worked, and of the most important kind, which no time or labour would otherwise enable us to resolve.

Geometry teaches the properties of figure, or particular portions of space, and distances of points from each other. Thus, when you see a triangle, or three-sided figure, one of whose sides is perpendicular to another side, you find, by means of geometrical reasoning respecting this kind of triangle, that if squares be drawn on its three sides, the large square upon the slanting side, opposite the two perpendiculars, is exactly equal to the two smaller squares upon the perpendiculars, taken together; and this is absolutely

হরণ পূরণ করিতে হয় তখন বহু পরিশুম পূর্বক তাহা না করিয়া যদি ঐ শ্নৌতে ভাহাদের লগারিথম দৃষ্টি করিয়া ঠিক দেও কিমা বাকি কাট তবে তাহাদের যোগ বিয়োগে যাহা পাও তাহার সমুখন্থ পংক্তি দৃষ্টি করিলে একেবারে উদ্দিষ্ট ফল বা লব্ধি পাইবা—ঐ প্রকার শেণীতে যে২ অঙ্ক আছে তাহার অত্যদ্ধ দংখ্যা পর্যান্তেও সহজে এ সম্বেতের প্রয়োগ হইতে পারে—অতএব ইহাতে কিপ্যান্ত পরিশুন ও কাল ব্যয়ের লাঘ্ব হয় তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিবা—তাহার সাক্ষি দেখ যদি ৭৫৪৩২৮৩ এমত এক অঙ্ককে ইহার আপ-নার দারা গুণ করিতে হয় এবং প্রাপ্ত ফলকেও ঐ আদ্য অঙ্ক দ্বারা প্রনশ্চ যদি গুণ করিতে হয় তবে প্রথমতঃ ৭ অক্ষরের এক অঙ্ককে তৎস্বরূপ অঙ্কদ্বারা গুণ করিতে হইবে পরে ইহার ফলকে অর্থাৎ ১৪ অক্ষরের এক অঙ্ককে পুনশ্চ ৭ অক্ষরের এক অঙ্কদ্বারা গুণ করিতে হইবে অবশেষে ২১ অক্ষরের এক অঙ্ক ফল পাইবা—এই রূপ গুণ কর্ম্মেতে কেমত ক্লেশ ও পরি-শুম তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ—কিন্তু লগারিথম নামক গণনা ছারা প্রথম অঙ্কের লগারিথম লইয়া তিন গুণ করিলে ঐ ২১ অক্ষর যুক্ত ফলের লগারিথম একেবারে পাইবা ভাহাতে আর গুণ করিতে হইবে না—দেথ ইহাতে কত পরিশ্ম ও কাল ব্যয় হইতে রক্ষা পাইবা—ভাগহারে এই রক্ষা আরো অধিক জানিবা।—লগারিথম দারা এতদাতীত আরো অনেক গুরুতর প্রশ্ন সাধা যায় তাহা অন্য কোন প্রকারে বছ পরিশম ও কালকেপ করিলেও কথনও সাধ্য হয় না।

গণিত শাস্ত্রের আর এক শাখার নাম ক্ষেত্রতত্ত্ব ইহাতে ক্ষেত্রের অর্থাৎ দিগ্দেশীয় রাশির নানা গুণ ও ধর্ম জানা যার এবং এক বিন্দুর অন্য বিন্দু হইতে যে দূরতা তাহাও নির্ণয় হয় যথা যদি এমত এক ত্রিভূজ অর্থাৎ ত্রিকোণ ক্ষেত্র দেখ যাহার কোন ছই বাছ পরস্পর ঠিক লম্বভাবে থাকে তবে এ প্রকার ত্রিভূজ সম্বন্ধীয় ক্ষেত্র ব্যবহারে নির্ণয় করিতে পারিবা true, whatever be the size of the triangle, or the proportions of its sides to each other. Therefore, you can always find the length of any one of the three sides by knowing the lengths of the other two. Suppose one perpendicular side to be 3 feet long, the other 4, and you want to know the length of the third side opposite to the perpendicular; you have only to find a number such, that if, multiplied by itself, it shall be equal to 3 times 3, together with 4 times 4, that is 25*. (This number is 5.)

Now only observe the great advantage of knowing this property of the triangle, or of perpendicular lines. If you want to measure a line passing over ground which you cannot reach—to know, for instance, the length of one side covered with water of a field, or the distance of one point on a lake or bay from another point on the opposite side—you can easily find it by measuring two lines perpendicular to one another on the dry land, and running through the two points; for the line wished to be measured, and which runs through the water, is the third side of a perpendicular-sided triangle, the other two sides of which are ascertained. But there are other properties of triangles,

^{*} It is a property of numbers, that every number whatever, whose last place is either 5 or 0, is, when multiplied into itself, equal to two others which are square numbers, and divisible by 3 and 4 respectively:—thus, $45 \times 45 = 2025 = 729 \div 1296$, the squares of 27 and 36; and $60 \times 60 = 3600 = 1296 + 2304$, the squares of 36 and 48.

যে যদি তাহার তিন বাছর উপর সম চতুর্জ আঁকা যায় তবে
লয় দয়ের উপরিশ্ব ক্ষুদ্র সমচতুর্জ দয় একত্রযোগ করিলে সম্পুধবর্ত্তি কর্ণস্বরূপ বাছর উপরিশ্ব বৃহৎ সম চতুর্ভুজের তুল্য হইবে
এবং ঐ ত্রিভুজ যত বৃহৎ হউক এবং ইহার বাছত্রয়ের মধ্যে যে
প্রকার তারতম্য থাকুক ঐ রূপ তুল্যতায় কখন ব্যাঘাত হইবে
না অতএব এবমূত ত্রিভুজের হুই বাছর দীর্ঘতা জানিলে
অবশিষ্ট বাছর দার্ঘতা সহজে নির্ণয় হইতে পারে, যদিস্যাৎ এক
লয় ৩ হাত অন্য লয় ৪ হাত দীর্ঘহয় তবে তাহার সম্পুখন্থ তৃতীয়
বাছর দীর্ঘতা জানিতে হইলে কেবল এমত এক অক্ক স্থির
করিতে হইবে যাহা আপনারদারা গুণ হইলে তিন ত্রিত্বে ৯ ও
চতুশ্চতুর্গুণে ১৬ এ উভয়ের যোগ তুল্য হইবে—অর্থাৎ কেবল
এমত এক অক্ক অভীষ্ট যাহাকে আপনাআপনি গুণ করিলে
২৫ * হইবে. (ঐ অক্ক ৫)।

ত্রিভ্জের কিয়া লয় রেখার এই গুণ জানাতেই কেনত উপকার তাহা বিবেচনা কর, যদি অগন্য ক্ষেত্রের উপর কল্পিত কোন
রেখার পরিমাণ জানিতে চাহ—অর্থাৎ যদি কোন ক্ষেত্রের এক
পাশ্ব জলেতে মগ্ন হইলে তাহার দৈর্ঘ্য জানিতে বাঞ্ছা কর
কিয়া কোন হুদের এক কূলস্ব বিন্দু হইতে অপর কূলস্থ কোন
বিন্দুর দূরতা জানিতে স্পৃহা কর তবে পরস্পর লয়ভাবে থাকে
এমত তুই রেখা ঐ বিন্দুদ্বরের মধ্য দিয়া শুদ্ধ ভূমির উপর
টানিয়া পরিমাণ করিলে জানিতে পারিবা কেননা যে রেখার

^{*} অঙ্কের আর এক গুণ এই যে যত সংখ্যক অঙ্ক হউক শেষাক্ষর যদি ৫ কিয়া ০ হয় তবে আপনার দারা গুণ হইলে ছই বর্গাঙ্কের যোগতুলা হয় এবং সে বর্গদ্বয় ক্রমশঃ ৩ এবং ৪ দারা ভাজা যথা ৪৫×৪৫=২০২৫=৭২৯+১২৯৬ ইহারা ২৭ এবং ৩৬ বর্গ। পুনশ্চ ৬০×৬০=৩৬০০=১২৯৬+ ২৩০৪ ইহারা ৩৬ এবং ৪৮ বর্গ।

which enable us to know the length of two sides of any triangle, whether it has perpendicular sides or not. by measuring one side, and also measuring the inclinations of the other two sides to this side, or what is called the two angles made by those sides with the measured side. Therefore you can easily find the perpendicular line drawn, or supposed to be drawn, from the top of a mountain through it to the bottom, that is the height of the mountain; for you can measure a line on level ground, and also the inclination of two lines, supposing them drawn in the air, and reaching from the two ends of the measured line to the mountain's top; and having thus found the length of the one of those lines next the mountain, and its inclination to the ground, you can at once find the perpendicular, though you cannot possibly get near it. In the same way, by measuring lines and angles on the ground, and near, you can find the length of lines at a great distance, and which you cannot approach: for instance, the length and breadth of a field on the opposite side of a lake or sea: the distance of two islands, or the space between the tops of two mountains.

Again, there are curve-lined figures as well as straight, and geometry teaches the properties of these also. The best known of all the curves is the circle, or a figure made by drawing a string round one end which is fixed, and marking where its other end traces, so that every part of the circle is equally distant from the fixed point or centre. From this fundamental property, an infinite variety of others follow by steps

পরিমাণ অভীষ্ট তাহা এই রূপে এক জাত্য অর্থাৎ সমকোনি ত্রিভুজের কর্ণ হইবে স্থতরাং ছুই বাস্থ অর্থাৎ ভূজকোটি নিশ্চয় হইলে তৃতীয় বাহু সহজে নিশ্চয় হইবে। অধিকস্ক ত্রিভুজ ক্ষেত্রের অন্যান্য গুণ আছে যদ্ধারা জাত্য না হইলেও এক বাছর দৈর্ঘ্য নিশ্চয় করিয়া এবং তাঁহার সহিত অন্য বাছন্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন কোণ ছয়ের পরিমাণ স্থির করিয়া ঐ বাহু ছয়ের পরিমাণ গণনা করা যায়, এই প্রকারে কোন পর্বতের শিখর হইতে তল পর্য্যন্ত লম্ব কল্পনা করিলে তাহার পরিমাণ অর্থাৎ ঐ পর্বতের উন্নতি নির্ণয় করা যায় কেননা পর্বাতের নিকটে কিয়া দরে সরল ভূমির উপর স্বেচ্ছামুসারে এক রেখা নির্দেশ করিয়া তাহার পরিমাণ করিতে পার এবং এই রেখার প্রান্ত বিনদ্দর হইতে শ্ন্য দিয়া পর্বতের শিখর পর্যান্ত ছুই রেখা কল্পনা করিলে যে কোণ দয় উৎপন্ন হুইবে তাহারও পরিমাণ যক্ত দারা নির্ণয় হইতে পারে—তাহাতে ঐ কল্পিত রেখা দয়ের মধ্যে পর্বতের নিকটতর রেখার পরিমাণ প্রথমতঃ নিশ্চিত হইলে এবং ভূমির উপর তৎসংযে;গোৎপন্ন কোণের নির্ণয় হইলে পরে পর্বতের শিখর হইতে তল পর্যান্ত লম্বের দৈর্ঘ্য স্থির হইবে এবং পর্বত অগম্য হইলেও এই রূপে তাহার উন্নতি গণনা হইতে পারে। এই প্রকারে ভূমির উপর দৃষ্ট রেখা ও কোণের পরিমাণ করিয়া দূরন্ত অদৃষ্ট এবং অগম্য রেখার পরিমাণ গণনা করা যায়, তাহার উদাহরণ—হুদের কিয়া সমুদের পারস্থ ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এবং ছুই উপ-দ্বীপের পরস্পর দূরতা অথবা দুই পর্বত শিখরের মধ্যস্থ ভূমি পরিমাণ সকলি এই রূপে জানা যায়।

অপিচ যাদৃশ সরল রেখার লক্ষণ আছে তাদৃশ কুটিল রেখারও সূত্র আছে এবং ক্ষেত্র বিদ্যাতে ইহার গুণও প্রকাশ করে। বক্রাকৃতি রেখার মধ্যে বৃত্ত সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ, সূত্র লইয়া একাগু স্থির রাখিয়া অন্য অগু ঘুরাইলে চিহ্নিত স্থলে বৃত্ত রেখা •জন্মে এবং এই রেখার সর্বাংশ ঐ স্থির অর্থাৎ শধ্য বিন্দু হইতে সমদূর। বৃত্তের এই মূল লক্ষণ হইতে নানা of reasoning more or less numerous, but all necessarily arising one out of another. To give an instance; it is proved by geometrical reasoning, that if from the two ends of any diameter of the circle you draw two lines to meet in any one point of the circle whatever, these lines are perpendicular to each other.

Another property, and a most useful one, is, that the sizes, or areas, of all circles whatever, from the greatest to the smallest, from the sun to a watch-dial-plate, are in exact proportion to the squares of their instances from the centre—that is, the squares of the strings they are drawn with; so that if you draw a circle with a string 5 feet long, and another with a string 10 feet long, the large circle is four times the size of the small one, as far as the space or area inclosed is concerned; the square of 10 or 100 being four times the square of 5 or 25. But it is also true, that the lengths of the circumferences themselves, the number of feet over which the ends of the strings move, are in proportion, to the lengths of the strings; so that the curve of the larger circle is only twice the length of the curve of the lesser.

But the circle is only one of an infinite variety of curves, all having a regular formation and fixed properties. The oval or ellipse is, perhaps, next to the circle, the most familiar to us, although we more frequently see another curve, the line formed by the motion of bodies thrown forward. When you drop a stone, or throw it straight up, it goes in a straight line; when you throw it forward, it goes in a curve

প্রকার ন্যায় দারা অসংখ্য গুণ সিদ্ধ হয় সে সমস্ত গুণ পরস্পর হেতু সাধ্য ভাবে থাকে, তাহার এক উদাহরণ শুন—যদি কোন বৃত্তের অন্তরে ব্যাসের ছই প্রাপ্ত দিয়া ছই রেখা পরিধির কোন বিন্দুতে সংলগ্ন করা যায় ভবে সে দুই রেখা পরস্পর লম্বভাবে থাকিবে ইহা ক্ষেত্র বিদ্যার ন্যায়েতে সিদ্ধ হইয়াছে।

বৃত্তের আর এক ধর্ম এই যে অতি বৃহৎ হউক কিয়া অতি কুদ্র হউক প্রকাণ্ড সূর্য্য মণ্ডল স্বন্ধপ হউক কিয়া এক সামান্য ঘটিকা চক্র স্বন্ধপ হউক পরস্পার তুলনা করিতে হইলে আপনং ব্যাসার্দ্ধের বর্গান্ত্রসারে অন্তরন্থ ক্ষেত্র ফলের নিষ্পান্তি হইবে অর্থাৎ যেং স্থ্র যুরাইয়া বৃত্ত অন্ধিত হইয়াছে তত্তৎ বর্গের নিষ্পান্তির ন্যায় অন্তর ক্ষেত্রফলের নিষ্পান্তি জানিবা। অতএব যদি একটা বৃত্ত ৫ ফুট স্থ্র দিয়া আর একটা ১০ ফুট দিয়া আঁকা যায় তবে বৃহৎ বৃত্তের ক্ষেত্র ফল ক্ষুদ্রের চারি গুণ অধিক হইবে কেননা দশের বর্গ ১০০ পঞ্চের বর্গ ২৫ হইতে চারি গুণ অতিরিক্ত কিন্তু ছই বৃত্তের পরিধি কেবল স্থ্যান্ত্রসারে পরস্পার নিষ্পান্ন হইবে অতএব এম্বলে বৃহৎ বৃত্তের পরিধি ক্ষুদ্র বৃত্তের দিগুণ হইবে কেননা ১০ ফুট স্থ্র ৫ ফুট স্থ্রের দিগুণ।

বৃত্তের ন্যায় অন্যান্য অনেক বক্র রেখা আছে তাহাদেরও লক্ষণ আকৃতি এবং গুণ নিয়মিত হইয়াছে। বৃত্তাভাস অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি রেখা বৃত্তের পর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কিন্তু আমরা মৃহ্মুছঃ আর এক বক্র রেখা দেখিয়া থাকি তাহা নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি দারা উৎপন্ন হয়,—যদি কোন প্রস্তুর হাত হইতে অবক্ষিপ্ত কিয়া উর্দ্ধে ঋজুভাবে উৎক্ষিপ্ত হয় তবে সরল রেখার

line till it reaches the ground; as you may see by the figure in which water runs when forced out of a pump, or from a fire-pipe, or from the spout of a kettle or tea-pot. The line it moves in is called a parabola; every point of which bears a certain fixed relation to a certain point within it, as the circle does to its centre. Geometry teaches various properties of this curve: for example, if the direction in which the stone is thrown, or the bullet fired, or the water spouted, be half the perpendicular to the ground, that is, half way between being level with the ground and being upright, the curve will come to the ground at a greater distance than if any other direction whatever were given, with the same force. So that to make the gun carry farthest, or the fire-pipe play to the greatest distance, they must be pointed, not, as you might suppose, level or point blank, but about half way between that direction and the perpendicular. If the air did not resist, and so somewhat disturb the calculation. the direction to give the longest range ought to be exactly half perpendicular,

The oval or ellipse, is drawn by taking a string of any certain length, and fixing, not one end as in drawing the circle, but both ends to different points, and then carrying a point round inside the string, always keeping it stretched as far as possible. It is plain, that this figure is as regularly drawn as the circle, though it is very different from it; and you perceive that every point of its curve must be so placed, that the straight lines, drawn from it to the two points where the string

নাায় গমন করে কিন্তু যদি সম্প্রে নিক্ষিপ্ত হয় তবে বক্ত রেখার স্বরূপ যাইয়া পরে ভূমিতে পড়ে, তাহার উদাহরণ— কোন পিছকিরি কিয়া দমকল অথবা গাড়ুর মুখ হইতে জল যে রূপে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা এই রেখার আকৃতি, এ রেখার নাম পেরাবলা অর্থাৎ ক্ষেপণীরেখা, বৃত্তের যেমত কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ তদ্রূপ এ রেখার সর্কাংশে অন্তরস্থ এক বিন্দুর সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ক্ষেত্র বিদ্যাতে এ রেখার অনেক গুণ জানা তাহার দৃষ্টান্ত। ভিমির উপর অন্ধলিম্ব ভাবে অর্থাৎ সরল এবং উর্দ্ধ লম্ব ইহাদের মধ্যস্থল দিয়া কোন প্রস্তর অথবা গুলি কিয়া জল প্রক্ষেপ করিলে সর্ব্বতোভাবে অধিক দ্রে পড়িবে ইহা ক্ষেত্র বিদ্যাতে জানা যায়, অন্য কোন দিকে ইহার তুল্য শক্তিতে নিক্ষেপ করিলে তাদৃক্দ্রে যাইবে না অতএব তোপের গুলি কিষা দমকলের জল অতি দূরে নিক্ষেপ করিতে হইলে সাধারণ লোকের অমুভবান্নসারে ঠিক সমান ভাবে লক্ষ্য করিয়া ত্যাপ করিতে হয় না কিন্তু সরল ভূমি ও উর্দ্ধ লম্ব ইহাদের মধ্যত্তল দিয়া নিক্ষেপ করিতে হয় বায়ুর ব্যাঘাতে প্রনার ব্যভিচার না জ্মিলে ঠিক মধ্য দিক দিয়া নিক্ষেপ করিলে সর্বতোভাবে অধিক দ্রে যাইবে।

বৃত্তাভাস অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি রেখা টানিবার ধারা এই, এক স্তুত্র লইয়া বৃত্ত অঙ্কনের ন্যায় কেবল একাগ্র হির না করিয়া উভয় প্রাস্তুত্র হির কর, পরে স্তুত্রের মধ্যে এক লেখনী দিয়া টান্ রাখিয়া রেখার অঙ্ক কর, তাহাতে যে আকৃতি উৎপন্ন হইবে সেই বৃত্তাভাস এবং তাহাবৃত্ত্রের ন্যায় নিয়মামুন্যারে অঙ্কিত হয় কিন্তু বৃত্ত্রের সহিত ইহার অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। বিবেচনা করিয়া দেখ এ রেখার স্কাংশ এমত প্রকারে স্থাপিত যে তাহার যেখান হইতে স্তুত্রের ছই অগ্রস্থ বিন্দু দ্বয় পর্যান্ত যত সরল রেখাদ্বয় টানিবা সে সকলের যোগ

was fixed, are, when added together, always the same; for they make together the length of the string.

Among various properties belonging to this curve, in relation to the straight lines drawn within it, is one which gives rise to the construction of the *tranmels*, or elliptic compasses, used for making figures and ornaments of this form; and also to the construction of lathes for turning oval frames, and the like.

If you wish at once to see these three curves, take a pointed sugar-loaf, and cut it any where clean through in a direction parallel to its base or bottom; the outline or edge of the loaf where it is cut will be a circle. If the cut is made so as to slant, and not be parallel to the base of the loaf, the outline is an ellipse, provided that the cut goes quite through the sides of the loaf all round, or is in such a direction that it would pass through the sides of the loaf were they extended; but if it goes slanting and parallel to the line of the loaf's side, the outline is a parabola: and if you cut in any direction, not through the sides all round, but through the sides and base, and not parallel to the line of the side, being nearer the perpendicular, the outline will be another curve, of which we have not yet spoken, but which is called an hyperbola. You will see another instance of it, if you take two plates of glass, and lay them on one another; then put their edge in water, holding them upright and pressing them together; the water, which, to make it more plain. you may colour with a few drops of ink or strong tea. rises to a certain height, and its outline is this curve:

সমান হইবে কেননা এমত প্রত্যেক রেখাদ্বয়ের যোগে স্থ্র পরিমাণ হইবে।

এই বক্র রেখার অন্তরস্থ সরল রেখা সম্বন্ধীয় যে২ গুণ আছে তম্মধ্যে একটা অতি প্রসিদ্ধ, তদ্মারা অপ্তাকার মূর্ত্তি ও অল-ক্কার করিবার কোম্পাস প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে অপ্তাকার ক:ঠাদি কাটিবার কুঁদ হয়।

এই২ বক্র রেখার উৎপত্তি যদি এক দৃষ্টিতে দেখিতে চাহ তবে অধিবাসের স্বস্থিক অর্থাৎ আগ নামক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া কোন স্থানে তাহার তলের সমানান্তরাল দিকে সম্পর্ণ ছেদ কর তাহাতে ঐ ছিন্ন আগের ধার বৃত্তাকৃতি হইবে যদি তলের সমানামরলে দিকে না কাটিয়া কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া ছেদ কর তবে আগের সমস্ত পার্স্ব ব্যাপিয়া ছেদ করিলে তাহাতে বৃত্তা-ভাস অর্থাৎ অগুাকৃতি রেখা উৎপন্ন হইবে কিন্তু যদি পাশ্বের সমানান্তরাল ভাবে ছেদ কর তবে তাহাতে পেরাবলা অর্থাৎ ক্ষেপণী রেখা জন্মিবে অপর সকল পার্ম না ব্যাপিয়া কেবল কিয়দংশ তল পর্যান্ত যদি ছেদ কর তাহাতে ছেদন যদি লম্বের নিকটতর হইয়া পার্শ্বের সমানান্তরাল না হয় তবে আর এক বক্র রেখার উৎপত্তি হইবে তাহার বর্ণনা এখনও হয় নাই তাহার নাম হাইপর্বলা। ইহার আর এক উদাহরণ এই যথা যদি ছই কাচের থাল একত্র দৃঢ় রূপে লম্বভাবে ধরিয়া জলের উপর রাথ এবং রেখা স্পায় করিবার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ মসী मिय्रा ঐজन कृष्ण्वर्ग कत তবে দেখিবা যে ঐ কাচদ্বয়ের মধ্যে জ্বল কিয়দ্দর পর্যান্ত উচিবে এবং উচিয়া যে আকার ধারণ করিবে তাহা এই বক্র রেখাস্বরূপ, এই রেখা যদিও বত্ত ও

which, however much it may seem to differ in formfrom a circle or ellipse, is found by mathematicians to resemble them very closely in many of its most remarkable properties.

These are the curve lines best known and most frequently discussed; but there are an infinite number of others all related to straight lines and other curve lines by certain fixed rules: for example, the course which any point in the circumference of a circle, as a nail in the felly of a wheel rolling along, takes through the air, is a curve called the cycloid, which has many remarkable properties; and among others, this, that it is, of all lines possible, the one in which any body, not falling perpendicularly, will descend from one point to another the most quickly. Another curve often seen is that in which a rope or chain hangs when supported at both ends: it is called the Catenary, from the Latin for chain; and in this form some arches are built. The form of a sail filled with the wind is the same curve.

ALGEBRA.—To define and explain Algebraical Signs.

—ART. 1. The method of representing the relation of abstract quantities by letters and characters, which are made the signs of such quantities and their relations, is called ALGEBRA.

Known or determined quantities are usually represented by the first letters of the alphabet, a, b, c, d, &c. and unknown or undetermined quantities by the last y, x, w, &c.

√ব্ভাভাস হইতে ভিন্ন বোধ হয় তথাপি মাথেমেটিক বিদ্যাতে পারদর্শি পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে এ রেখা বৃত্ত ও বৃত্তাভাসের সহিত অনেক আশ্চর্যা বিষয়ে তুল্য।

এই ২ বক্র রেখা অতি প্রাসিদ্ধ ও সর্বাদা বর্ণিত হইয়া থাকে কিন্তু এতদ্বিদ্ধ অন্যান্য অনেক বক্র রেখা আছে যাহার সহিত সরল রেখার ও অপর কুটিল রেখার নিয়মিত রূপে বহু সম্বন্ধ আছে তাহার উদাহরণ—গমনশীল চক্র নেমির নধ্যস্থ প্রেকের ন্যায় কোন জঙ্গন বৃত্ত পরিধিস্থ বিন্দু অমণ করত শূন্যে যে রেখা অক্ষিত করে তাহাকে সাইক্রৈড অর্থাৎ স্যন্দন রেখা কহে ইহার অনেক আশ্চর্য্য গুণ আছে তাহার মধ্যে এক গুণ এই যে কোন পতনশীল বস্তু ঋজুভাব বর্জ্বিয়া এই রেখার ন্যায় অবিক্ষিপ্ত হইলে স্ক্রাপেক্ষা শীত্র পতিত হয়। অন্য এক বক্র রেখা এই যাহা কোন রজ্জু কিয়া শৃদ্ধল ছই প্রাস্তভাগে বদ্ধ থাকিয়া বুলিলে উৎপন্ন হয় ইহাকে কেটিনেরি অর্থাৎ শৃদ্ধল রেখা কহে, কোন ২ থিলানের নির্মাণ এই রেখার ধারাতে হয় নৌকার পালি বায়ুতে ক্ষীত হইলেও এই রেখা স্বন্ধপ হয়

বীজ গণিত। — অথ বীজ গণিতের চিচ্ছ নিরূপণ।

>। কোন২ অক্ষর এবং অঙ্ককে সামান্য রাশির স্বরূপ কল্পনা
করিয়া তচ্ছারা ঐ রাশির সম্বন্ধ প্রকাশ করিবার ধারাকে বীজ
গণিত কহা যায়।

দৃষ্ট অর্থাৎ নিশ্চিত রাশি এস্থলে হলবর্ণে উক্ত হইবে যথা ক খ গ ঘ ইত্যাদি, অদৃশ্য অর্থাৎ অনিশ্চিত রাশি স্ব্র বর্ণে উক্ত হইবে—যথা অ ই উ ইত্যাদি। The following signs are made use of to express the relations which the quantities bear to each other:

2. + Plus, signifies that the quantity to which it is prefixed must be added. Thus a + b signifies that the quantity represented by b is to be added to the quantity represented by a; if a represent 5, and b, 7, then a + b represents 12.

If no sign be placed before a quantity, the sign + is understood. Thus a signifies +a.

- 3. Minus, signifies that the quantity to which it is prefixed must be subtracted. Thus a b signifies that b must be taken from a; if a be 7, and b, 5, a b expresses 7 diminished by 5, or 2.
- 4. \times Into, signifies that the quantities between which it stands are to be multiplied together. Thus $a \times b$ signifies that the quantity represented by a is to be multiplied by the quantity represented by b, if a represent 5, and b 6, then $a \times b$ is 5×6 and amounts to 30.

This sign is frequently omitted; thus abc signifies $a \times b \times c$, or a full point is used instead of it; thus $1 \times 2 \times 3$, and $1 \cdot 2 \cdot 3$ signify the same thing.

5. If in multiplication the same quantity be repeated any number of times, the product is usually expressed by placing above the quantity the number which represents how often it is repeated; thus a, $a \times a$, $a \times a \times a$, $a \times a \times a$, and a^1 , a^2 ; a^3 , a^4 , have respectively the same signification. These quantities are called *powers*; thus a^1 , is called the *first power*.

বিবিধ রাশির মধ্যে পরস্পার যে সম্বন্ধ থাকে তাহা সামান্য রীত্যনুসারে পশ্চাৎ লিখিত চিহ্ন দারা উক্ত হয়।

২। + ইহার নাম ধন। এ চিহ্ন যে রাশির পূর্ব্বে থাকিবে তাহাকে অন্য কোন রাশির সহিত যোগ করিতে হইবে যথা ক + খ ইহার অর্থ এই যে খ লক্ষিত রাশি ক লক্ষিত রাশির সহিত যোগ হইবে, ক যদি ৫ ও খ যদি ৭ হয় তবে ক + খ ১২ হইবে।

যে রাশির পূর্ব্বে কোন চিহ্ন থাকিবে না সেখানে 🕂 অর্থাৎ ঠিক দিবার চিহ্ন উহা করিতে হইকোঁ

৩। — ইহার নাম ঋণ। এ চিহ্ন যে রাশির পুর্বের থাকিবে তাহাকে অন্য কোন রাশি হইতে ব্যবকলন করিতে অর্থাৎ বাকি কাটিতে হইবে যথা ক — খ এস্থলে ক লক্ষিত রাশি হইতে খ লক্ষিত রাশিকে বাকি কাটিতে হইবে। যদি ক প ও খ ৫ হয় তবে ক—খ ২ হইবে অর্থাৎ প হইতে ৫ বাকি কাটিলে যাহা থাকে তাহা হইবে।

৪। × ইহার নাম গুণ। যে২ রাশির মধ্যে এ চিহ্ন থাকিবেক তাহাদের পরস্পর গুণ করিতে হইবে যথ। ক × খ ইহার অর্থ এই যে ক লক্ষিত রাশি খ লক্ষিত রাশির দারা গুণিত হইবে, যদি ক ৫ এবং খঙ হয় তবে ক × খ অর্থাৎ ৫ × ৬ গুণ দারা ৬০ হইবে।

এই গুণ চিহ্ন কখন২ উক্ত থাকে না উহ্ন করিতে হয় যথা কখন একত্র থাকিলে ক \times খ \times গ বুঝায়—আর কখন এ চিহ্নের পরিবর্ত্তে এক বিন্দু মাত্র লেখা যায় যথা ১.২.৩ ইহার অর্থ ১ \times ২ \times ৩।

 $oldsymbol{e}$ । গুণ করণে যদি এক রাশি অনেক বার উক্ত হয় তবে যত রার উক্ত হয় তত সংখ্যক অঙ্ককে ঐ রাশির উপর চিহ্নিত করিলে ফল ব্যক্ত হইবে যথা ক, ক imes ক, ক imes ক, ক imes ক, ক of a; a^2 , the second power, or square of a; a^3 , the third power, or cube of a; a^4 , the fourth power, or biquadrate of a.

The numbers 1, 2, 3, 4, &c. are called the *indices* of a; or *exponents* of the powers of a.

- 6. \div Divided by, signifies that the former of the quantities between which it is placed is to be divided by the latter. Thus, $a \div b$ signifies that the quantity a is to be divided by b.
- 7. A line drawn over several quantities signifies that they are to be taken collectively, and it is called a vinculum. Thus $a-b+c \times d-e$ signifies that the quantity represented by a-b+c is to be multiplied by the quantity represented by d-e. Let a stand for 6; b, 5; c, 4; d, 3; and e, 1; then a-b+c is a-c is a-c in a-c in a-c in a-c in a-c is a-c in a-c in

Instead of a line, brackets are sometimes used, as $(ab-cd)^2$, $\{a-b+c\}$. $\{d-e\}$.

- 8. = Equal to, signifies that the quantities between which it is placed are equal to each other, thus ax by = cd + ad, signifies that the quantity ax by is equal to the quantity cd + ad.
- 9. The square root of any proposed quantity is that quantity whose square, or second power, gives the proposed quantity.

ক \times ক এই কএক রাশি প্রকারান্তরে কং, কং, কং, এই রূপে লিখা যায়। এই২ অঙ্ককে ঘাত কছে, যথা কং ক রাশির এক ঘাত, কং ক রাশির দ্বি ঘাত অর্থাৎ বর্গ, কং ক রাশির দ্রি ঘাত অর্থাৎ বর্গ, কং ক রাশির দ্রি ঘাত অর্থাৎ ঘন, কং ক রাশির চতুর্ঘাত, এস্থলে ১,২,৩,৪ এই২ অঙ্ককে ক রাশির ঘাত সাপক কছে।

় ৬।÷ ইহার নাম হরণ। যে২ রাশির মধ্যে এ চিহ্ন থাকে ভাহার প্রথ্মকে দ্বিতীয় দারা হরণ করিতে হয় যথা ক ÷ খ ইহার অর্থ খ দারা ক রাশির হরণ।

৭ যদি কোন হ্রাশির উপর রেখা অক্কিত থাকে তবে ঐ রাশির সমুচ্চয় লইয়া বিহিত কার্য্য করিতে হইবে আর সেরেখার নাম শৃখল যথা ক — খ + গ × ঘ — ও ইহার অর্থ যে ক — খ + গ এ বর্ণ সমূহে লক্ষিত রাশিকে ঘ — ও এই হবর্ণ লক্ষিত রাশির দারা গুণ করিতে হইবে, যদি ক ৬ হয় এবং খ ৫, গ ৪, ঘ ৩, ও ১ হয় তবে ক — খ + গ ৬ — ৫ + ৪ অর্থাৎ ৫ এবং ঘ — ও ৩ — ১ অর্থাৎ ২। অতএব ক — খ + গ × ঘ — ও ৫ × ২ অর্থাৎ ১০। কখ — গঘ × কথ — গঘ অথবা কখ — গঘ । ইহার অর্থ যে কশ্ব — গঘ এই রাশি আপনার দারা গুণ হইবে।

কখন২ পূর্ব্বোক্ত রেখা না লিখিয়া এই২ চিহ্ন () } লিখা যায় ভাহারও ঐ অর্থ যথা (কখ — গঘ), {ক —খ + গ {· }ঘ — ড {·

৮। = সমান। যে২ রাশির মধ্যে এ চিহ্ন থাকে তাহারা পরস্পার সমান জানিবা যথা কঅ — খই = গঘ + কঘ অর্থাৎ কঅ — খই, গঘ + কঘ সহিত সমান্ত।

৯। বর্গ মূলের অর্থ এই যে যে রাশির দ্বিঘাত অর্থাৎ বর্গ করিলে নির্দ্দিন্ট রাশি উৎপন্ন হয় দেই রাশি ইহার বর্গমূল।

- 10. If the root cannot be exactly determined, . the quantity is called irrational or surd.
- 11. Points are made use of to denote proportion, thus a:b::c:d, signifies that a bears the same proportion to b that c bears to d.
- 12. The number prefixed to any quantity, and which shows how often it is to be taken, is called its co-efficient. Thus, in the quantities 7ax, 6by, and 3dz, 7, 6, and 3 are called the co-efficients of ax, by and dz respectively.

When no number is prefixed, the quantity is to be taken once, or the co-efficient 1 is understood.

These numbers are sometimes represented by letters, which are called co-efficients.

13. Similar, or *like* algebraical quantities are such as differ only in their co-efficients; 4a, 6ab, $9a^2$, $3a^2$ bc, are respectively similar to 15a, 3ab, $12a^2$, $15a^2bc$, &c.

Unlike quantities are different combinations of letters; thus, ab, a2b, ab2, abc, &c. are unlike.

- 14. A quantity is said to be a *multiple* of another, when it contains it a certain number of times exactly; thus 16a is a multiple of 4a, as it contains it exactly four times.
- 15. A quantity is called a measure of another, when the former is contained in the latter a certain number of times exactly; thus, 4a is a measure of 16a.
- 16. To add and subtract simple Algebraical Quantities.—The addition of algebraical quantities is performed by connecting those that are unlike with their proper

১০। যদি মূল শুদ্ধরূপে নির্ণয় না হয় তবে তাহাকে করণী কহে।

১১। অমূপাত প্রকাশার্থে কএক বিন্দুর ব্যবহার হয় যথা ক: খ:: গ: ঘ ইহার অর্থ যাদৃশ খর সহিত কর অমূপাত তাদৃশ ঘর সহিত গর অমূপাত।

১২। যে অক্ষ কোন রাশির অণ্যে সংলগ্ন থাকিয়া কত গুণ হইবে তাহা প্রকাশ করে তাহাকে ঐ রাশির প্রকৃতি কহে যথা ৭কঅ, ৬খই, ৩গউ, এস্থলে ৭, ৬, ৩ ইহার। কঅ, খই, গউ এই২ রাশির প্রকৃতি অর্থাৎ গুণ্য বোধক।

যথন রাশির অগ্রে কোন অঙ্ক সংলগ্ন না থাকে তথন সে রাশিকে এক গুণ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি ১ উছ্ হইবে। কথন২ পূর্ব্ব অক্ষরকেও প্রকৃতি কহে।

১৩। বীজ গণিতে যে২ রাশির বৈলক্ষণ্য কেবল প্রকৃতি বশতঃ হয় তাহাদিগকে সজাতীয় কহে যথা ৪ক, ৬কখ, ৯ক², ৩ ক² খগ এবং ১৫ক, ৩কখ, ১২ক², ১৫ক²খগ ইহারা ক্রমে২ পরস্পার সজাতীয়।

যাহাদের বৈলক্ষণ্য ভিন্ন২ বর্ণের সংযোগে হয় তাহাদিগকে বিজ্ঞাতীয় রাশি কহে। যথা কথ, কংখ, কখং, কখগ, ইহারা সকলেই বিজ্ঞাতীয় রাশি।

১৪। এক রাশি অন্য রাশির দারা শুদ্ধ ভাজ্য হইলে দেই ভাজ্য রাশিকে ঐ অন্য রাশির অপবর্ত্ত্য কহে যথা ১৬ক, ৪ কর অপ বর্ত্ত্য, কেননা ১৬ক, ৪ কর ঠিক চতুর্গুণ, সুতরাং শুদ্ধ ভাজ্য।

১৫। এক রাশি অন্য রাশির শুদ্ধ ভাজক হইলে তাহাকে ঐ রাশির অপবর্তুক কহে যথা ৪ক, ১৬ কর অপবর্ত্তক।

১৬। অথ বীজগণিতে সঙ্কলন ব্যবকলনের ধারা। বিজাতীয় বর্ণকে আপন ২ চিচ্ছের সহিত সংযুক্ত কর ও সজাতীয় রাশিকে একত্র যোগ কর তাহাতে সঙ্কলন হইবে। যদি সজাতীয় signs, and collecting those that are *similar* into one sum. If *like* quantities have different signs, subtract the less from the greater and prefix the sign of the greater to the difference which will be their sum.

Examples:

\mathbf{Add}	\mathbf{Add}
4 x	5 a x
3x	-a.r
7 a	6 y
—2 u	— c y
a 7x + 5a	Sum $4ux + by$

Sum
$$7x + 5a$$
 Sum $4ax + by - cy$
 $a + 2bx - y^2$ $a + 3b$
 $b - bx + 3y^2$ $a + n - 4b$

Sum
$$a+b+bx+2y^2$$
 Sum $2a+n-b$

17. Subtraction, or the taking away of one quantity from another, is performed by changing the sign of the quantity to be subtracted, and then adding it to the other by the rules laid down in Art. 16.

From
$$7x$$
 From $7x+5a$
Subtract x Subtract $3a-x$
Diff. $7x-x$ or $6x$ Diff. $7x+x+5a-3a$
or $8x+2a$
From $4x^2+5ax-y^2$

Subtract
$$3x^2 + 3ax + y^2$$

Diff. $x^2 + 8ax - 2y^2$

নরাশির ভিন্ন২ চিহ্ন থাকে তবে লঘুতরকে গুরুতর হইতে বাকি কাটিয়া অবশিষ্টের পূর্বে গুরুতরের চিহ্ন লিখ তাহাতে উহা দের যোগ হইবে।

উদাহরণ।

যোগ ৭অ 🕂 ৫ক যোগ ৪কঅ 🕂 কই 🗕 গই

 ホ + २थञ — थर
 ホ + ७थ

 ヹ — थञ + ๑ थर
 ホ + ๒ — 8थ

যোগ ক + খ + খঅ + ২খ² যোগ ২ক + ট — খ
১৭। ব্যবকলন অর্থাৎ এক রাশি হইতে অন্য রাশির বিয়োগ
করিবার ধার। এই। যাহার বিয়োগ করিতে হইবে তাহার
চিচ্ছের বিপর্যায় করিয়া সঙ্কলনের পূর্ব্বোক্ত ধারামুসারে অন্য
রাশির সহিত যোগ কর যথা।

প্স হইতে
আ বিয়োগ কর
আবশিষ্ট প্স — আ অর্থাং ৬ অ
প্স + ৫ক হইতে
৩ক — আ বিয়োগ কর
আবশিষ্ট প্স + অ + ৫ক — ৩ক
আর্থাং ৮অ + ২ক
৪অ' + ৫কঅ — ই' হইতে
, ৩অ' — ৩কঅ + ই' বিয়োগ কর

अविगिष्ठे अरे + ৮कञ — २ हेर

18. To multiply simple Algebraical Quantities.—The multiplication of simple algebraical quantities must be represented according to the notation pointed out in Art. 4 and 5. Thus, $a \times b$, or ab, represents the product of a multiplied by b; abc, the product of the three quantities a, b, and c.

It is also indifferent in what order they are placed, $a \times b$ and $b \times a$ being equal.

19. If the quantities to be multiplied have co-efficients, these must be multiplied together as in common arithmetic; the literal product being determined by the preceding rules.

Thus, $3a \times 5b = 15ab$; because

$$3 \times a \times 5 \times b = 3 \times 5 \times a \times b = 15ab$$
.

20. If the multiplier or multiplicand consist of several terms, each term of the latter must be multiplied by every term of the former, and the sum of all the products taken for the whole product of the two quantities. For example,

$$(a+b)\times(c+d)=ac+bc+ad+bd.$$

21. If the quantities to be multiplied have both the same signs, the product shall have + before it; if they have different signs the product shall have minus. Thus $a \times b = ab$; $-a \times -b = ab$; $a \times -b = -ab$.

The following signs are also used as symbols in Geometry:—

+ unequal to

7 greater than

2 less than

≯ not greater than

A not less than

1 is perpendicular to

is parallel to

is not parallel to

· Because

:. therefore

2 angle

△ triangle

ফলের বর্ণ সমূহ যে অনুক্রনে থাকুক তাহাতে হানি নাই কেননা ক \times থ এবং থ \times ক উভয়ই সমান।

১৯। যদি গুণ্য রাশিদের কোন প্রকৃতি থাকে তবে গণিতীনু-সারে সে প্রকৃতির গুণ করিতে হইবে এবং অক্ষরের ফল পূর্বে ধারানুযায়ি হইবে। যথা ৩ক \times ৫খ = ১৫কখ কেননা ৩ \times ক \times ৫ \times খ = ৩ \times ৫ \times ক \times খ = ১৫কখ।

২০। যদি গুণক কিয়া গুণ্য রাশির অনেক অঙ্গ থাকে তবে প্রত্যেক অঙ্গকে পরস্পার গুণ করিতে হইবে এবং দে ফল সমূহের যোগে ঐ চুই রাশির ফল হইবে। উদাহরণ। (ক + থ) \times (গ + ঘ) = কগ + থগ + কঘ + থঘ।

২১ যদি গুণা গুণকের চিহ্ন সমান হয় তবে তাহাদের ফলের চিহ্ন + হইবে, যদি চিহ্ন সমান না হয় তবে ফলের চিহ্ন - হইবে। যথা ক \times খ = কথ; - ক \times - খ = কথ

এই২ চিহ্নপ্ত ক্ষেত্র ব্যবহারে প্রয়োগ হয়।

 ≠ অর্থাৎ অসমান
 || অর্থাৎ সমানান্তরাল

 ७ , বৃহত্তর
 || , সমানান্তরাল নহে

 ८ , লঘুতর
 ∴ , কেনন।

 ४ ,, বৃহত্তর নহে
 ∴ , অতএব

 ४ ,, লঘুতর নহে
 ८ ,, কোণ

 ⊥ ,, লয়
 △ ,, তিভুজ

ELEMENTS OF GEOMETRY.

BOOK I.

DEFINITIONS.

- I. "A point is that which has position, but not magnitude."
- II. A line is length without breadth.
- "COROLLARY. The extremities of a line are points; "and the intersections of one line with another are "also points."
- III. "If two lines are such that they cannot coincide "in any two points, without coinciding altogether, "each of them is called a straight line."
- "Cor. Hence, two straight lines cannot enclose a "space. Neither can two straight lines have a com"mon segment; for they cannot coincide in part,
 "without coinciding altogether."
- IV. A superficies is that which has only length and breadth.
- "Con. The extremities of a superficies are lines; the and the intersections of one superficies with another are also lines."
- V. A plane superficies is that in which any two points being taken, the straight line between them lies wholly in that superficies.
- VI. A plane rectilineal angle is the inclination of two straight lines to one another, which meet together but are not in the same straight line.
- N. B. "When several angles are at one point, B. "any one of them is expressed by three letters, of "which the letter that is at the vertex of the angle, "that is, at the point in which the straight lines that "contain the angle meet one another, is put between

ক্ষেত্র তত্ত্ব।

১ অধ্যায়।

সংজ্ঞা।।

- ১ যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু নহত্ত্ব অর্থাৎ রাশি নাই তাহাকে বিক্দ বলা যায়।
- ২ যাহার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তার নাই তাহাকে 🚁। কহা যায়।

অনুমান। রেখার সীমা বিন্দু, ছুই রেখার পরস্পর অবচ্ছে-দনেও বিন্দ উৎপন্ন হয়।

ও দুই রেখা পরস্পর সমুদ্য সংলগ্ন না হইলে এক বিন্দু ব্যতীত অন্য কোন বিন্দুতে যুদি সংলগ্ন হইতে না পারে তবে তাহা-দের প্রত্যেককে সরল রেখা কহা যায়।

অনুমান। অতএব ছুই সরল রেখাতে কোন ক্ষেত্র পরি-বেষ্টিত হইতে পারে না এবং ছুই সরল রেখার এক সাধারণ খণ্ডও থাকিতে পারে না কেননা তাহার। সর্বাংশে না মিলিয়া একাংশে মিলিতে পারে না।


৪ যাহার কেবল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে তাহাকে ধরাতল কহে।


অমুমান। ধরাতলের সীমা রেখা, এবং এক ধরাতল অন্য ধরাতলকে অবচ্ছিন্ন করিলে সে অবচ্ছেদনেতেও রেখার উৎ-পত্তি হয়।

- ধে ধরাতলে দুই বিন্দু লইলে তাহাদের যোজক সরল রেখা সর্বাংশে ঐ ধরাতলৈ সংলগ্ন থাকে তাহাকে সমধরা-তল কহা যায়।
- ৬ দুই সরল রেখা ভিন্ন২ দিকে আদিয়া সংস্পর্শ করিলে তাহা দের পরস্পর অবনতিকে সরল রৈখিক কোণ কহা যায়।


যদি এক বিন্দুতে (যথা খ চিহ্ন) অনেক কোণ থাকে তবে তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষ কোণকে উক্ত করিতে হইলে

"the other two letters, and one of these two is some"where upon one of those straight lines, and the other"
upon the other line; Thus the angle which is contained by the straight lines AB, CB, is named the
angle ABC, or CBA; that which is contained by
AB, BD is named the angle ABD, or DBA; and that
which is contained by DB, CB is called the angle
BBC, or CBD; but if there be only one angle at
a point, it may be expressed by a letter placed at
"that point; as the angle at E."






VII. When a straight line standing on another straight line makes the adjacent angles equal to one another, each of the angles is called a right angle; and the straight line which stands on the other is called a perpendicular to it.



VIII. An obluse angle is that which is greater than a right angle.




তিন অক্ষরের দারা করিতে হয়—কোণাপুে অর্থাৎ বেখানে সরল রেখাদ্য়ের সংস্পর্শ সেই স্থলের অক্ষিত অক্ষরকে মধ্যা-ক্ষর করিতে হয় আর যে রেখাদ্য়ের সংস্পর্শে কোণের উৎ-পত্তি হইয়াছে তাহাদের এক রেখার কোন অংশে লিখিত এক অক্ষর এবং অন্য রেখার কোন স্থলে লিখিত আর এক অক্ষর লইতে হয়—যথা নিমুস্থকের্তে কথ এবং গথ রেখাদ্য়ের মধ্যবর্ত্তি কোণকে কথগ কিয়া গথক কহিতে হয় এবং কথ ও খঘ দারা উৎপন্ন কোণকে কথঘ কিয়া ঘথক কহিতে হয়, ও ঘথ এবং গথ দারা উৎপন্ন কোণকে ঘথগ কিয়া গথম কহিতে হয়, কিয় এক চিহ্নে কেবল এক কোণ থাকিলে সেই চিহ্নস্থ অক্ষর দারা তাহা উক্ত হইতে পারে যথা ও কোণ।



 ৭ এক সরল রেখা অন্য সরল রেখার উপর দণ্ডায়মান হইলে যদি উভয় পাদ্ধের কোণ পর-'স্পর সমান হয় তবে ঐ প্রত্যেক কোণকে সমকোণ কহা যায়— আর এমত দণ্ডায়মান সরল রেখাকে লম্ব কহা যায়।

৮ সমকোণ হইতে অতিরিক্ত হইলে অধিক কোণ কছে।




IX. An acute angle is that which is less than a right angle.

X. A figure is that which is enclosed by one or more boundaries.—"The space contained within a figure

"is called the Area of the Figure."

XI. A circle is a plane figure contained by one line, which is called the circumference, and is such that all straight lines drawn from a certain point within the figure to the circumference, are equal to one another.



XII. This point is called the centre of the circle.

XIII. A diameter of a circle is a straight line drawn through the centre, and terminated both ways by the circumference.

XIV. A semicircle is the figure contained by a diameter and the part of the circumference cut off by the diameter.

XV. Rectilineal figures, are those which are contained by straight lines.


XVI. Trilateral figures or triangles, by three straight lines.

XVII. Quadrilateral, by four straight lines.

XVIII. Multilateral figures, or polygons, by more than four straight lines.

XIX. Of three-sided figures, an equilateral triangle is that which has three equal sides.

- ৯ সমকোণ হইতে অল্প হইলে লঘু কোণ কছে।
- ১০ যাহা এক কিয়া অনেক সীমাতে আবৃত তাহাকে আকৃতি কহে, আকৃতির আবৃত স্থলকে ক্ষেত্র ফল কহে।
- ১১ যাহার সীমা এক রেখাতে বদ্ধ এবং অন্তরে এমত এক বিন্দু আছে যে তথা হউতে যত সরল রেখা সীমা পর্যান্ত টান। গায় সকলি পরস্পার সমান, এমত সরল আকৃতিকে বৃত্ত কহা যায় আর ঐ সীমার নাম পরিধি।



- ১২ উক্ত অন্তরম্ব বিন্দর নাম কেন্দ্র।
- ১৩ বৃত্তের অন্তরে কেন্দ্রের মধ্য দিয়া ছুই দিকে পরিধি পয্যস্ত কোন সরল রেখা টানিলে তাহাকে ঐ বৃত্তের ব্যাস কহা যায়।
- ১৪ ব্যাস এবং পরিধির যে অংশ ব্যাস দারা ছিল এই ছুই সীমার মধ্যে যে আকৃতি থাকে তাহাকে অদ্বৃত্ত কছে।
- ১৫ সরল রেখার অন্তর্গত আকৃতিকে সরল রৈখিক ক্ষেত্র কছে।
- ১৬ তিন সরল রেখাবৃত ক্ষেত্রের নাম ত্রিভুজ।
- ১৭ চারি সরল রেখাবৃত ক্ষেত্রের নাম চতুর্ভুক্ত।
- ১৮ চারির অধিক সরল রেখাবৃত কেতের নাম বছকোণ কেতা।
- ১৯ তিন বাছ বিশি ট আকৃতির মধ্যে যাহার তিন বাছই সমান তাহাকে সমবাছ ত্রিভুক্ত কছে।


XX. An isosceles triangle is that which has only at two sides equal.



XXI. A scalene triangle is that which has three unequal sides.


XXII. A right-angled triangle is that which has a right angle.

XXIII. An obtuse-angled triangle is that which has an obtuse angle.



XXIV. An acute-angled triangle is that which has three acute angles.

XXV. Of four-sided figures, a square is that which has all its sides equal, and all its angles right angles.



XXVI. An oblong is that which has all its angles right angles, but has not all its sides equal.


২০ যাহার ছই বাছ সমান ভাহাকে সমদ্বিছ ত্রিভুক্ত কছে।







- ২১ যাহার তিন বাহু বিষম তাহাকে বিষমবাহু ত্রিভুক্ত কহে। ২২ যে ত্রিভুক্তের মধ্যে সম কোণ থাকে তাহাকে সমকোণি অথবা জাত্য ত্রিভুক্ত কহে।
- ২৩ যে ত্রিভুজের মধ্যে এক অধিক কোণ থাকে তাহাকে অধিক কোণি ত্রিভঙ্গ কহে।





- ২৪ যে ত্রিভুজের মধ্যেসকল কোণ লঘু, তাহাকে লঘু কোণি ত্রিভুজ কহে।
- ২৫ চতুর্জের মধ্যে যাহার চারি বাছ সমান ও চারি কোণ সমকোণ তাহাকে সমচতুর্জু বা সমচতুক্ষোণ অথবা বর্গ ক্ষেত্র কছে।





২৬ বে চতুর্ত্তর কোণ সকল সমকোণ কিছু সকল বাহ
পরস্পর সমান নহে তাহাকে আয়ত কহে।

XXVII. A rhombus is that which has all its sides equal, but its angles are not right angles.



XXVIII. A rhomboid is that which has its opposite sides equal to one another, but all its sides are not equal, nor its angles right angles.

XXIX. All other four-sided figures besides these are

called Trapeziums.

XXX. Straight lines which are in the same plane, and, being produced ever so far both ways, do not meet, are called *Parallel* Lines.

POSTULATES.

I. Let it be granted that a straight line may be drawn from any one point to any other point.

II. That a terminated straight line may be produced

to any length in a straight line.

III. And that a circle may be described from any centre, at any distance from that centre.

AXIOMS.

I. Things which are equal to the same thing are equal to one another.

II. If equals be added to equals, the wholes are equal.

III. If equals be taken from equals, the remainders are equal.

IV. If equals be added to unequals, the wholes are unequal.

২৭ যে চতুর্ভুজের সমস্ত বাহু পরস্পর সমান কিন্তু সকল কোণ সমকোণ নহে তাহাকে রম্বদ কহে।



- ২৮ যে চতুর্ভুক্তের সমূখক বাহু দ্বয় সমান কিন্তু সকল কোণ সমান নহে ও সমকোণও নহে তাহাকে রবৈষ্ড কহে।
- ২৯ এতদাতিরিক্ত অন্য প্রকার চতুর্ভুক্তকে বিষম চতুর্ভুক্ত কহে।
- ৩০ যে২ সরল রেখা এক সম ধরাতলে থাকিয়া উভয় পাখেঁ অবিশান্ত বৃদ্ধি পাইলেও পরস্পর সংস্পর্শ করে না তাহা-দিগকে সমানান্তরাল সরল রেখা কহে।

স্বীকার্য্য কথা।

- এক বিন্দু হইতে অন্য কোন বিন্দু পর্য্যন্ত সরল রেখা টানা যায় ইহা স্বীকার্য্য।
- ২ সীমা বিশিক্ত সরল রেখা যথেচ্ছ দৈর্ঘ্যে সরল ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে ইহা খীকার্য্য।
- ৩ কোন কেন্দ্ৰ হইতে যথেচ্ছ দূরে যত্র তত্র বৃত্ত আঁকা যায় ইহা স্বীকার্য্য।

শ্বতঃ সাধ্য।

- যে২ বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান তাহার। পরস্পর সমান।
- ২ সমান বস্তুতে সমান বস্তুর যোগ করিলে সমুদয় সমান হয়।
- ৩ সমান রস্তু হইতে সমান বস্তুর বিয়োগ করিলে অবশিউ সমান হয়।
- ৪ সমান বস্তু বিষম বস্তুতে যোগ করিলে সমুদয় বিষম হয়।

V. If equals be taken from unequals, the remainders are unequal.

VI. Things which are doubles of the same thing, are equal to one another.

VII. Things which are halves of the same thing, are equal to one another.

VIII. Magnitudes which coincide with one another, that is, which exactly fill the same space, are equal to one another.

IX. The whole is greater than its part.

X. All right angles are equal to one another.


XI. "Two straight lines which intersect one another, cannot be both parallel to the same straight line."

PROPOSITION I. PROBLEM.

To describe an equilateral triangle upon a given finite straight line.

Let AB be the given straight line; it is required to describe an equilateral triangle upon it.

From the centre A, at the distance AB describe (3 Post.) the circle BCD, and from the centre B, at the distance BA, describe the circle ACE; and from the point C, in



which the circles cut one another, draw the straight lines (1. Post.) CA, CB, to the points A, B; ABC is an equilateral triangle.

Because the point A is the centre of the circle BCD, AC is equal (11 Definition) to AB; and because the point B is the centre of the circle ACE, BC is equal to AB: But it has been proved, that CA is equal to AB; therefore CA, CB are each of them equal


- ে ৫ বিষম বস্তু হইতে সমান বস্তুর বিয়োগ করিলে অবশিউ বিষম হয়।
 - ৬ যে২ বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর দ্বিগুণ তাহারা পরস্পর সমান।
 - ৭্যে২ বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর আছে তাহারা পরস্পর সমান।
 - ৮ যে২ রাশি পরস্পর মিলে অর্থাৎ যাহারা এক স্থানকে ঠিক আবরণ করে তাহারা পরস্পর সমান।
 - ৯ অংশ হইতে সমুদয় বৃহৎ।
 - ১০ সকল সমকোণ পরস্পার সমান।
 - ১১ ছুই সরল রেখা পরস্পারকে অবচ্ছিন্ন করিলে উভয়ে কোন এক সরল রেখার সমানান্তরাল হইতে পারে না।

১ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

্রএক নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সরল রেখার উপর এক সমবাছ ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইবেক।

কথ এক নির্দিষ্ট সরল রেখা ইহার উপর এক সমবাছ ত্রিভুক্ত অঙ্কিত করিতে হইবে।

ক কেন্দ্র হইতে কথ দূর
পার্যস্ত এক বৃত্ত অক্টিত
কর তাহার নাম থগঘ
হউক এবং থ কেন্দ্র হইতে
থক দূর পর্যাস্ত আর এক
বৃত্ত অক্টিত কর তাহার
নাম কগঙ—যে বিন্দৃতে



এই হুই বৃত্ত পরস্পর অবচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ গ চিহ্ন, তথা হইতে ক এবং খ পর্য্যন্ত ছুই সরল রেখা টান অর্থাৎ কগ এবং খগ রেখাকর—তাহাতে কথগ এক সমবাছ ত্রিভুক্ত হইবে।

'উপপত্তি। খগঘ এক বৃত্ত ইহার কেন্দ্র ক অতএব (১১ সংজ্ঞামুসারে) ক্থ ও কগ এই চুই সরল রেখা পরস্পর to AB; now, things which are equal to the same thing are equal to one another (1 Axiom); therefore CA is equal to CB; wherefore CA, AB, CB are equal to one another; and the triangle ABC is therefore equilateral, and it is described upon the given straight line AB. which was required to be done.


Symbolical demonstration. AC = AB (11 Def.) CB = AB (11 Def.) $\therefore AC = CB = AB$ (1 Ax.)

PROP. II. PROB.

From a given point to draw a straight line equal to a given straight line.

Let A be the given point, and BC the given straight line; it is required to draw, from the point A, a straight line equal to BC.

From the point A to B draw (1 Post.) the straight line AB; and upon it describe (1.1.) the equilateral triangle DAB, and produce (2 Post.) the straight lines DA, DB, to E and F; from the centre B, at the distance BC, describe (3 Post.) the circle CGH, and from the centre D, at



the distance DG. describe the circle GKL. The straight line AL is equal to BC.

Because the point B is the centre of the circle CGH, BC is equal (11 Def.) to BG; and because D is the centre of the circle GKL, DL is equal to DG, and DA, DB, parts of them, are equal; therefore the re-

সনান এবং কগঙ এক বৃত্ত ভাহার কেন্দ্র থ অতএব (১১ সংজ্ঞান্ত্রারে) কথ ও থগ এই তৃই সরল রেখা পরস্পর সনান, স্তৃত্রাং কগ ও থগ প্রত্যেকে কথ রেখার সহিত সমান হওয়াতে (১ স্বতঃসাধ্যানুসারে) কথ কগ খগ এতিন সরল রেখা পরস্পর সনান এবং ত্রিনিত্তে কথগ এক সমবাহু ত্রিভুজ।


সঙ্গেতে উপপত্তি। কগ — কথ (১১ সংজ্ঞা)। খগঁ — কথ (ঐ) ∴ কগ — খগ — কথ (১ স্তঃসাধ্য)।

২ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে এক নির্দিষ্ট সরল রেখার সমান অঃর এক সরল রেখা টানিতে হইবে।

ক এক নির্দ্দিই বিদ্দু—খগ এক নির্দ্দিই সরল রেখ:—ক বিদ্দু ছইতে খগ সরল রেখার সমান এক সরল রেখা টানিতে হইবেক.

ক এবং খ এক সরল রেখাতে
সংযুক্ত কর—কথ সরল রেখার উপর
(১ প্রতিজ্ঞান্তসারে) কথদ এক সমবাগ্র্
ত্রিভুক্ত অঙ্কিত কর—ঘথ এবং ঘক এই
ছুই সরল রেখাকে চ এবং ও বিন্দু
পর্যাস্য টান—খ বিন্দকে কেন্দ্র করিয়া



খগ দূর পর্যান্ত এক বৃত্ত অক্ষিত কর—অর্থাৎ গছজ, এবং ঘ বিন্দু হইতে ঘছ দূর পর্যান্ত এক বৃত্ত অক্ষিত কর অর্থাৎ ছঠট —কঠ এই সরল রেখা খগ সরল রেখার সহিত সমান.

উপপত্তি। গছজ এই বৃত্তের কেন্দ্র থ অতএব খগ এবং খছ পরস্পর সমান—এবং ছঠট এক বৃত্ত, ইহার কেন্দ্র ঘ, অতএব ঘছ ঘঠ পরস্পর সমান—এবং কথঘ সমবাছ ত্রিভুজ এজন্য ঘথ এবং ঘক পরস্পর সমান—অতএব সমুদয় ঘছ এবং সমুদয় ঘঠ পরস্পর সমান সভ্তে তাহোদের অংশ ঘথ এবং ঘক পরস্পর সমান হওয়াতে অবশিক্ট খছ এবং কঠ পরস্পর

mainder AL is equal to the remainder (3 Ax.) BG: But it has been shown, that BC is equal to BG; wherefore, AL and BC are each of them equal to BG; and things that are equal to the same thing are equal to one another; therefore the straight line AL is equal to BC. Wherefore, from the given point A, a straight line AL has been drawn equal to the given straight line BC. Which was to be done.


Sym. dem.—BC = BG (11 Def.) DL = DG (11 Def.) DA = DB (by construction) \therefore DL—DA (or AL) = DG—DB (or BG) (3 Ax.) but BG = BC \therefore AL= BC (1 Ax.)

PROP. III. PROB.

From the greater of two given straight lines to cut off a part equal to the less.

Let AB and C be the two given straight lines whereof AB is the greater. It is required to cut off from AB, the greater, a part equal to C, the less.

From the point A draw (2 I.) the straight line AD equal to C;



and from the centre A, and at the distance AD, describe (3 Post.) the circle DEF; and because A is the centre of the circle DEF, AE is equal to AD; but the straight line C is likewise equal to AD; whence AE and C are each of them equal to AD; wherefore, the straight line AE is equal to (1 Ax.) C, and from AB the greater of two straight lines, a part AE has been cut off equal to C the less. Which was to be done.


C = AD (by construction) AE = AD (1 Def.) C = AE (1. Ax.) সমান নিশ্চয় হইল, আর পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে খছ এবং খগ পরস্পর সমান স্থতরাং খগ এবং কঠ প্রত্যেকে খছ সহিত্ত সমান, অতএব কঠ রেখা খগ রেখার সহিত সমান। এইরূপে ক বিন্দু হইতে খগ দৃষ্ট রেখা তুল্য অন্য এক েখা অঙ্কিত হইল।

সক্ষৈতে উপপত্তি। খগ = খছ (১১ সংজ্ঞা) ঘছ = ঘঠ (১১ সংজ্ঞা) ঘখ = ঘক $\cdot \cdot \cdot$ ঘছ — ঘথ (অর্থাৎ খছ) = ঘঠ— ঘক (অর্থাৎ কঠ) $\cdot \cdot \cdot$ কঠ = খছ = খগ (১ স্বতঃ সাধ্য)।

৩ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

ছুই সরল রেখার মধ্যে বৃহত্তর হুইতে লছুতরের সমান এক জংশ ছেদ করিতে হুইবে।

কথ এবং গ ছই সরল রেথা তাহার মধ্যে কথ বৃহত্তর, কথ হইতে গ সমান এক অংশ ছেদ করিতে হইবে।



ক বিন্দু হাইতে গ সমান এক সরল রেখা (২ প্রতিজ্ঞানুসারে) টান অর্থাং কঘ রেখা কর এবং ক কেন্দ্র হইতে কঘ দূর পর্যান্ত মঙ্চ এক বৃত্ত অঙ্কিত কর। কণ্ড সরল রেখা গ সমান হইয়া কথ হইতে ছিন্ন হইল।

উপপত্তি: ক কেন্দ্র ইইতে কঘ পর্যান্ত ঘণ্ডচ এক বৃত্ত অঙ্কিত ইইয়াছে অতএব কঘ এবং কঙ পরস্পার সমান, অপর ক্য এবং গ পরস্পার সমান, অতএব কঙ এবং গ প্রত্যেকে ক্য সমান, স্থতরাং কঙ এবং গ পরস্পার সমান। এইক্লপে কথ বৃহত্তর রেখা হইতে গ সমান এক অংশ ছিল হইল।


সক্ষেতে উপপত্তি। ·গ — কঘ। কঘ — কঙ (১১ সংজ্ঞা) গ — কঘ — কঙ (১ স্বতঃসাধ্য)।

PROP. IV. THEOREM.

If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, each to each; and have likewise the angles contained by those sides equal to one another, their bases or third sides are equal; and the areas of the triangles are equal; and their other angles are equal, each to each, viz. those to which the equal sides are opposite*.

Let ABC, DEF be two triangles which have the two sides AB, AC equal to the two sides DE, DF,

each to each, viz. AB to DE, and AC to DF; and let the angle BAC be also equal to the angle EDF: then shall the base BC be equal to the base EF; and



the triangle ABC to the triangle DEF; and the other angles, to which the equal sides are opposite, shall be equal, each to each, viz. the angle ABC to the angle DEF, and the angle ACB to DFE.


For, if the triangle ABC be applied to the triangle DEF, so that the point A may be on D, and the straight line AB upon DE; the point B must coincide with the point E, because AB is equal to DE; and AB coinciding with DE, AC must coincide with DF, because the angle BAC is equal to the angle EDF; wherefore also the point C must coincide with the

^{*} The three conclusions in this enunciation are more briefly expressed by saying, that the triangles are in every way equal.

৪ প্রতিক্তা—উপপাদ্য।

ছই ত্রিভুজের মধ্যে যদি একটার ছই বাছ অন্যের ছই বাছর সহিত প্রত্যেকে সমান হয় এবং ঐ বাছদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি কোণ দ্বয়ও যদি পরস্পার সমান হয় তবে ঐ ত্রিভুজ দ্বয়ের ভূমি অর্ধাৎ অবশিষ্ট বাছও পরস্পার সমান হইবে এবং ঐ ত্রিভুজ ক্ষেত্রদ্বয়ও পরস্পার সমান হইবে এবং সমান বাছর সশ্মুখস্থ অবশিষ্ট কোণ্ড পরস্পার সমান হইবে*।

কখগ এবং ঘণ্ডচ ছুই
ত্রিভুক্ত, তাহার নধ্যে কথ
এবং কগ, ঘণ্ড এবং ঘচ
পরস্পর ক্রমশ সম!ন
অর্থাৎ কথ, ঘণ্ড সহিত,
ওকগ, ঘচ সহিত সমান,
এবং থকগ এই কোণ



ঙঘচ কোণের সহিত সমান, অতএব থগ এই ভূমি ওচ ভূমির সহিত সমান এবং কথগ এই ত্রিভুজ ঘওচ ত্রিভুজের সহিত সমান এবং তাহাদের সমান২ বাহুর সন্মুখন্থ কোণ্ড পরস্পার সমান অর্থাৎ কথগ এই কোণ্ ঘওচ কোণের সহিত সমান ও কগথ এই কোণ্ ঘচঙ কোণের সহিত সমান।

উপপত্তি। যদি কথগ এই ত্রিভুজ ঘঙচ ত্রিভুজের উপর এমত প্রকারে রাখ যে ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপর পড়ে এবং কথ এই সরল রেখা ঘঙ এই সরল রেখার উপর পড়ে, তবে থ বিন্দুও ও বিন্দুর উপর অবশ্য পড়িবে কেননা কথ এবং ঘঙ পরস্পর স্নান, এবং কথ ও ঘঙ নিলিত হইলে কগ রেখা ঘচ সহিত্রিলিবে কেননা খকগ এই মধ্যবর্ত্তি কোন ওঘচ মধ্যবর্ত্তি কোনের সহিত রমান, এবং কগ, ঘচ সহিত মিলিলে গও তদ্ধপ চ

^{*} এই 🏰 তিজ্ঞার তিন সাধ্য একেবারে নির্দেশ হইতে গারে যথা ছই তিভূজ সর্পতোভাবে সমান।

point F, because AC is equal to DF: But the point B coincides with the point E; wherefore the base BC must coincide with the base EF (Cor. Def. 3.), and be equal to it. Therefore also, the whole triangle ABC must coincide with the whole triangle DEF, so that the spaces. which they contain, or their areas (3. Ax.) are equal; and the remaining angles of the one must coincide with the remaining angles of the other, and be equal to them viz. the angle ABC to the angle DEF, and the angle ACB to the angle DFE. Therefore, if two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, each to each, and have likewise the angles contained by those sides equal to one another: their bases are equal, and their areas are equal, and their other angles, to which the equal sides are opposite, are equal, each to Which was to be demonstrated.

Sym. dem.—B coincides with E : AB = DE; AC coincides with $DF : AC = \angle EDF$; C coincides with F : AC = DF : BC coincides with EF (cor. 3 def.) $BC = EF (8 Ax.) \triangle ABC = \triangle DEF$; $\angle ABC = \angle DEF$; $\angle ACB = \angle DFE (8 Ax.)$

PROP. V. THEOR.

The angles at the base of an isosceles triangle are equal to one another; and if the equal sides be produced, the angles upon the other side of the base shall also be equal.

Let ABC be an isosceles triangle, of which the side AB is equal to AC, and let the straight lines, AB AC be produced to D and E: the angle ABC shal be equal to the angle ACB, and the angle CBD to the angle BCE.

In BD take any point F, and from AE the greate cut off AG equal (3. 1.) to AF the less, and join FC GB.

Because AF is equal to AG, and AB to AC, the tw sides FA, AC are equal to the two GA, AB, each 1

উপর পড়িবে কেননা কগ, ঘচ সহিত সমান অতএব থ বিদ্ধু ও সহিত এবং গ বিদ্ধু চ সহিত মিলিলে (৩ সংজ্ঞার অন্থমানানুসারে) থগ ভূমিও ওচ ভূমির সহিত মিলিয়া সমান হইবে
স্থতরাং কথগ এই সমস্ত ত্রিভুজ ঘওচ ত্রিভুজের সহিত সমাক্
য়িলিয়া পরস্পর সমান হইবে, এবং একটার অবশিষ্ট কোণ
দ্বয় অন্যটীর অবশিষ্ট কোণ দ্বয়ের সহিত মিলিবে ও সমান
হইবে অর্থাৎ কথগ এবং ঘণ্ডচ পরস্পর সমান হইবে এবং
কগথ ও ঘচঙ পরস্পর সমান হইবে। অতএব ছই ত্রিভুজের মধ্যে যদি একটার ছই বাছ অন্যের ছই বাছর সহিত
প্রত্যেকে সমান হয় এবং ঐ বাছ দ্বরের মধ্যবর্ত্তি কোণ দ্বয়ও
যদি পরস্পর সমান হয় তবে ঐ ত্রিভুজ দ্বরের ভূমি অর্থাৎ
অবশিষ্ট বাছও পরস্পর সমান হইবে এবং এ ছই ত্রিভুজ্ঞও
পরস্পর সমান হইবে এবং সমান বাছর সম্মুত্ব অবশিষ্ট কোণও
পরস্পর সমান হইবে।


সংক্ষতে উপপত্তি। খ, ও সহিত মিলিবে $\cdot \cdot \cdot$ কথ = ঘণ্ড। কগ, ঘচ সহিত মিলিবে $\cdot \cdot \cdot \angle$ থকগ $= \angle$ ওঘচ। গ, চ সহিত মিলিবে $\cdot \cdot \cdot$ কগ = ঘচ $\cdot \cdot \cdot$ খগ, ওচ সহিত মিলিবে (৩ সংজ্ঞার অমুমান) $\cdot \cdot \cdot$ খগ = ওচ (৮ স্বতঃ স্বাধ্য) \triangle কথগ = \triangle ওঘচ, এবং \angle কথগ = \angle ঘচঙ।

৫ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

সমদিবাছ ত্রিভুজের ভূমিতে সংলগ্ন কোণদ্বয় পরস্পার সমান এবং যদি সমান বাছদ্বয়ের বৃদ্ধি করা যায় তবে ভূমির অপর পার্শ্বস্থ কোণদ্বয়ও সমান হইবে।

কথগ এক সমদ্বিকাছ ত্রিভুজ যাহার কথ বাছ কগ বাছর সহিত সমান। এই বাছদ্বয় ঘ এবং ও পর্যান্ত বৃদ্ধি পাউক কথগ কোণ কগথ কোণের সহিত সমান এবং গ্রথঘ কোণ খগঙ কোণের সহিত সমান হইবে।

শ্বর্থ সর্ত্রত রেখার মধ্যে কোন এক বিন্দুর নির্দেশ কর যথা চ এবং (৩ প্রতিজ্ঞান্ত্রসারে) কঙ বৃহত্তর হুইতে কচ লঘুতরের each; and they contain the angle FAG common to the two triangles, AFC, AGB: therefore the base FC is equal (4.1.) to the base GB, and the triangle AFC to the triangle AGB; and the remaining angles of the one are equal (4.1.) to the remaining angles of the other, each to each, to which the equal sides




are opposite, viz. the angle ACF to the angle ABG, and the angle AFC to the angle AGB: And because the whole AF is equal to the whole AG and the part AB to the part AC; the remainder BF is equal (3 Ax.) to the remainder CG; and FC was proved to be equal to GB; therefore the two sides BF, FC are equal to the two CG, GB, each to each; but the angle BFC is equal to the angle CGB; wherefore, the triangles BFC, CGB are equal, (4. 1.) and their remaining angles are equal, to which the equal sides are opposite; therefore the angle FBC is equal to the angle GCB, and the angle BCF to the angle CBG. Now, since it has been demonstrated, that the whole angle ABG is equal to the whole ACF, and the part CBG to the part BCF, the remaining angle ABC is therefore equal to the remaining angle ACB, which are the angles at the base of the triangle ABC: And it has also been proved, that the angle FBC is equal to the angle GCB, which are the angles upon the other side of the base. Therefore, the angles at the base, sc. Q. E. D.

COROLLARY. Hence, every equilateral triangle is als) equiangular.

সমান এক অংশ ছেদ কর যথা কছ। এবং চ, গ ও ছ, খ, সরল রেখাতে সংযুক্ত কর।

ক্থ এবং কগ প্রস্পার সমান
এবং কছ ও কচ প্রস্পার সমান অতএব কচগা ও কছথ এই ছই ত্রিভুজের
মধ্যে চক ও কগা ছই বাহু, ছক ও
কথা ছই বাহুর সহিত একে২ সমান
এবং চকছ এই কোণ কচগা ও কছথ



এ উভয় ত্রিভ্জের মধ্যে সামান্য ভাবে আছে অতএব (৪ প্রতিজ্ঞান্সীরে) ঐ ত্রিভুজ দয়ের ভূমিও পরস্পর সমান অর্থাৎ চণা, ছিখ সহিত সমান, এবং ঐ ত্রিভক্ত দয়ও পরস্পর সমান ও তালাদের অবশিক কোণ দয় যাহা সমান২ বাহুর সম্বাধ্য তাহারাও একে২ পরস্পার সমান অর্থাৎ কথছ, কগচ সহিত, ও কছখ, কচগ সহিত সমান। এবং কচ, কছ সহিত সমান ও কথ, কগ সহিত সমান অতএব এই শেষোক্ত সরল রেখাদয় পূর্কোক্ত রেখাদয় হইতে অবচ্ছিন্ন হইলে (৩ স্তঃসাধ্যানুসারে) অবশিষ্ট খচ ও গছ পরস্পর সমান হইবে এবং চগ ও থছ পরস্পর সমান উপপন্ন হইয়াছে অত-এব এই অপর তিভূজ দয়েরে মধ্যে খচ∙ও চগ**, গছ ও ছখ** সহিত একে২ পরস্পর সমান এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তি কোণ দয়ও অর্থাৎ খচন ও গছখ পরস্পর সমান সপ্রমাণ হইয়াছে অতএব (৪ প্রতিজ্ঞানুস:রে) এই ত্রিভুক্ত দয় পরস্পর সমান এবং ইহাদের অবশিষ্ট কোণ যাহা সমানহ বাহুর সম্প্রস্থ তাহারাও একেং প্রস্পার সমান অর্থাং খগচ, গখছ সহিত. এবং গ্রুচ, খগছ সহিত প্রস্পর সমান। সম্প্রতি কথছ এই কোণ কগচ সহিত সমান সপ্রমাণ হইয়াছে এবং গখছ (যাহা কথছ কোর্ণের এক অংশ) তাহা খগচ (যাহা কগচ কোণের এক অংশ) তাহার সহিত সমান অতএব এই সমুদয় সমান কোণ

Sym. dem.—AB = AC; AG = AF; \angle FAG common to \triangle 9 AFC, AGB \therefore BG = FC, \angle ABG = \angle ACF, \angle AFC = AGB (4. of 1.) Again AF—AB (i. e. BF) = AG—AC (i. e. CG) by 3 Ax. And \angle BFC = \angle CGB \therefore \triangle BFC = \triangle CGB, \angle BCF = CBG, \angle BCG, = \angle CBF (4 of 1) \therefore \angle ABG— \angle CBG (i. e. \angle ABC) = \angle ACF—BCF (i. e. \angle ACB.)


PROP. VI. THEOR.

If two angles of a triangle be equal to one another, the sides which subtend, or are opposite to them, are also equal to one another.

Let ABC be a triangle having the angle ABC qual to the angle ACB; the side AB is also equal to the side AC.

For, if AB be not equal to AC, one of them must be greater than the other. Let AB be the greater, and from

it (3.1.) cut off BD equal to AC the less, and join DC; therefore, because in the triangles DBC, ACB, DB is equal to AC, and BC common to both, the two sides DB, BC are equal to the two AC, CB, each to each; but the angle DBC is also equal to the angle ACB; therefore the base DC is equal to the base AB, and the area of the triangle DBC is equal to that of the triangle ACB (4.1.) the less to the



greater; which is absurd. Therefore, AB is not unequal to AC, that is, it is equal to it. Wherefore, if two angles, &c. Q. E. D.

Cor. Hence, every equiangular triangle is also equilateral.

Sym. dem.—BD = AC (by construction) BC is common to \triangle s DBC and ACB, \angle DBC = \angle ACB.

দয় হইতে সমান২ অংশ বিয়োগ করিলে অবশিই ভাগদয়
(৩ স্বতঃ সাধ্যানুসারে) অবশ্য সমান হইবে স্থতরাং কথগ
কোণ কগথ সহিত সমান। আর ইহারাই ভূমিতে সংলগ্ন
কোণ। এবং ভূমির অপর পাদ্মের কোণ দ্বয় অর্থাৎ গথঘ
এবং থগঙ যে সমান তাহা পূর্কে উপপন্ন হইয়াছে। অতএব
সমদ্বাছ ত্রিভূজের ভূমিতে সংলগ্ন কোণ দয়, ইত্যাদি।


অনুমান। অতএব সনবাহু ত্রিভূজ সমান কোণিও হইবে। সংক্ষতে উপপত্তি। কথ = কগ। কছ = কচ। \angle চকছ, \triangle কচগ ও কছথ উভয় পক্ষে সামান্য \therefore (৪ প্রতিজ্ঞা) চগ = খছ, \angle কথছ = \angle কগচ, \angle কচগ = \angle কছথ। (৩ স্বতঃ সাধ্যামুসারে) কচ—কথ (অর্থাৎ খচ) = কছ — কগ (অর্থাৎ গছ)। (পূর্ব্বোক্ত) চগ = ছথ। \angle খচগ = \angle গছখ \therefore (৪ প্রতিজ্ঞামুসারে) \triangle খচগ = \triangle গছখ, \angle খগচ = \angle গ্র্যছ, \angle গ্র্যচ = খগছ \therefore \angle কথছ — \angle গথছ (অ্র্থাৎ \angle কথগ) = \angle কগচ— \angle খগচ (অর্থাৎ \angle কথগ.)

৬ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

যদি কোন ত্রিভুজের দুই কোণ পরস্পর সমান হয় তবে ঐ সমান কোণের সম্মুখন্থ বাছদ্বয়ও পরস্পর সমান হইবে।

কথগ এক ত্রিভুক্ত তাহার মধ্যে কথগ এবং কগথ এই দুই কোণ প্রস্পর সমান। অপর কথ এবং কগ ছই বাছও সমান হইবে।

কেননা যদি বল কথ এবং কগ পরস্পার সমান নছে তবে ইহা-দের একটা অন্যটা হইতে বৃহত্তর হইবে, কথ যেন বৃহত্তর জ্ঞান কর



্এবং (৩ এপ্রতিজ্ঞান্ত্রসারে) তাহা হইতে কগ লঘুতরের সমান
এক অংশ ছেদ কর যথা খঘ, এবং ঘ, গ এক সরল রেখাতে
শ্রুংযুক্ত কর অতএব ঘখগ এবং কখগ এই ত্রিভুক্ত দ্বয়ের মধ্যে


... \triangle DBC = \triangle ACB (4. of 1) which is absurd (9 Ax.) ... AB is not \neq AC i. e. AB = AC.

PROP. VII. THEOR.

Upon the same base, and on the same side of it, there cannot be two triangles, that have their sides which are terminated in one extremity of the base equal to one another, and likewise those which are terminated in the other extremity, equal to one another.

Let there be two triangles ABC, ADB, upon the same base AB, and upon the same side of it, which have their sides CA, DA, terminated in A equal to one another; then their sides CB, DB, terminated in B, cannot be equal to one another.

Join CD, and if possible let CB be equal to DB; then, in the case in which the vertex of each of the triangles is without the other triangle, because AC is equal to AD, the angle ACD is equal (5. 1.) to the angle ACD is greater than the angle



BCD (Ax. 9.); therefore also, the angle ADC is greater than BCD; much more then is the angle BDC greater than the angle BCD. Again, because CB is equal to DB, the angle BDC is equal (5. 1.) to the angle BCD; but it has been demonstrated to be greater than it; which is impossible.


But if one of the vertices, as D, be within the other triangle ACB; produce AC, AD to E, F; therefore, because AC is equal to AD in the triangle ACD, the angles ECD, FDC upon the other side of the base CD are equal (5. 1.) to one another, but the angle ECD

ঘথ এবং কগ পরস্পর সমান এবং খগ উভয়েরি এক বাছ স্মুতরাং ঘথ এবং খগ, কগ এবং খগ ইহারা একে২ পরস্পর সমান এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তি কোণ দ্বয় অর্থাৎ ঘর্ষণ এবং কগথ ইহারাও পরস্পর সমান অতএব (৪ প্রতিজ্ঞা) ঘগ এবং কথ ও পরস্পর সমান এবং ঘথগ ত্রিভুক্ত কগথ ত্রিভুক্তের সহিত সমান কিন্তু ঘথণা, কগথ তিভুজের অংশ মাত্র হইয়া লঘুতর হইবে তবে পূর্বোক্ত কল্পনাতে লঘুতর বৃহত্তরের সহিত সমান হইল তাহা অসাধ্য অতএব কখ, কগ হইতে বিষম নয় অর্থাৎ সমান। অতএব যদি কোন ত্রিভুক্তের, ইত্যাদি।

অমুমান। স্থতরাং সমানকোণ ত্রিভুজ সমবাছক ও হইবে। সঙ্কেতে উপপত্তি। যদি ঘথ 🕳 কগ,। খগ, কখগ ও ঘখগ ত্রিভুজের সামান্য বাহু, ∠ ঘথগ 🕳 ∠ কগথ 😷 (৪ প্রভিজ্ঞা-নুস(রে) △ ঘথগ 🕳 △ কথগ, তাহা অসাধ্য (৯ম্বতঃ সাধ্য) ∴ কথ ≠ কগ নহে অর্থাৎ কথ = কগ।


় প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য। এক ভূমির উপরে এক পাধে এমত ছুই ত্রিভুজ হইতে পারে না যে তাহাদের ভূমির একাত্রে সংলগ্ন বাছদ্ম পরস্পর সমান সত্ত্বে ভূমির অন্যাত্রে সংলগ্ন বাছৰয়ও তক্ষপ সমান হইবে।

কর্খণ এবং কথ্য ছুই ত্রিভুজ কথ ভূমির উপর একি পাশ্বে কল্পনা কর তবে কগ এবং কঘ একাগ্রে অর্থাৎ থ বিন্দতে সংলগ্ন হইয়া পরস্পর সমান থাকিলে থগ এবং শ্ব্য অন্যাগ্রে অর্থাৎ গ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়া তদ্রুপ পরস্পর স্মান হইতে পারে না।



যদি বল হইতে পারে তবে গ এবং ঘ সরল রেখাতে সংযুক্ত ুকর, এবং প্রথমতঃ যদি উক্ত ত্রিভুক্তের শৃঙ্কদ্বয় পরস্পরের ক্রের বহিন্থ হয় তবে কগ এবং কঘ সমান হওয়াতে কগঘ 🖢ক সমদ্বিবাছ ত্রিভুজ হইল স্থতরাং কগঘ এবং কঘণ এই শাণ দয় (৫ প্রতিজ্ঞান্থসারে) পরস্পর সমান, কিন্তু খগঘ, কগঘ াণের অংশ দাত হওয়াতে তাহা হইতে লঘূতর অতএব

is greater than the angle BCD (Ax. 9); wherefore, the angle FDC is likewise greater than BCD; much more then is the angle BDC greater than the angle BCD. Again, because CB is equal to DB, the angle BDC is



equal (5. 1.) to the angle BCD; but BDC has been proved to be greater than the same BCD; which is impossible. The case in which the vertex of one triangle is upon a side of the other, needs no demonstration.


Therefore, upon the same base, and on the same side of it, there cannot be two triangles that have their sides which are terminated in one extremity of the base equal to one another, and likewise those which are terminated in the other extremity equal to one another. Q. E. D.

Sym. dem.—First case. \angle ACD = \angle ADC \because AC = AD (5. of 1.) \angle ACD \nearrow \angle BCD (9. Ax.) \therefore ADC \nearrow \angle BCD; \angle BDC \nearrow \angle ADC (9. Ax.) \therefore \angle BDC \nearrow \angle BCD. But if BC = BD, then \angle BDC = \angle BCD (5. of 1.) which is absurd \therefore BC \ne BD.

Sym dem.—Second case. If AC = AD, $\angle ECD = \angle CDF$ (5 of 1.) $\angle ECD \neq BCD$ (9 Ax.) $\therefore \angle CDF \neq \angle BDC$; $\angle BDC \neq CDF$ (9 Ax.) $\therefore \angle BDC \neq BCD$. But if BD = BC, $\angle BDC = \angle BCD$ which is absurd $\therefore BD \neq BC$.

খগদ, কঘণ হইতেও লঘুতর এবং কঘণ হইতে খঘণ বৃহত্তর হওয়াতে খগদ, থঘণ হইতে আরো অধিক লঘুতর কিন্তু খণ এবং খঘ পরস্পার সমান অতঁএব খগদ এবং খঘণ (৫ প্রতিজ্ঞা) পরস্পার সমান হইবে। ইহা অসাধ্য। স্কুতরাং কণ, কঘ সমান সত্তে খণ, খঘ সমান হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ। উক্ত তিতুজ দয়ের মধ্যে যদি একটার শৃঙ্গ অন্যের মধ্যবর্ত্তি হয় যেমত এই আকৃতিতে আছে তবে গ এবং ঘসরল রেখাতে সংযুক্ত কর এবং কগ ও কঘ, গু এবং চ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর। কি



কগঘ সমন্বিচ্ছ ত্রিভক্ত স্থতরাং ভূমির অপর পার্শ্বত কোণদ্ব অর্থাৎ ঘণঙ এবং গঘচ পরস্পার সমান কিন্তু ঘণঙ, খগঘ হইতে বৃহত্তর স্থতরাং গঘচ কোনও খগঘ হইতে বৃহত্তর তবে গঘখ, খগঘ হইতে আরো বৃহত্তর, কিন্তু খঘ এবং খগ যদি পরস্পার সমান হয় তবে খগঘ এবং খঘগ পরস্পার সমান, ইহা অসাধ্য, অতএব খঘ এবং খগ পরস্পার সমান নহে। যদি একটা ত্রিভুক্তের শৃক্ত অন্যানীর পার্শের উপর থাকে তবে প্রতিজ্ঞার উপপত্তি অতি স্পান্ট। অতএব এক ভূমির উপরে, ইত্যাদি।


সঙ্কেতে উপপত্তি। ১ প্রকরণ। প্রকণ ভ এক বণ প্রকণ কণ ভ কথ। এক গল স্থাপ্য (৯ স্বতঃসাধ্য) :. কংগ স্থাপ্য। এই বিদ্ধাপ্য। এই বিদ্ধাপ্য ভ বাদ্ধাপ্য ভ বাদ্ধা


২ প্রকরণ। কগ — কয ... ∠ঙগঘ — ∠গঘচ (৫ প্রতিজ্ঞা) ∠ঙগঘ → খগঘ ... ∠গঘচ → খগঘ। ... ∠গঘধ → ∠খগঘ। কিন্তু খঘ = খগ হইলে ∠খঘগ = খগঘ। ইহা অসাধ্য, খঘ ≠ খগ।

PROP. VIII. THEOR.

If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, each to each, and have likewise their bases equal; the angle which is contained by the two sides of the one is equal to the angle contained by the two sides of the other.

Let ABC, DEF, be two triangles having the two sides AB, AC, equal to the two sides DE, DF, each to each, viz. AB to DE, and AC to DF; and also the base BC equal to the base EF. The angle BAC is equal to the angle DEF.







For, if the triangle ABC be applied to the triangle DEF, so that the point B be on E, and the straight line BC upon EF: the point C must also coincide with the point F, because BC is equal to EF; therefore BC coinciding with EF, BA and AC must coincide with ED, and DF; for, if BA and CA do not coincide with ED, and FD, but have a different situation as EG and FG; then, upon the same base EF, and upon the same side of it, there can be two triangles EDF, EGF, that have their sides which are terminated in one extremity of the base equal to one another, and likewise their sides terminated in the other extremity but this is impossible (7.1.); therefore, if the base BC coincide with the base EF, the sides BA, AC cannot but

৮ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ছুই ত্রিভুজের মধ্যে যদি একটীর ছুই বাছ অন্যের ছুইবাছর সহিত পরস্পার সমান হয় এবং তাহাদের ভূমিও যদি পরস্পার সমান হয় তবে উভয় ত্রিভুজে ঐ বাছ দ্য়ের মধ্যগত কোণও পরস্পার সমান হইবে।

কথগ ও ঘঙচ
ছই ত্রিভুজ, তাহার মধ্যে একটার কথ ও কগ
এই ছুই বাহু
অন্যের ঘঙ ও ঘচ
এই ছুই বাহুর
সহিত প্রস্পর





প্রত্যেকে সমান, অর্থাৎ কথ ও ঘঙ পরস্পার সমান এবং কগ ও ঘচ পরস্পার সমান এবং ইহাদের থগ ও ঙচ দুই ভূমিও পরস্পার সমান অতএব থকগ এই কোণ ওঘচ এই কোণের সহিত সমান হইবে।

উপপত্তি। যদি কথা ত্রিভুজ ঘণ্ডচ ত্রিভুজের উপর এমত করিয়া রাখ যে থ বিন্দু চিক ও বিন্দুর উপরে পড়ে এবং খগ রেখা চিক ওচ রেখার উপরে পড়ে তবে গ বিন্দুও চ বিন্দুর উপর পড়িবে কেননা কগ, ঘচ সহিত সমান, অতএব খগ ভূমি ওচ ভূমির সহিত মিলিলে কখ, ঘণ্ড সহিত এবং কগ, ঘচ সহিত অবশ্য মিলিবে, কেননা খগ ভূমি ওচ ভূমির সহিত মিলিলে যদি কথ, ঘণ্ড সহিত এবং কগ, ঘচ সহিত না মিলিয়া ছঙ্গ ও ছচ ন্যায় অন্য প্রকারে অবস্থিতি করে তবে এক ভূমি যে ওচ তাহার উপরে এবং এক দিকে এমত দুই ত্রিভুজ ইইতে পারে যাহাদের একারে সংলগ্ন বাছ্বয়ও তদ্ধপ সমান হইবে কিন্তু তাহা (৭ প্রতিজ্ঞাহ্মারে) অসাধ্য, অতএব খগ ভূমি ওচ ভূমির ক্লিতে কথ এবং কগ প্রত্যেকে ঘণ্ড ও ঘচ সহিত

coincide with the sides ED, DF; wherefore likewise, the angle BAC coincides with the angle EDF, and is equal (8. Ax.) to it. Therefore, if two triangles, &c. Q. E. D.

Sym. dem. : B coincides with E and BC with EF. C coincides with F : BC = EF; AB and AC shall coincide with DE and DF for (by 7 of 1.) it cannot be otherwise : $\angle BAC = \angle EDF$.

PROP. IX. PROB.


To bisect a given rectilineal angle, that is, to divide it into two equal angles.

Let BAC be the given rectilineal angle, it is required to bisect it.

Take any point D in AB, and from AC cut (3. 1.) off AE equal to AD; join DE, and upon it describe

(1. 1.) an equilateral trianangle DEF; then join AF; the straight line AF bisects the angle BAC.

Because AD is equal to AE, and AF is common to the two triangles DAF, EAF; the two sides DA AF, are equal to the two sides EA AF, each to each; but the base DF is also equal to the base EF; therefore the angle DAF is equal (8. 1.) to the angle EAF:



lineal angle BAC is bisected by the straight line AF. Which was to be done.

Sym. dem. AD = AE (by constr.) AF common to \triangle s ADF, AEF and DF = EF \therefore \angle DAF = \angle FAE (8 of 1.)


অবশ্য পরস্পর মিলিবে এবং তন্নিনিত্তে থকগ কোণ ওঘচ কোণের সহিত মিলিয়া সমান হইবে। অতএব দুই ত্রিভুজের মধ্যে, ইত্যাদি।

সঙ্কেতে উপপত্তি। $\cdot \cdot \cdot$ থ, ও সহিত মিলে এবং খগ, ওচ সহিত মিলেবে, $\cdot \cdot \cdot$ খগ = ওচ। কখ ও কগ, ঘঙ ও ঘচ সহিত মিলিবে কেননা (৭ প্রতিজ্ঞা) তাহার অন্যথা হইতে পারে না। $\cdot \cdot \cdot \angle$ খকগ $= \angle$ ওঘচ।

৯ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক নির্দ্দিত্ত সরল রৈথিক কোণকে দ্বিথণ্ড অর্থাৎ ছুই সমান ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

থকগ এক নির্দিন্ট সরল রৈথিক কোণ ইহাকে দ্বিগণ্ড করিতে হইবে। কথ সরল রেখার মধ্যে কোন এক বিন্দু লও অর্থাৎ ঘ, এবং কগ হইতে কঘ সমান এক অংশ (৩ প্রতিজ্ঞা-মুসারে) ছেদন কর যথা কঙ্ক, পরে ঘ এবং ও সরল রেখার দ্বারা সংযুক্ত কর এবং ঘঙ রেখার উপর (১ প্রতি-জ্ঞামুসারে) এক সনবাছ ত্রিভুক্ত অঙ্কিত কর যথা ঘঙ্চ, পরে ক, চ সরল রেখার দ্বারা সংযুক্ত কর।



খকপ কোণ কচ সরল রেথা দারা দ্বিখণ্ড অর্থাৎ ছই সমান ভাগে বিভক্ত হইল।

উপপত্তি। কঘ, কঙ সহিত সমান যে হেতুক তাহার। সমান তাবে ছিন্ন হইরাছে এবং কচ সরল রেখা ঘকচ ও ওকচ এই ছই ত্রিভুজের সামান্য বাস্থ অতএব ঘক ও কচ ইহারা উভয়ে পরস্পার প্রত্যেকে ওক ও কচ সহিত সমান এবং ঘচ ভূমি ওচ ভূমির সহিতু সমান অতএব (৮ প্রতিজ্ঞানুসারে) ঘকচ কোণ ওকচ কোলের সহিত সমান, সুতরাং কচ সরল রেখা দ্বারা থকগ কোণ দিখও হইয়াছে।

PROP. X. PROB.


To bisect a given finite straight line, that is, to divide it into two equal parts.

Let AB be the given straight line; it is required to divide it into two equal parts.

Describe (1. 1.) upon it an equilateral triangle ABC, and bisect (9. 1.) the angle ACB by the straight line CD. AB is cut into two equal parts in the point D.

Because AC is equal to CB, and CD common to the two triangles ACD, BCD; the two sides AC, CD, are

equal to the two BC, CD, each to each; but the angle ACD is also equal to the angle BCD; therefore the base AD is equal to the base (4.1.) DB, and the straight line AB, is divided into two equal parts in the point D. Which was to be done.



Sym. dem. AC = CB, CD common to $\triangle s$ ADC, BDC, $\angle ACD = \angle BCD$ (by constr.) $\therefore AD = DB$ (4 of 1.)

PROP. XI. PROB.

To draw a straight line at right angles to a given straight line, from a given point in that line.

Let AB be a given straight line, and C a point given in it; it is required to draw a straight line from the point C at right angles to AB.

Take any point D in AC, and (3.1.) make CE equal to CD and upon DE describe (1.1.) the equilateral triangle DFE, and join FC; the straight line FC, drawn from the given point C, is at right angles to the given straight line AB.


সঙ্কেতে উপপত্তি। কঘ = কণ্ড। কচ, Δ কঘচ ও কণ্ডচ উভয়ের সামান্য বাহু। ঘচ = ৩৮ ∴ ∠ ঘকচ = ∠ চকণ্ড (৮ প্রতিজ্ঞা)।

১০ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

ে এক নিৰ্দ্দি সীনা বিশিষ্ট সরল রেখাকে বিথও অর্থাৎ ছুই সমান ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

কথ এক নির্দ্দিউ সরল রেথা ইহাকে ছুই সমান ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

় উক্ত সরল রেখার উপর (১ প্রতি জ্ঞা) এক সমবাছ ত্রিভুক্ত অঙ্কিত কর এবং (৯ প্রতিজ্ঞা) কগথ কোণকে গঘ সরল রেখার দারা দিখণ্ড কর,



ঘ বিন্দতে কথ দৃই সমান ভাগে বিভক্ত হইল।


্উপপত্তি। কগতি গথ পরস্পার সনান, যেহেতুক ইহার। সমবাছ ক্রিভুজের বাছ, এবং গঘ সরল রেখা কগঘ ও থগঘ ক্রিভুজ দ্বের সামান্য বাছ অতএব কগ ও গঘ ছুই বাছ থগ ও গঘ দুই বাছর সহিত পরস্পার প্রত্যেকে সনান এবং কগঘ ও খগঘ এই দুই কোণ পরস্পার সমান অতএব (৪ প্রতিজ্ঞা) কঘ ভূমি ঘথ ভূমির সহিত সমান সূত্রাং ঘ বিন্দুতে কথ রেখা দুই সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

সক্ষেতে উপপত্তি। কগ \Longrightarrow গথ। গঘ, \triangle কগঘ ও খগছর সামান্য বাছ। \angle কগঘ \Longrightarrow \angle খগঘ (অঙ্কপাত) \therefore কঘ \Longrightarrow ঘথ।

১১ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

নির্দ্দিউ সরল রেখার উপর তাহার অন্তরস্থকোন বিন্দু হইতে লম্ব টানিতে হইবে।

•কথ একি সরল বেখা এবং গ তাহার অন্তরস্থ এক বিন্দু, গ হইতে কথ রেখার উপর এক লম্ব টানিতে হইবে। Because DC is equal to CE, and FC is common to the two trianangles DCF, ECF, the two sides DC, CF are equal to the two EC, CF, each to each; but the base DF is also equal to the base EF; therefore the angle DCF



is equal (8.1.) to the angle ECF; and they are adjacent angles. But, when the adjacent angles which one straight line makes with another straight line are equal to one another, each of them is called a right (7 Def.) angle; therefore each of the angles DCF, ECF is a right angle. Wherefore, from the given point C, in the given straight line AB, FC has been drawn at right angles to AB. Which was to be done.

Sym. dem. DC = CE; FC common to \triangle s FCD, FCE; DF = FE (by constr.) \therefore \angle FCD = \angle FCE (8 of 1.) \therefore FC | to AB (7 Def.)


PROP. XII. PROB.

To draw a straight line perpendicular to a given straight line, of an unlimited length, from a given point without it.


Let AB be a given straight line, which may be produced to any length both ways, and let C be a point without it. It is required to draw a straight line perpendicular to AB

from the point C.

Take any point D upon the other side of AB, and from the centre C, at the distance CD, describe (3 Post.) the circle EGF meeting AB in F,



কগ মধ্যে কোন এক বিন্দুল ও যথা ঘ, এবং গখ হইতে গঘ সমান এক অংশ (৩ প্র-তিজ্ঞা) ছেদ কর যথা গঙ এবং ঘঙ রেখার উপর এক সমবঃ ছ ত্রিভুক্ত (১ প্রতিজ্ঞা) অঙ্কিত কর যথা ঘচঙ পরে চ ও গ



এক সরল রেখা দারা সংযুক্ত কর। চগ সরল রেখা গ বিন্দু হইতে উঠিয়া কথ উপর লম্ব ভাবে আছে।


উপপত্তি। ঘগ ও গঙ পরস্পার সমান এবং চগ, ঘচগ ও ওচগ এই ছুই ত্রিভ্রের সামান্য বাস্থ অতএব ঘগ ও গচ, ওগ ও গচ সহিত পরস্পার প্রত্যেক সমান এবং ঘাঁচ ভূমিও ওচ ভূমির সহিত সমান অতএব (৮ প্রতিজ্ঞা) ঘগচ এবং ওগচ কোণ দ্বয় পরস্পার সমান, ইহারাই চগ সরল রেখার দুই পাশ্ব কোণ, অপর এক সরল রেখার উপর অন্য সরল রেখা যোগে উভয় পাশ্ব কোণ সমান হইলে প্রত্যেককে সমকোণ কহে অতএব ঘগচ এবং ওগচ প্রত্যেকে সমকোণ মুত্রাং গ বিন্দু হইতে কখ রেখার উপর গচ, লয়ভাবে অক্কিত হইয়াছে।

সঙ্কেতে উপপত্তি। ঘণ = গঙ। চণ, △ ঘণচ ও ঙগচ উত্ত-য়ের সামান্য। ঘচ = ঙচ ∴ ∠চণঘ = ∠চণঙ, ∴ গচ, কথ উপর ⊥ (৭ সংজা)।

১২ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক নির্দ্দিত অসীমা সরল রেখার উপর তছহিঃস্থ কোন নির্দ্দিত বিন্দু হইতে লম্ব টানিতে হইবে।

কথ এক নির্দিষ্ট অসীমাসরলরেখাঅর্থাৎ ইহাকে উভয় পাশ্বে যত ইচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং গ ইহার



G; and bisect (10. 1.) FG in H, and join CF, CH, CG; the straight line CH, drawn from the given point C, is perpendicular to the given straight line AB.


Because FH is equal to HG, and HC is common to the two triangles FHC, GHC, the two sides FH, HC are equal to the two GH, HC, each to each; but the base CF is also equal (11. Def. 1.) to the base CG; therefore the angle CHF is equal (8. 1.) to the angle CHG; and they are adjacent angles; now, when a straight line standing on a straight line makes the adjacent angles equal to one another, each of them is a right angle, and the straight line which stands upon the other is called a perpendicular to it; therefore from the given point C, a perpendicular CH has been drawn to the given straight line AB. Which was to be done.

Sym. dem. FH = HG (by constr.) CH common to ∆s FCH, GCH; FC = CG (11. Def.) ∴ ∠ CHF = ∠ CHG ∴ CH | to AB (7 Def.)

PROP. XIII. THEOR.

The angles which one straight line makes with another, upon one side of it, are either two right angles, or are together equal to two right angles.

Let the straight line AB make with CD, upon one side of it, the angles CBA, ABD; these are either two right angles, or are together equal to two right angles.




বহিঃ দু এক বিন্দু, গ হইতে কথ রেখার উপর লম্ব টানিতে হইবে।
কথ সরল রেখার অপর পাম্মে এক বিন্দু লও যথা ঘ, এবং
গ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া গঘ পর্যান্ত বৃত্ত অঙ্কিত কর যথা চছঙ,
ইহা কথ সরল রেখার সহিত চ এবং ছ বিন্দুতে সংলগ্ন
হইতেছে পরে চছ সরল রেখাকে জ বিন্দুতে দিখও কর ও
গছ, গজ, এবং গচ এই২ রেখা টান। গজ, গ বিন্দু হইতে
কথ রেখার উপর লম্বভাবে অঙ্কিত হইল।

উপপত্তি। চক্ষ, জছ সহিত সমান এবং জগ, চজগ ও ছজগ ছুই তিভুজের সামান্য বাহু স্মৃতরাং চক্ষ্ ও জগ, ছজ্প ও জগ ইহারা ক্রমশ সমান এবং (১১ সংজ্ঞা) চগ ভূমিও ছগ ভূমির তুল্য অতএব (৮ প্রতিজ্ঞা) চজগ কোণ ছজগ কোণের সহিত সমান, ইহারাই গজ রেখার ছুই পার্শন্ত কোণ এবং এক সরল রেখা অন্য সরল রেখার উপর দণ্ডায়মান হইয়া উভয় পর্শ হু কোণ সমান করিলে প্রত্যেক কোণকে সমকোণ কহে ও দণ্ডায়মান রেখাকে লম্ব কহে অতএব নির্দিষ্ট কথ রেখার উপর গ বিন্দু হইতে গজ লম্ব ভাবে টানা গিয়াছে।

সঙ্কেতে উপপত্তি। চজ = জছ। জগ, \triangle গজচ, গজছ উভয়ের সামান্য। চগ = ছগ। \therefore \angle চজগ = \angle ছজগ \therefore গজ, কথ উপর \bot (৭ সংজ্ঞা)।

১৩ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

এক সরল রেখা অন্য সরল রেখার সহিত সংলগ্ন হইয়া এক দিকে যে২ কোণ বিস্তার করে তাহা হুই সম কোণ অথবা একত্র সমুচ্চয়ে হুই সম কোণের সমান হয়।



For, if the angle CBA be equal to ABD, each of them is a right angle (Def. 7.); but, if not, from the point. B draw BE at right angles (11. 1.) to CD; therefore the angles CBE, EBD are two right angles. Now, the angle QBE is equal to the two angles CBA. ABE together; add the angle LBD to each of these equals, and the two angles CBE, EBD, will be equal (2 Ax.) to the three angles CBA, ABE, EBD. Again, the angle DBA is equal to the two angles DBE, EBA; add to each of these equals the angle ABC; then will the two angles DBA, ABC be equal to the three angles DBE, EBA, ABC; but the angles CBE, EBD have been demonstrated to be equal to the same three angles; and things that are equal to the same thing are equal (1 Ax.) to one another; therefore the angles CBE. EBD. are equal to the angles DBA, ABC; but CBE, EBD, are two right angles; therefore DBA, ABC are together equal to two right angles. Wherefore, when a straight line, &c Q. E. D.

Sym dem. \angle CBE = \angle CBA + \angle ABE \oplus \angle CBE + \angle EBD = \angle CBA + \angle ABE + \angle EBD (2. Ax.) \angle DBA = \angle ABE + \angle EBD \oplus \angle ABC + \angle ABC + \angle EBD = \angle CBE + \angle EBD = \angle Rt. \angle s.

PROP. XIV. THEOR.

If, at a point in a straight line, two other straight lines, upon the opposite sides of it make the adjacent angles together equal to two right angles, these two straight lines are one and the same straight line.

At the point B in the straight line AB, let the two straight lines BC, BD upon the opposite sides of AB, make the adjacent angles ABC, ABD together equal to two right angles. BD is in the same straight line with CB.

For, if BD be not in the same straight line with CB, let BE be in the same straight line with it;


কথ সরল রেখা গঘ সরল রেখার সহিত এক দিকে ছুই কোণ বিস্থার করুক যথা কথগ এবং কথঘ, ইহারা ছুই সম কোণ অথবা একত্র যোগে দুই সম কোণের সমান।

উপপত্তি। যদি কথগ কোণ কথঘ কোণের সমান হয় তবে (৭ সং) ইহারা প্রত্যেকে সম কোণ, আর যদি তাহা না হয় তবে থ বিন্দু হইতে গঘ সরল রেখার উপর (১১ প্র.) এক লম্ব টান যথা খঙ, অতএব ঙথঘ ও ঙথগ ইহারা দই সমকোণ. অপর ওখণ কে'ণ কখণ এবং কখঙ এ উভয়ের সম্নি, তবে এই দৃই তুল্য পদার্থে ওথঘ যোগ করিলে ওথগ এবং ওথঘ এই দৃই কোণ (২ স্ব. সা.) কখণ কখন্ত এবং ওখন্য এই তিন কোণের সমান, এবং ঘথক কোণ, ঘথও এবং ওথক এই দুই কোণের সমান অতএব এই তুল্য পদার্থে কথগ যোগ করিলে ঘথক এবং কথগ এই দুই কোণ ঘখঙ ঙথক এবং কথগ এই তিন কোণের সমান হইবে, কিন্তু পূর্বের উপপন্ন হইয়াছে যে ওখন এবং ওখঘ এই দুই কোণ উক্ত তিন কোণের সমান, অতএব (১ স্ব. সা.) যে২ বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান তাহারা পর-স্পার সমান সূতরাং ঙথগ এবং ঙথঘ এই কোণ দ্বয় ঘথক এবং কথগ এ কোণ দয়ের সহিত সমান, কিন্তু ওথগ এবং ওথঘ ইহারা দুই সম কোণ অতএব ঘথক এবং কথগ ইহারা একত্র দুই সম কোণের সনান। অতএব এক সরল রেখা, ইত্যাদি।

সং উ.। ∠গখ용 = ∠গখক + ∠কখ৪। ∴ ∠গখ용 + ∠ঙখঘ = ∠গখক + ∠কখ용 + ∠ঙখঘ (२ ষ. মা.) ∠ঘখক = ∠কখ৪ + ∠ঙখঘ = ∠কখগ + ∠কখ৪ + ∠ঙখঘ = ২ সমকোণ।

১৪ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

যদি এক সরল রেখার কোন বিন্দুতে অন্য দুই সরল রেখা ভিন্ন২ পার্শ্ব হইতে আসিয়া সমীপস্থ কোণ ছয়কে একত দুই সম কোণের সমান করে তবে এই দুই সরল রেখা একি সরল বরখাতে থাকিবে। therefore, because the straight line AB makes angles with the straight line CBE, upon one side of it, the angles ABC, ABE are together equal (13. 1.) to two right angles; butthe angles ABC ABD are likewise together equal to two right angles; therefore the



angles CBA, ABE are equal to the angles CBA, ABD: Take away the common angle ABC, and the remaining angle ABE is equal (3 Ax.) to the remaining angle ABD, the less to the greater, which is impossible; therefore BE is not in the same straight line with BC. And in like manner, it may be demonstrated, that no other can be in the same straight line with it but BD, which, therefore, is in the same straight line with CB. Wherefore, if at a point in a straight line, two other straight lines, upon the opposite sides of it, make the adjacent angles together equal to two right angles, these two straight lines are in one and the same straight line. Q. E. D.

Sym. dem. If CB be not in the same line with BD let it be so with BE.

$$\therefore$$
 \angle CBA + \angle ABE = 2 Rt. \angle s (13. of 1.)


$$\angle CBA + \angle ABD = 2 \text{ Rt. } \angle s \text{ (by Hyp.)}$$

$$\overrightarrow{\cdot}$$
. $\angle CBA + \angle ABE = \angle CBA + \angle \overrightarrow{ABD}$ (1. **Ax.**)

$$\therefore$$
 $\angle ABE = \angle ABD$ which is absurd (9. Ax.)

^{..} CB is not in the same line with BE, nor with any other but BD.

কথ সরল রেধার থ বিন্দৃতে
থগ এবং থঘ ভিন্ন২ পার্শ্ব
ইইতে আসিয়া কথগ ও কথঘ
এই সমীপত্ত কোণ দ্বাকে একত্র
দুই সম কোণের সমান করক
ভাহাতে থঘ এবং থগ এক
সরল রেখাতেই থাকিবে।



উপপত্তি। যদি খঘ এবং ^ন খগ একি সরল রেখাতে না থাকে তবে খগ রেখাকে বৃদ্ধি করিয়া খেও সহিত এক সরল রেখা কর, অতএব কখ গখঁও রেখার উপর একি পাম্বে দই কোণ বিস্তার করাতে (১৩ প্র.) কর্থণ এবং কখন্ত এই কোণ দ্বয় একত্র দই সম কোণের সহিত সমান, কিন্তু কথগ এবং কথঘ ইহারাও দুই সম কোণের সহিত সমান অতএব গথক এবং কথঙ একত্র গথক এবং কথঘ সহিত সমান, ইহাদের মধ্যে সামান্য কোণ গথক যদি বাহির করিয়া লও তবে (১ স্ব. সা.) অবশিষ্ট কথওঁ এবং কথঘ পরস্পর সমান হইবে, কিন্তু কখন্ড, কখন্য এই কোণের এক অংশ মাত্র স্থুতরাং তাহা হইতে (৯ স্ব. সা.) লঘ অতএব লঘ এবং গুরু পরস্পর সমান হইতে পারেনা স্মতরাং খণ্ড এবং গথ এক সরল রেখা হইতে পারে না। এই রূপে আরো উপপন্ন হইতে পারে যে খঘ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন রেখা খগ সহিত একি সরল রেখা হইতে পারেনা অতএব এই চুই রেখা একি সরল রেখাতে আছে। এই হেতুক যদি এক সরল রেখার, ইত্যাদি।

সং উ.। যদি গথ, থঘ এক সরল রেখা না হয় তবে গথ, খঙ তাহা হউক। \therefore \angle গথক + \angle কথঙ = > সমকোণ (১৩ প্র.) \angle গথক + \angle কথঙ = > সম কোণ (কল্পনা) \therefore \angle গথক + \angle কথঙ = \angle গথক + \angle কথঙ = \angle কথণ, ইহা অসাধ্য (৯ স্ব. সা.)।


PROP. XV. THEOR.

If two straight lines cut one another, the vertical or opposite angles are equal.

Let the two straight lines AB, CD, cut one another in the point E; the angle AEC shall be equal to the angle DEB, and CEB to AED.

For the angles CEA, AED, which the straight line AE makes with the straight line CD, are together

equal (13. 1.) to two right angles: and the angles AED, DEB, which the straight line DE makes with the straight line AB are also together equal (13. 1.) to two right angles;



therefore the two angles CEA, AED are equal to the two AED, DEB. Take away the common angle AED, and the remaining angle CEA is equal (3. Ax) to the remaining angle DEB. In the same manner, it may be demonstrated, that the angles CEB, AED are equal. Therefore, If two straight lines, &c. Q. E. D.


- Con. 1. From this it is manifest, that, if two straight lines cut one another, the angles which they make at the point of their intersection, are together equal to four right angles.
- Con. 2. And hence, all the angles made by any number of straight lines meeting in one point, are together equal to four right angles.

Sym. dem. $\angle AEC + \angle AED = 2 \text{ Rt. } \angle s$ (13. of 1.) $\angle BED + \angle AED = 2 \text{ Rt. } \angle s$ (13. of 1.) \therefore $\angle AEC + \angle AED = \angle BED + \angle AED$ (1. Ax.) \therefore $\angle AEC = \angle BED$ (3. Ax.)

১৫ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

দুই সরল রেখার সম্পাতে সমুখন্থ কোণ দ্বয় পরস্পার সমান।

কথ এবং গঘ এই
দুই সরল রেখার সশৈতে ও চিহ্নে হউক
তবে কঙাগ এই কোণ
ঘঙ্থ এই কোণের
সহিত সমান হইবে
এবং গঙ্থ ও কঙ্ঘ
ইহারাও পরস্পর সমান হইবে।



উপপত্তি। কঙ সরল রেখা গঘ রেখার সহিত যোগে যে দুই কোণ বিস্তার করিতেছে অর্থাৎ গঙক এবং কঙ্ঘ ইহার। (১৩ প্র.) একত্র ছুই সমকোণ তুল্য, এবং ঘঙ রেখা কথ সহিত গে ছুই কোণ বিস্তার করিতেছে অর্থাৎ কঙ্ঘ এবং ঘঙথ ইহারাও দুই সমকোণ তুল্য, অতএব গঙক এবং কঙ্ঘ এই কোণ দয় একত্র কঙ্ঘ এবং ঘঙথ সহিত সনান সুতরাং উভয় পক্ষ হইতে কঙ্ঘ বাহির করিলে অবশিষ্ট গঙক এবং ঘঙথ পরস্পর সমান ইহাও ঐ রূপে উপপন্ন হইতে পারে। অতএব দুই সরল রেখার সম্পাত হইলে, ইত্যাদি।

> অনুমান। ইহাতে স্পাই বোধ হইতেছে যে দুই সরল রেখা পরস্পর অবচ্ছিন্ন করিলে অবচ্ছেদ চিহ্নেতে যে২ কোণের উৎ-পত্তি হয় তাহা একত্র যোগে চারি সমকোণ তুলা হয়।

২ অনুমান। অতএব যত সরল রেখা পরস্পর এক চিহ্নে অব-চ্ছিন্ন হয় তাহাতে যে২ কে:৭ উৎপন হয় সকল একত্রে করিলে চারি সমকোণ তুল্য হইবে।


PROP. XVI. THEOR.

If one side of a triangle is produced, the exterior angle is greater than either of the interior opposite angles.

Let ABC be a triangle, and let its side BC be produced to D, the exterior angle ACD is greater than either of the interior opposite angles CBA, BAC.

Bisect (10. 1.) AC in E, join BE and produce it to F, and make EF equal to BE; join also FC, and produce AC to G.

Because AE is equal to EC, and BE to EF; AE, EB are equal to CE, EF, each to each; and the angle AEB is equal (15. 1.) to the angle CEF, because they are vertical angles; therefore the base AB is equal (4. 1.) to the base CF, and the tri-



angle AÉB to the triangle CEF, and the remaining angles each to each, to which the equal sides are opposite; wherefore the angle BAE is equal to the angle ECF; but the angle ECD, is greater than the angle ECF (Ax. 9.); therefore the angle ECD, that is ACD, is greater than BAE. In the same manner, if the side BC be bisected, it may be demonstrated that the angle BCG, that is (15. 1.), the angle ACD, is greater than the angle ABC. Therefore, if one side, &c. Q, E. D.


Sym. dem. BE = EF, AE = EC (by constr.) \angle BEA = \angle FEC \therefore \angle ECF = \angle BAE (4. of 1.) \angle ECD or ACD \nearrow \angle ECF (9. Ax.) \therefore \angle ACD \nearrow \angle BAE or BAC.

১৬ প্রতিক্রা—উপপাদ্য।

ত্রিভুজের কোন বাহু বৃদ্ধি করিলে বহিস্থ কোণ সন্মুখস্থ অন্তর্মার্ক্ত প্রত্যেক কোণ হইতে বৃহৎ হইবে।

কখগ এক তিভুজ, ইহার খগ
বাহু ঘ পর্যান্ত বৃদ্ধি পাউক তবে
কগঘ বহিন্ত কোণ গখক এবং
খকগ সন্মুখন্ত অন্তর্বন্তি কোণ
দয়ের প্রত্যেক হইতে বৃহৎ
হইবে।

কণ (১০ প্র.) ও বিন্তুতে দ্বিথণ্ড কর পরে থ ও সংযুক্ত কর এবং থঙ রেখা চ পর্যান্ত বৃদ্ধি করিয়া ওচ রেখা খঙ



সমান কর অনন্তর চ গ সংযুক্ত কর এবং কগ ছ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর।

থঙ ছচ পরস্পার সমান এবং কঙ ওগ পরস্পার সমান সূতরাং কঙ ঙখ এবং গঙ ওচ ইহারা ক্রমেন্থ পরস্পার সমান এবং কঙথ কোন (১৫ প্র.) গঙচ কোনের তুলা অতএব (৪ প্র.) কথ ভূমি গচ ভূমির সমান এবং কঙথ ত্রিভুজ গঙচ ত্রিভুজের সমান এবং ইহাদের সমান এবং কঙথ ত্রিভুজ গঙচ ত্রিভুজের সমান এবং ইহাদের সমান বাছর সম্মুথত্ব অবশিষ্ট কোন দ্বয় পরস্পার একেন্থ সমান, সূত্রাং থকও কোন ওগচ কোনের সহিত সমান কিন্তু ওগঘ কোন ওগচ কোন হইতে বৃহৎ স্ত্রাং ওগঘ অর্থাৎ কাঘ কোন থকও হইতে বৃহৎ। এই রূপে থগ বাছ দ্বিওও করিলে থগছ অর্থাৎ কগঘ কোন কথগ কোন হইতে বৃহৎ ইহা উপপন্ন হইবে। অতএব ত্রিভুজের কোন বাছ, ইত্যাদি।

সং উ.। খঙ — ঙচ। কঙ — ঙগ। ८কঙখ — ८চঙগ ... ८ঙগচ — ८খকঙ (৪ প্র.)। ८ঙগঘ (অর্থাৎ কগঘ) / ঙগচ (৯ ম. মা.) ... ८কগঘ / খকঙ কিয়া খকগ।


PROP. XVII. THEOR.

Any two angles of a triangle taken together are less than two right angles.

Let ABC be any triangle; any two of its angles taken together are less than two right angles.

Produce BC to D; and because ACD is the exterior

angle of the triangle ABC, ACD is greater (16 1.) than the interior opposite angle ABC; to each of these add the angle ACB; therefore the angles ACD, ACB are greater than the angles ABC, ACB but ACD, ACB are together equal (13. 1.)



to two right angles; therefore, the angles ABC, BCA are less than two right angles. In like manner, it may be demonstrated, that BAC, ACB, as also, CAB, ABC, are less than two right angles. Therefore, any two angles, &c. Q. E. D.

Sym. dem. $\angle ACD \neq \angle ABC$ (16. of 1.) $\therefore \angle ACD + \angle ACB \neq \angle ACB \neq \angle ACB$; $\angle ACD + \angle ACB = 2$ Rt. $\angle ACB + \angle ACB \neq 2$ Rt. $\angle ACB \neq 2$ Rt. $\angle ACB \neq 2$ Rt. $\angle ACB \neq 2$

PROP. XVIII. THEOR.

The greater side of every triangle has the greater angle opposite to it.

Let ABC be a triangle of which the side AC is greater than the side AB; the angle ABC is also greater than the angle BCA.


From AC, which is greater than AB, cut off (3-1.) AD equal to AB, and join BD; and because ADB is the exterior angle of the triangle BDC, it is greater (16.1.)

১৭ প্রতিজ্ঞ।—উপপাদ্য।

ি ত্রিভ্জের যে ছুই কোণ লও একত্র করিলে দুই সমকোণ হুইতে স্থান হুইবে।

কখন এক ত্রিভুজ ইহার যে দুই কোণ লও একত্র করিলে ছুই সমকোণের মুান হইবে। খন রেখাঘ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর, কগঘ কোণ কখন ত্রিভুজের বহিঃত্ব হইয়া (১৬ প্রা.) অন্তরের সমুখন্ত কোণ কখন হইতে অধিক এ উভয়ে কলখ যৌন করিলে কলঘ এনং কলখ একত্র কখন এবং কলখ কোণ দ্বয় হইতে অধিক

হইবে কিন্তু (১৩ প্র.) কগঘ ও
কগথ একত্র দুই সমকোণের
তুল্য অতএব কথগ এবং কগথ
একত্র দুই সমকোণ হইতে ন্যুন।
থকগ কগথ এবং গকথ কথ
গধ যে ঐরূপ তাহা উপপল
করা যায়। অতএব ত্রিভুজের,
ইত্যাদি।




সং উ.। \angle কগঘ \neg \angle কথগ (১৬ প্র.) \therefore \angle কগঘ + \angle কগখ \neg \angle কথগ + \angle কগখ | \angle কগখ + \angle কগখ \angle ২ সমকোণ।

১৮ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

প্রত্যেক ত্রিভুক্ত বৃহত্তর বাছর সন্মুখস্থ কোণও বৃহত্তর হইবে।
কথা এক ত্রিভুক্ত তাহার মধ্যে কগ বাছ কথ বাছ হইতে
বৃহত্তর। কথা কোণও থাক কোণ হইতে বৃহত্তর। কথ
হইতে কগ বৃহত্তর অতএব কগ হইতে কথ সমান এক থও
পূথক কর যথা কঘ এবং ঘথ রেখা টান। থঘণ ত্রিভুক্তের
বিহিঃস্থ কোণ কঘথ, স্মৃত্রাং (১৬ প্র.) অন্তর্মার্ত্তি সন্মুখস্থ
কোণ ঘণথ হইতে বৃহত্তর কিন্তু (৫ প্র.) কঘথ, কথঘ পরস্পার
সমান কোঁননা কুঘ এবং কথ পরস্পার সমান ত্রিমিত্তে কথঘ
কোণও কগঘ হইতে বৃহত্তর অতএব কথগ, কথঘ হইতে

than the interior opposite angle DCB; but ADB is equal (5. 1.) to ABD, because the side AB is equal to the side AD; therefore the angle ABD is likewise greater than the angle ACB; wherefore, much more is the angle ABC greater than ACB. Therefore, the greater side, &c. Q. E. D.



Sym. dem. \therefore AB = AD (by constr.) \angle ADB = \angle ABD (5 of 1.) \angle ADB \neq \angle ACB (16. of 1.) \therefore \angle ABD \neq \angle ACB; \angle ABC \neq \angle ABD (9. Ax.) \therefore \angle ABC \neq \angle ACB.


PROP. XIX. THEOR.

The greater angle of every triangle is subtended by the greater side, or has the greater side opposite to it.

Let ABC be a triangle, of which the angle ABC is greater than the angle BCA; the side AC is likewise greater than the side AB.

For, if it be not greater, AC must either be equal to AB, or less than it; it is not equal, because then the angle ABC would be equal (5. 1.) to the angle


ACB; but it is not; therefore AC is not equal to AB; neither is it less, because then the angle ABC would be less (18. 1.) than the angle ACB, but it is not; therefore the side AC is not less than AB; and it has been shown that it is not equal to AB; therefore



it is not equal to AB; therefore AC is greater than AB. Wherefore, the greater angle, &c. Q. E. D.

Sym. dem. If $AC \neq AB$, it is either = or $\angle AB$; Suppose $AC = AB \therefore \angle ABC = \angle ACB$ (5 of 1.) but by hypothesis it is not so, $\therefore AC \neq AB$ Again, suppose $AC \angle AB \therefore \angle ABC \angle \angle ACB$ (18. 1.) but by hypothesis it is not so $\therefore AC \neq AB \therefore AC \neq AB$.

বৃহৎ হইয়া কগথ হইতে আরো বৃহক্তর। অতএব প্রত্যেক ত্রিভূজে, ইত্যাদি।



১৯ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

প্রত্যেক ত্রিভুজে বৃহত্তর কোণের **সন্মুখস্থ বাছও বৃহত্তর** হইবে।

কথণ এক ত্রিভুজ তাহার মধ্যে কথণ কোন থণক কোন হইতে বৃহ-তুর। কণ বাছও কথ বাছ হইতে বৃহত্তর হইবে।

थ

উপপত্তি। কগ যদি কখ হইতে বৃহত্তর না হয় তবে সমান, নচেৎ

ক্রুত্তর হইবে, কিন্তু সমান হইতে পারে না কেননা তাহা
হইলে কথগ এবং খগক ছই কোণও (৫ প্র.) সমান হইত,
এবং ক্রুত্তরও নহে কেননা তাহা হইলে (১৮ প্র.) কথগ
কোণ খগক হইতে ক্রুত্তর হইত। স্ত্তরাং যদি কগ বাছ
কথ বাছর সমান নহে এবং ক্রুত্তরও নহে তবে ব্যতিরেক
অব্বয়ে অবশ্য বৃহত্তর হইবে। অতএব কগ কথ হইতে বৃহত্তর।
তমিমিত্তে প্রত্যেক ত্রিতৃজে, ইত্যাদি।

সং উ.। যদি কগ \neq কথ তবে তাহা = অথবা \angle কথ। প্রথমতঃ যেন কগ = কথ \cdot . \angle কথগ = \angle কগথ (৫ প্র.) ইহাতে কল্পনার ব্যতিক্রম। \cdot . কগ \neq কথ। পুনশ্চ যেন কগ \angle কথ \cdot . \angle কথগ \angle \angle কগথ (১৮ প্র.) ইহাতেও কল্পনার ব্যতিক্রম। \cdot . কগ \angle কথ \cdot . কগ \neg কথ।

PROP. XX. THEOR.


Any two sides of a triangle taken together are greater than the third side.

Let ABC be a triangle; any two sides of it taken together are greater than the third side, viz. the sides BA, AC greater than the side BC; and AB, BC greater than AC; and BC, CA greater than AB.

Produce BA to the point D, and make (3. 1.) AD equal to AC and join DC.

Because DA is equal to AC, the angle ADC is likewise equal (5. 1.) to ACD; but the angle BCD is greater than the angle

ACD; therefore the angle BCD is greater than the angle ADC and because the angle BCD of the triangle DCB is greater than its angle BDC, and because the greater (19.




1.) side is opposite to the greater angle; therefore the side DB is greater than the side BC; but DB is equal to BA and AC together; therefore BA and AC taken together are greater than BC. In the same manner, it may be demonstrated, that the sides AB, BC are greater than CA, and BC. CA greater than AB. Therefore, any two sides &c. Q. E. D.

Sym. dem. AD = AC (by constr.) $\therefore \angle ADC = \angle ACD$ (5 of 1.) $\angle BCD \neq \angle ACD$ (9. Ax.) $\therefore \angle BCD \neq \angle ADC \therefore BD \neq BC$ (19. of 1.) $BD = BA + AD \Rightarrow BA + AC \therefore BA + AC \neq BC$.

২০ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

্রিভুজের যে ছুই বাছ একত্র কর তাহাদের যোগ ভৃতীয় বাছ হইতে বৃহত্তর হইবে।

কখন এক বিভুজ ইহার
যে তুই ব'ছে লও একত্র
করিলে অবশিষ্ট বাছ হইতে বৃহত্তর হইবে অর্থাৎ
খক কন একত্র খন হইতে
বৃহত্তর, কথ খন একত্র কন
হইতে বৃহত্তর এবং খন
নক একত্র কথ হইতে বৃহত্তর।



খক রেখা ঘ প্যান্ত বৃদ্ধি করিয়া কঘ কগ সমান কর পরে ঘণ রেখা টান। ঘক কগ পরস্পার সমান এই হেতুক (৫ প্র.) কঘণ এবং কগঘ কোণ দ্বাও পরস্পার সমান স্ত্রাং খগঘ কোণ কগঘ হইতে বৃহত্তর হওয়াতে কঘণ হইতেও বৃহত্তর অতএব খণঘ বিভুজে খগঘ কোণ খঘণ কোণ হইতে বৃহত্তর হওয়াতে খঘ বাছও খগ হইতে বৃহত্তর কোনো (১৯ প্র.) বৃহত্তর কোণের সম্মুখস্থ বাছও বৃহত্তর হয়, কিন্তু খঘ রেখা খক ও কগ এ ছএর যোগ তুলা অতএব খক এবং কগ উভয়ে একত্র খণ হইতে বৃহৎ। এবং কথ খগ একত্র যোগে কগ হইতে, ও খণ গক একত্র যোগে কথ হইতে বৃহৎ তাহাও এই রূপে উপপন্ন হইতে পারে। অতএব বিভুজের যে ছই বাছ, ইত্যাদি।

সং উ.। কঘ = কগ (知報 পাত) ... 스কঘণ = 스কগঘ (৫ প্র.) _থগঘ - 스কগঘ (৯ মৃ. সা.) ... 스খগঘ - 스কঘণ ... খঘ - খগ (১৯ প্র.) খঘ = খক + কঘ == খক + কগ ... খক + কগ - খণ।


PROP. XXI. THEOR.

If from the ends of one side of a triangle, there be drawn two straight lines to a point within the triangle, these two lines shall be less than the other two sides of the triangle, but shall contain a greater angle.

Let the two straight lines BD, CD be drawn from B, C, the ends of the side BC of the triangle ABC, to the point D within it; BD and DC are less than the other two sides BA, AC of the triangle, but contain an angle, BDC greater than the angle BAC.

Produce BD to E; and because two sides of a triangle (20. 1.) are greater than the third side, the two

sides BA, AE of the triangle ABE are greater than BE. To each of these add EC; therefore, the sides BA, AC are greater than BE, EC: Again, because the two sides CE, ED, of the triangle CED are greater than CD, if DB be added to each, the sides CE, EB, will be greater than CD, DB; but it has been shown, that BA. AC are greater than BE, EC; much



more then are BA, AC greater than BD, DC.


Again, because the exterior angle of a triangle (16. 1.) is greater than the interior opposite angle, the exterior angle BDC of the triangle CDE is greater than CED; for the same reason, the exterior angle CEB of the triangle ABE is greater than BAC; and it has been demonstrated that the angle BDC is greater than the angle CEB; much more then is the angle BDC greater than the angle BAC. Therefore, if from the ends of &c. Q. E. D.

Sym. dem. BA + AE > BE (20 of 1.) ... BA + AE + EC = BA + AC > BE + EC. EC + DE

২১ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ত্রিভুজের কোন বাহুর ছুই প্রান্ত হাইতে ছুই সরল রেখা অক্ষিত হইয়া যদি ত্রিভুজের মধ্যে কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তবে এই ছুই রেখা পরস্পর যোগে ত্রিভুজের অন্য ছুই বাহুর যোগ হইতে স্থান হইবে কিন্তু তাহা-দের কোণ বৃহত্তর হইবে।

কথগ ত্রিভুজের খগ বাছরখ এবং গ ছুই অগ্র হইতে খঘ এবং গঘ ছুই রেখা অঙ্কিত হইয়া ত্রিভুজের মধ্যে ঘ চিহ্নে একত্র নিলিতেছে অতএব খঘ ঘগ একত্র খক কগ ছুই বাছর যোগ হইতে ম্যুন হুইবে কিন্তু খঘগ কোণ খকগ কোণ হুইতে অতিরিক্ত হুইবে।



থঘ, ও পর্যন্ত বৃদ্ধি কর তবে কথঙ ত্রিভুজের থক কও এই ছই বাছ একত থঙ হইতে অধিক হইবে কেননা (২০ প্র.)
ত্রিভুজের ছই বাছ একত করিলে তৃতীয় বাছ হইতে অধিক হয়,
পরে এই ছই সমান বস্তুর প্রত্যেকেতে ওগ যোগ কর তবে থক
কগ একত থঙ ওগ হইতে বৃহত্তর। অপিচ গঙঘ ত্রিভুজের গঙ
ওঘ এই ছই বাছ গঘ হইতে অতিরিক্ত স্থতরাং উভয়তঃ ঘখ
যোগ করিলে গঙ ওখ, গঘ ঘখ হইতে অধিক হইবে, পুর্বেষ
উক্ত হইয়াছে থক কগ একত খঙ ওগ হইতে বৃহত্তর স্থতরাং
তাহারা খঘ ঘগ হইতে আরও বৃহত্তর।

অপর। (১৬ প্রা.) ত্রিভ্জের বহিঃস্থ কোণ অস্তরস্থ সশুধ-বর্জি কোণ হইতে অধিক অতএব গঘঙ ত্রিভুজের **স্ত্রিঃ**স্থ খঘগ কোণ গঙ্ঘ হইতে অধিক, এবং ঐ কারণে কখঙ ত্রিভুজের বহিঃস্থ গঙ্খ কোণ থকগ হইতে অধিক, স্মৃতরাং খঘগ, খকগ হুইতে,আরো বৃহত্তর। অতএব ত্রিভুজের কোন বাছর, ইত্যাদি।

সং উ.। খক + কও > খঙ (२০ ৩d.) · . খক + কঙ + ঙা অৰ্থাৎ খক + কন > খঙ + ঙগ¦ ঙগ + ঘঙ > ঘণ 7 DC (20 of l.) \therefore EC + DE + DB = EC + BE 7 BD + DC \therefore much more BA + AC 7 BD + DC. \angle BDC 7 \angle DEC or \angle BEC (16 of l.) \angle BEC 7 \angle BAE or \angle BAC (16 of l.) \therefore much more \angle BDC 7 \angle BAC.


PROP. XXII. PROB.

To construct a triangle of which the sides shall be equal to three given straight lines; but any two whatever of these lines must be greater than the third (20. 1.).

Let A, B, C be the three given straight lines, of which any two whatever are greater than the third, viz. A and B greater than C; A and C greater than B; and B and C than A. It is required to make a triangle of which the sides shall be equal to A, B, C, each to each.

Take a straight line DE, terminated at the point D

but unlimited towards E'and make (3, 1.) **DF** equal to A. FG to B. and GH equal to C; and from the centre F. at the distance FD.describe (3. Post.) the circle DKL: from the centre G, at the distance GH.



describe (3. Post.) another circle HLK; and join KF, KG; the triangle KFG has its sides equal to the three straight lines A, B, C.


Because the point F is the centre of the circle DKL, FD is equal (11. Def.) to FK; but FD is equal to the straight line A; therefore FK is equal to A: Again, because G is the centre of the circle LKH,

(२० প্র.) · ড গ + ঘঙ + ঘথ অর্থাৎ ড গ + খড ৴ খঘ + ঘগ · . থক + কগ ৴ খঘ + ঘগ। ∠খঘগ ৴ ∠ঘঙগ কিয়া খঙগ (১৬ প্র.) ∠খড গ ৴ ∠থকঙ কিয়া থকগ (১৬ প্র.) · . ∠খঘগ ৴ ∠থকগ।

२२ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এমত এক ত্রিভুজ নির্দ্মাণ করিতে হইবে যে তাহার তিন বাছ তিন নিন্দিষ্ট সরল রেখার সদৃশ, এবং এই রেখা ত্রয়ের যে ছুই রেখা লও পরস্পর যোগে তৃতীয় হইতে বৃহত্তর হইবে।

ক, খ, গ, তিন
নির্দিষ্ট সরল রেথা
ইহাদের মধ্যে যে ছই
রেখালও একত্র করিলে
তৃতীয় হইতে অধিক
হইবে অর্থাৎ ক ও
খ, গ হইতে বৃহত্তর; ক
ও গ, খ হইতে বৃহত্তর;
এবং খ ও গ, ক হইতে
বৃহত্তর। এমত এক



তিভুজ করিতে হইবে যাহার তিন বাছ ক্রমশ, ক, খ, গ, সমান।
যঙ এক সরল রেখার ন্যাস কর ঘ বিন্দুতে তাহার সীমা, কিন্তু
ঙ বিন্দুদিকে সীমা নাই, পরে ঘচ, ক সমান, চছ, খ সমান,
এবং ছজ, গ সমান ছেদ কর, এবং চ কেন্দ্র করিয়া চঘ দূরে
এক বৃত্ত আঁক যথা ঘঝট এবং ছ কেন্দ্র করিয়া ছজ্জ দূরে এক
বৃত্ত আঁক যথা জঝট। চ,ট এবং ছ,ট সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত
কর। টচছ তিভুজের তিন বাছ ক্রমশ ক, খ, গ, সমান হইবে।

উ.। টঘঝ বৃত্তের কেন্দ্র চ অতএব চট চঘ সহিত সমান, কিন্তু চঘ, ক সহিত সমান স্মৃতরাং চটও ক সহিত সমান। এবং জঝট বৃত্তের কেন্দ্র ছ অতএব ছট, ছজ্প সহিত সমান কিন্তু ছজ্প, গ সহিত সমান স্মৃতরাং ছটও গ সহিত সমান। এবং চছ, খ GH is equal (11. Def.) to GK; but GH is equal to C; therefore also GK is equal to C; and FG is equal to B; therefore the three straight lines KF, FG, GK, are equal to the three A, B, C: And thefore the triangle KFG has its three sides, KF, FG, GK equal to the three given straight lines, A, B, C. Which was to be done.

Sym. dem. FK = FD (11. Def.) FD = A (by constr.) $\therefore FK = A$ (1. Ax.) GK = GH (11. Def.) GH = C (by constr.) $\therefore GK = C$, FG = B (by constr.) $\therefore FK + FG + GK = A + B + C$ each to each.


PROP. XXIII. PROB.

At a given point in a given straight line, to make a rectilineal angle equal to a given rectilineal angle.

Let AB be the given straight line, and A the given point in it, and DCE the given rectilineal angle; it is

required to make an angle at the given point A, in the given straight line AB, that shall be equal to the given rectilineal angle DCE.

In CD, CE, take any points D, E, and join DE; and make (22. 1) the triangle AFG, the sides of which shall



be equal to the three straight lines, CD, DE, CE, so that CD be equal to AF, CE to AG, and DE to FG; and because DC, CE are equal to FA, AG, each to each, and the base DE to the base FG; the angle DCE is equal (8. 1.) to the angle FAG. Therefore, at the given point A in the given straight line AB, the angle FAG is made equal to the given rectilineal angle DCE. Which was to be done.

Sym. dem. AF = CD (by constr.) AG = CE (by constr.) FG = DE (by constr.) $\therefore \angle FAG = \angle DCE$

(8 of 1.)


সহিত সমান, অতএব ঘচ, চছ, এবং ছজ এই তিন রেখা ক, খ, গ, সহিত ক্রমশ সমান, স্কুতরাং টচ্ছ ত্রিভুজের তিন বাছ কুখা সহিত ক্রমশ সমান।

সং উ.। চট = চঘ (১১ সংজ্ঞা) চঘ = ক (অঙ্কপতি) \therefore চট = ক (১ স্ব.সা)। ছট = ছজ (১১ সংজ্ঞা) চজ = গ (অঙ্কপতি) \therefore ছট = গ। চছ = খ। \therefore ক্রমশ চট + চছ + ছট = ক + খ + গ।

২৩ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদা।

এক নির্দিষ্ট সরল রেখার নির্দিষ্ট বিন্তুতে এক নির্দিষ্ট সরল রৈথিক কোণ তুল্য সরল রৈথিক কোণ করিতে হইবে।

কথ এক নির্দিন্ট সরল রেখা তাহার মধ্যে ক নির্দিন্ট বিন্দু এবং ঘগঙ নির্দিন্ট সরল বৈথিক কোন। থক রেখার ক বিন্দুতে এমত এক সরল রৈথিক কোন করিতে হইবে যাহ। ঘগঙ সহিত সমান হয়।



গঘ এবং গঙ মধ্যে ছুই রিন্তুর নির্দেশ কর যথা ঘ এবং ঙ এবং ঘঙ রেখা টান, পরে (২২ প্র.) কচছ ত্রিভুজ এমত করিয়া আঁক যেন কচ, গঘ সমান, কছ, গঙ সমান এবং চছ, ঘঙ সমান হয়। অতএব গঘ গঙ ক্রমশ কচ কছ সমান হওয়াতে আর ঘঙ ভূমিও চছ ভূমি তুলা হওয়াতে ঘগঙ কোণ (৮ প্র.) চকছ কোণের সহিত সমান। স্থতরাং কথ রেখার ক বিন্তুতে এক কোণ হইয়াছে যাহা ঘগঙ সহিত সমান। ইহাই এস্থলে সম্পাদ্য।

সং উ.। কচ — গঘ। কছ — গঙ। চছ — ঘঙ (অঙ্কপাত) ∴ ∠ চকছ — ∠ ঘগঙ (৮ প্র.)

PROP. XXIV. THEOR.


If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, each to each, but the angle contained by the two sides of the one greater than the angle contained by the two sides of the other; the base of that which has the greater angle is greater than the base of the other.

Let ABC, DEF be two triangles which have the two sides AB, AC equal to the two DE, DF, each to each, viz. AB equal to DE, and AC to DF; but the angle BAC greater than the angle EDF; the base BC is also greater than the base EF.

Of the two sides DE, DF, let DE be the side which is not greater than the other, and at the point D, in the straight line DE, make (23. 1.) the angle EDG equal to the angle BAC; and make DG equal (3. 1.) to AC or DE, and join EG, GF.

Because AB is equal to DE, and AC to DG, the two sides BA, AC are equal to the two ED, DG, each

to each, and the angle BAC is equal to the angle EDG, therefore the base BC is equal (4. 1.) to the base EG; and because BG is equal to DF, the angle DFG



is equal (5. 1.) to the angle DGF; but the angle DGF is greater than the angle EGF; therefore the angle DFG is greater than EGF; much more is the angle EFG greater than the angle EGF; and because the angle EFG of the triangle EFG is greater than its angle EGF, and because the greater (19. 1.) side is

২৪ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

তুই ত্রিভুজের মধ্যে যদি একটার ছুই বাছ অন্যের ছুই বাছর সহিত প্রত্যেকে সমান হয় কিন্তু একটার ঐ বাছ দ্বয়ের মধ্য-বর্ত্তি কোণ যদি অন্যটার বাছ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি কোণ হইতে বৃহত্তর হয় তবে যে ত্রিভুজে ঐ বৃহত্তর কোণ আছে তাহার ভূমিও অন্যের ভূমি হইতে বৃহত্তর হইবে।

কখণ এবং

ঘণ্ডচ ছই তি ভুজ

তাহাদের মধো

কখু কণ ব'ছে

দ্বয় ঘণ্ড ঘচ ব'ছে

দ্বয়ের সহিত ক্র
মশ সমান কিন্তু

থকণ কোণ গুঘ্চ শ্

কে'ণ হইতে বৃহ

ভর। খগ ভূমিও ৩চে ভূমি হইতে বৃহত্তর।

ঘঙ, ঘচ তুই বাহুর মধ্যে ঘঙ যেন বৃহত্তর নহে এমত কল্পনা কর পরে ঘঙ রেখার ঘ বিন্তুতে ওঘছ কোণ থকগ সমান করিয়া (২৩ প্র[.]) অঙ্কিত কর এবং ঘছ রেখাকে কগ অথবা ঘচ সমান কর ও ওছ, চছ এই২ রেখা টান।

কথ, ঘণ্ড সমান ও কগ, ঘছ সমান সুতরাং থক, ও কগ, গুঘ ও ঘছ সহিত ক্রমশ সমান এবং থকগ কোণও গুঘছ কোণের তুল্য, অতএব (৪ প্র.) থগ ভূমিও গুছ সহিত সমান। অপর ঘচ, ঘছ, পরস্পার সমান হওয়াতে (৫ প্র.) ঘছচ কোণও ঘচছ কোণের সমান কিন্তু ঘছচ কোণ (৯ মৃ. সৃ.) গুছচ হইতে বৃহত্তর স্থৃতরাং ঘচছও গুছচ হইতে বৃহত্তর তবে গুচছ, গুছচ হইতে আবো বৃহত্তর অতএব গুচছ ত্রিভূজে গুচছ কোণ গুছচ হইতে বৃহত্তর থাকাতে এবং (১৯ প্র.) বৃহত্তর কোণের সম্মুখন্থ বাছও বৃহত্তর হওয়াতে গুছ, গুচ হইতে বৃহত্তর সিদ্ধা হইল, এবং গুছ, opposite to the greater angle, the side EG is greater than the side EF; but EG is equal to BC; therefore also BC is greater than EF. Therefore, if two triangles, &c. Q. E. D.

Sym. dem. AB = DE (by Hyp.) AC = DG (by constr.) $\angle BAC = \angle EDG$ \therefore (4 of 1.) BC = EG; DG = DF \therefore $\angle DGF = \angle DFG$; $\angle DGF$ \neq $\angle EGF$ \therefore $\angle DFG$ \neq $\angle EGF$ \therefore much more $\angle EFG$ \neq $\angle EGF$ \therefore (19 of 1.) EG \neq EF \therefore EG \neq EF.


PROP. XXV. THEOR.

If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the other, each to each, but the base of the one greater than the base of the other; the angle contained by the sides of that which has the greater base, is greater than the angle contained by the sides of the other.

Let ABC, DEF be two triangles which have the two sides AB, AC equal to the two sides DE, DF, each to each, viz. AB equal to DE, and AC to DF; but let the base CB be greater than the base EF; the angle BAC is likewise greater than the angle EDF.

For, if it be not greater, it must either be equal to it, or less; but the angle BAC is not equal to the angle

EDF, because then the base BC would be equal (4.1.) to EF; but it is not; therefore the angle BAC is not equal to the angle EDF; neither is it less; because then the base BC would be less (24.1.) than the base EF; but it is not; therefore the angle BAC is not less than the




খিগ সহিত সমান হওয়াতে খগও ওচ হইতে বৃহত্তর হইবে। অতএব দুই ত্রিভুজের মধ্যে, ইত্যাদি।

২৫ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ছুই ত্রিভ্জের মধ্যে একটার ছুই বাছ অন্যের দুই বাছর সহিত প্রত্যেকে সমান ছইলে যদি ভূমি বৃহত্তর হয় তবে যে ত্রিভুজের ভূমি বৃহত্তর তাহার বাছ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি কোণ্ও অন্যের বাছ দ্বয়ের মধ্যুস্থ কোণ হইতে বৃহত্তর হইবে।

কথগ ও ঘণ্ডচ ছই ত্রিভুজ তাহার মধ্যে কথ ও
কগ, ঘণ্ড ও ঘচ সহিত
ক্রমশ সমান অর্থাৎ কথ,
ঘণ্ড সহিত ও কগ, ঘচ সহিত সমান; কিন্তু থগ ভূমি
গুচ ভূমি হইতে বৃহত্তর।
থকগ কোণও গুঘচ হইতে খ
বৃহত্তর হইবে।



উ.। কেননা যদি বৃহত্তর না হয় তবে সমান কিয়া লঘুতর হইবে। কিন্তু থকগ কোণ ওঘচ কোণের সমান হইতে পারে না কেননা তাহা হইলে (৪ প্র.) থগ ভূমি ওচ ভূমি সমান হইত, ফলত এস্থলে ভূমি সমান নহে স্থতরাং উক্ত কোণদ্বয়ও সমান হইতে পারে না। এবং থকগ, ওঘচ হইতে লঘুতর নহে কেননা তাহা হইলে (২৪ প্র.) থগ ভূমি ওচ হইতে লঘুতর হইত, তাহা এস্থলে নহে, অতএব কথগ কোণ ওঘচ হইতে লঘুতর নহে এবং সমানও নহে স্থতরাং বৃহত্তর। অতএব ছুই তিভূজের মধ্যে, ইত্যাদি।

angle EDF; and it was shown that is not equal to it: therefore the angle BAC is greater than the angle EDF. Wherefore, if two triangles, &c. Q. E. D.

Sym. dem If \angle BAC \neq \angle EDF, it is either == or


Sym. dem If $\angle BAC \neq \angle EDF$, it is either = or $\angle \angle EDF$. Suppose $\angle BAC = \angle EDF$. (4 of 1.) BC = EF but by Hyp. it is not so $\therefore \angle BAC \neq \angle EDF$. Again suppose $\angle BAC \angle \angle EDF$. by (24 of 1) BC $\angle EF$ but by Hyp. it is not so $\therefore \angle BAC \neq \angle EDF$. $\angle BAC \neq \angle EDF$.

PROP. XXVI. THEOR.

If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each; and one side equal to one side, viz. either the sides adjacent to the equal angles, or the sides opposite to the equal angles in each; then are the other sides equal, each to each; and also the third angle of the one is equal to the third angle of the other.

Let ABC, DEF be two triangles, which have the angles ABC, BCA equal to the angles DEF, EFD, viz. ABC to DEF.

and BCA to EFD; A and Which have also one side equal to one side; and first, let those sides be equal which are adjacent to the angles that are equal, in the two triangles, viz. BC to EF; the other




sides shall be equal, each to each, viz. AB to DE, and AC to DE; and the third angle BAC to the third angle EDF.

For, if AB be not equal to DE, one of them must be the greater. Let AB be the greater of the two, and make BG equal to DE, and join GC; therefore, because BG is equal to DE, and BC to EF, the two সং উ.। যদি ∠খকণ ≯ ∠ঙ্ঘচ তবে তাহা = অথবা ∠ ∠ঙ্ঘচ | প্রথমতঃ যেন ∠খকণ = ∠ঙ্ঘচ ∴ (৪ প্র.) খণ = ঙচ ইহাতে কল্পনার ব্যতিক্রম। ∴ ∠খকণ ≠ ∠ঙ্ঘচ । পুনশ্চ যেন ∠খকণ ∠ ∠ঙ্ঘচ ∴ (২৪ প্র.) খণ ∠ ঙ্চ। ইহাতেও কল্পনার ব্যতিক্রম। ∴ ∠খকণ ഺ ∠ঙ্ঘচ ∴ ∠খকণ ¬ Հঙ্ঘচ i

২৬ প্রতিজ্ঞা—উপপাদা।

ছই ত্রিভুজের মধ্যে যদি একটার দুই কোণ প্রত্যেকে অন্যের দুই কোণের সমান হয় এবং একং বাছও সমান হয় অর্থাং সমান কোণে ব্রের সংলগ্ন অর্থবা সম্মুখন্থ বাছ দ্বয়ও যদি ঐ দুই ত্রিভুজে সমান হয় তবে অবশিক্ত দুই বাছও প্রত্যেকে সমান হইবে এবং একটার ত্তীয় কোণেও অন্যের তৃতীয় কোণের তুলা হইবে।


কথগ এবং ঘণ্ডচ
ছুই ত্রিভুজ তাহার
মধ্যে কথগ ও কগথ
এই কেলে দয় ঘণ্ডচ ও
ঘচণ্ড সহিত ক্রমশ সমান অর্থাং কথগ,
ঘণ্ডচ সহিত ও কগথ,
ঘচণ্ড সহিত সমান
এবং তাহাদের একং



িবাছও পরস্পর সমান। প্রথমতঃ, সমান কোণ দ্বরের সমীপত্ত বাছ দ্বয় অর্থাৎ থগ ওচ পরস্পর সমান কল্পনা কর তবে মবশিন্ট বাছও প্রত্যেকে পরস্পর সমান হইবে অর্থাৎ কথ, বঙ সহিত ও কগ, ঘচ সহিত সমান হইবে এবং অবশিন্ট কোণ বিক্য ও ওঘচ ইহারাও পরস্পর সমান হইবে।

উ.। কথ যদি ঘণ্ড সমান না হয় তবে ইহাদের মধ্যে একটা অবশ্য বৃহঁত্তর হইবে। কথ বৃহত্তর হউক, অতএব কথ হইতে ভি সমান এক খণ্ড অর্থাৎ খছ ছেদ কর। খছ ঘণ্ড সমান, ও sides GB, BC are equal to the two DE, EF, each to each; and the angle GBC is equal to the angle DEF; therefore the base GC is equal (4. 1.) to the base DF, and the triangle GBC to the triangle DEF, and the other angles to the other angles, each to each, to which the equal sides are opposite; therefore the angle GCB is equal to the angle DFE; but DFE is by the hypothesis, equal to the angle BCA; wherefore also the angle BCG is equal to the angle BCA, the less to the greater, which is impossible; therefore AB is not unequal to DE, that is, it is equal to it; and BC is equal to EF; therefore the two AB, BC are equal to the two DE, EF, each to each; and the angle ABC is equal to the angle DEF; therefore the base AC is equal to (4. 1.) the base DF, and the angle BAC to the angle EDF.

Next, let the sides which are opposite to equal angles in each triangle be equal to one another. viz. AB to DE; likewise in this case, the other sides shall be equal, AC to DF, and BC to EF; and




also the third angle BAC to the third EDF.

For, if BC be not equal to EF, let BC be the greater, and make BH equal to EF, and join AH; and because BH is equal to EF, and AB to DE; the two AB, BH are equal to the two DE, EF, each to each, and they contain equal angles; therefore (4. 1.) the base AH is equal to the base DF, and the triangle ABH to the triangle DEF, and the other angles are equal, each to each, to which the equal sides are opposite; therefore the angle BHA is equal to the angle EFD; but EFD is equal to the angle BCA; therefore also the angle BHA is equal to the angle BCA, that is, the exterior

, খগ, ওচ সমান হওয়াতে খছ ও খগ ক্রমশ ঘও ও ওচ সহিত সমান, এবং ছখগ কোণ ঘওচ কোণের সমান অতএব (৪ প্র.) ছগ ভূমি ঘচ সহিত সমান এবং ছখগ ত্রিভুজ ঘওচ সহিত সমান ও সমান বাহুর সম্মুখত অন্যান্য কোণও ক্রমশ পরস্পর সমান স্তরাং ছগথ কোণ ঘচও সহিত সমান, এবং কগথ, ঘচও সহিত সমান হওয়াতে ছগথ (১ ম. মা.) কগথ সহিত সমান, ইহা অসাধ্য, কেননা (৯ ম. মা.) ছগথ, কগথ হইতে লঘুতর অতএব কথ, ঘও রেখার অসমান নহে অর্থাৎ সমান, কথ, ঘও সমান হওয়াতে এবং খগ, ওচ সনান থাকাতে কথ, খগ ক্রমশ ঘঙ, ওচ সহিত সমান এবং কথগ কোণও ঘওচ সহিত সমান অতএব (৪ প্র.) কগ, ঘচ সহিত সমান ও থকগ কোণ ওঘচ সহিত সমান।

দ্বিতীয়তঃ,ঐ দুই ত্রিভুজে সমানহ কোণের সমাপত্ত বাছ অর্থাৎ
কথা ও ঘণ্ড সমান
হউক এত্তলেও অবশিষ্ট বাছা ও কোণ
সমান হইবে অর্থাৎ
থগ, ওচ সহিত ও





কগ, ঘচ সহিত এবং খকগ কোণ ওঘচ সহিত সমান হইবে।
উ.। যদি খগ, ওচ সহিত সমান না হয় তবে একটা
অপেক্ষা অন্যটা বৃহত্তর হইবে, খগ বৃহত্তর হউক, তাহা হইতে
খজ এক অংশ ওচ সমান করিয়া ছেদ কর এবং ক, জ সরল
রেখাতে সংগুক্ত কর। খজ, ওচ সহিত ও কথ, ঘও সহিত
সমান হওয়াতে কথ, থজ ক্রমশ ঘও ওচ সহিত সমান এবং
তাহাদের মধ্যবর্ত্তি কোণও সমান, অতএব (৪ প্র.) কজ ভূমি
ঘচ ভূমির সহিত সমান এবং কখজ ত্রিভুক্ত ঘওচ ত্রিভুক্তের
সমান এবং সমান বাহুর সম্মুখত্ব অবশিক্ত কোণও সমান তরিমিত্তে খজক কোণ ঘচও সহিত সমান। এবং কগধ, ঘচও সহিত

angle BHA of the triangle AHC is equal to its interior opposite angle BCA: which is impossible (16. 1); wherefore BC is not unequal to EF, that is, it is equal to it; and AB is equal to DE; therefore the two AB, BC, are equal to the two DE, EF, each to each; and they contain equal angles; wherefore, the base AC is equal to the base DF, and the third angle BAC to the third angle EDF. Therefore. if two triangles, &c. Q. E. D.

First Case.—Sym. dem. If AB \neq DE cut off GB = DE then \therefore GB = DE, BC = EF, \angle GBC = \angle DEF \cdot . (4 of 1.) GC = DF and \triangle GBC = \triangle DEF and \angle GCB = \angle DFE but (by hyp.) \angle ACB = DFE \cdot . \angle GCB = \angle ACB which is impossible (9. Ax.) \cdot . AB is not \neq DE i. e. AB = DE. \cdot . AB = DE, BC = EF, \angle ABC = \angle DEF \cdot . AC = DF, \triangle ABC = \triangle DEF, \angle BAC = \angle DEF (4 of 1.)

Second Case.—Sym. dem.—If BC \neq EF cut off BH = EF then \because AB = DE, BH = EF, \angle ABC = \angle DEF \therefore (4. of 1.) AH = DF and \angle BHA = \angle DFE but \angle DFE = \angle ACB \therefore \angle BHA = \angle ACB which is impossible \because (16. of 1.) \angle BHA \Rightarrow \angle ACB \therefore BC is not \neq EF i. e. BC = EF. And \because BC = EF, AB = DE, \angle ABC = \angle DEF \therefore AC = DF, \triangle ABC = \triangle DEF, \angle BAC = \angle EDF.

PROP. XXVII. THEOR.

If a straight line falling upon two other straight lines makes the alternate angles equal to one another, these two straight lines are parallel.

Let the straight line EF, which falls upon the two straight lines AB CD, make the alternate angles AEF, EFD equal to one another; AB is parallel to CD.

For, if it be not parallel, AB and CD being produced shall meet either towards B, D, or towards A, C; let them be produced and meet towards B, D in the point G; therefore GEF is a triangle, and its exterior

সমান হওয়'তে খজক, কগথ সহিত সমান, পরস্ত (১৬ প্র.) বহিঃস্থ কোণ অন্তরম্থ সম্মুখবর্তি কোণ হইতে বৃহত্তর স্মৃতরাং খজক, কগথ সমান হওয়়া অসাধ্য, অতএব খগ, ওচ সহিত বিষম নহে অর্থাৎ সমান, এবং কথ, ঘণ্ড সমান হওয়াতে কথা ও খগ, ও ঘণ্ড ও ওচ সহিত সমান তাহাদের মধ্যবর্তি কোণও সমান স্মৃতরাং (৪ প্র.) কগ ভূমি ঘচ সহিত এবং থকগ কোণ ওঘচ সহিত সমান। অতএব ত্বই ত্রিভুজের মধ্যে, ইত্যাদি। সং. উ.। ১ প্রকরণ। যদি কথা ≠ ঘণ্ড তবে ছথা — মণ্ড কর। 😯 ছথা — ঘণ্ড, থগা — ওচ, এছথা — এঘণ্ড েবং এবং এছগাৰা (৪ প্র.) ছগা — ঘাচ, এ ছথা — এ ঘণ্ডচ, এবং এহং বিভ্


২ প্রকরণ। যদি খগ \neq ওচ তবে খন্ধ = ওচ কর। \cdot কথ = ঘচ, খন্ধ = ওচ, এক = ওচ, এক = ঘচ, এক ক = এচ ও কিন্তু কিন্তু এচ ও = এক গথ \cdot এথ জন্দ = এক গথ \cdot এক কথ = এক গথ \cdot এক কথ = এচ নহে জার্থাং খন = ওচ। জার \cdot খন = ওচ, কথ = ঘড, এক ন = এচ, এক কথ = এচ, এক ন = এচ তচ, এচ ন = এচ

২৭ প্রতিজ্ঞা— উপপাদ্য।

ছই সরল রেখার উপর অন্য এক সরল রেখার সম্পাত হইলে যদি এক পার্শ্বন্থ কোণ অপর পার্শব্ধ কোণের সহিত সমান হয় তবে ঐ ছুই সরল রেখা সমানান্তরাল হইবে।

ঙ্চ ষরল রেখা কথ ও গঘ সরল রেখার উপর পড়িয়া ভিন্ন২ পার্শ হ কোন অর্থাৎ কঙচ ও ঙচ্ঘ সমান করুক, তবে 'কথ, গঘ সমানান্তরাল হইবে। angle AEF is greater (16. 1.) than the interior opposite angle

EFG; but it is also equal to it, which is impossible; therefore AB and CD being produced, do not meet towards B, D. In like manner, it may be demonstrated.




that they do not meet towards A, C; but those straight lines which meet neither way, though produced ever so far, are parallel (30. Def.) to one another. AB therefore is parallel to CD. Wherefore, if a straight line, &c. Q E. D.

Sym. dem. If AB # CD they must meet, and EGF then is a $\triangle \therefore \angle AEF = \angle EFD$ (16. of 1.) but (by Hyp.) $\angle AEF = \angle EFD \therefore AB \parallel CD$.


PROP. XXVIII. THEOR.

If a straight line falling upon two other straight lines makes the exterior angle equal to the interior opposite angle, upon the same side of the line; or makes the interior angles upon the same side together equal to two right angles; the two straight lines are parallel to one another.

Let the straight line EF, which falls upon the two straight lines AB, CD, make the exterior angle EGB equal to GHD, the interior opposite angle upon the same side; or let it make



উপপত্তি। — কথ,
গঘ যদি সমানান্তরাল
না হয় তবে বৃদ্ধি পাইলে খ, ঘ কিয়া ক
গ দিকে অবশ্য সংলগ্ন হইবে। বৃদ্ধি পাইয়া খ, ঘ দিকে ছ




বিন্দুতে সংলগ্ন হউক তাহাতে ছণ্ডচ এক ত্রিভুক্ত হইল অতএব (১৬ প্র.) বহিন্দ কোন কণ্ডচ অন্তরন্থ সন্মুখবর্ত্তি ওচছ হইতে বৃহত্তর কিন্দু ইহাকে সমান কল্পনা করা গিয়াছে সূত্রাং ইহা অসাধ্য, এবং কথ, গঘ বৃদ্ধি পাইলে থ, ঘ দিকে সংলগ্ন হইবে না। কও, গ দিকে সংলগ্ন হইবে না ইহাও তদ্ধপ উপপন্ন হইবে অতএব বৃদ্ধি পাইলেও কোন দিকে সংলগ্ন না হওয়তে ইহার। (৩০ সং) সমানান্তরাল। সূত্রাং দুই সরল রেখা, ইত্যাদি।

সং উ.। যদি কথ + গঘ তবে পরস্পর সংস্পর্শ করিবে এবং ওচচ এক Δ \therefore \angle কণ্ডচ \neg \angle ওচেঘ (১৬ প্র.) কিন্তু (কল্পনাতে) \angle কণ্ডচ = \angle ওচঘ \therefore কথ \parallel গঘ।

২৮ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

দুই সরল রেথার উপর অন্য এক সরল রেথার সম্পাতে যদি তাহার এক পার্থের বহিন্থ কোণ অন্তরত্ব সম্পুথবর্ত্তি কোণের সমান হয় অথবা যদি এক পার্থের দুই অন্তরত্ব কোণ একত্র যোগে দুই সমকোণ তুলা হয় তবে ঐ দুই সরল রেথ। সমানান্তরাল।

কথ এবং গঘ সরল রেখার উপর ওচ সরল রেখা পড়িয়া ওছথ ব-হিস্থু কোণকে ছজ্ব এক পার্ম্বের অস্তরস্থ সম্মুখ-বর্ত্তি কোণের সমান করি তেছে এবং এক পাম্বের্ট্র



the interior angles on the same side BGH, GHD together equal to two right angles; AB is parallel to CD.


Because the angle EGB is equal to the angle GHD, and also (15. 1.) to the angle AGH, the angle AGH is equal to the angle GHD; and they are the alternate angles; therefore AB is parallel (27. 1.) to CD. Again, because the angles BGH, GHD are equal (by Hyp.) to two right angles, and AGH, BGH, are also equal (13. 1.) to two right angles, the angles AGH, BGH are equal to the angles BGH, GHD; take away the common angle BGH: therefore, the remaining angle AGH is equal to the remaining angle GHD; and they are alternate angles; therefore, AB is parallel to CD. Wherefore, if a straight line &c. Q. E. D.

Sym. den. $\angle EGB = \angle GIID$, $\angle AGH = \angle EGB$ (15. of 1.) \therefore $\angle AGH = \angle GIID$ (1. Ax.) \therefore $AB \parallel CD$ (27. of 1.) Again $\angle BGH + \angle GHD = 2$ Rt. $\angle s$ and $\angle AGH + \angle BGII = 2$ Rt. $\angle s$ (13. of 1.) \therefore $\angle BGH + \angle GHD = \angle AGH + \angle BGII$ (1. Ax.) \therefore $\angle AGII = \angle GHD$ (3. Ax.) \therefore $AB \parallel CD$ (27. of 1.)

PROP. XXIX. THEOR.

If a straight line fulls upon two parallel straight lines, it makes the alternate angles equal to one another; and the exterior angle equal to the interior opposite angle, upon the same side; and likewise the two interior angles upon the same side together equal to two right angles

Let the straight line EF fall upon the parallel straight lines AB, CD; the alternate angles AGH, GHD are equal to one another; and the exterior angle EGB is equal to the interior opposite angle,



ে অন্তরন্ত কোণ দয়কে অর্থাৎ খছজ এবং ছজঘ একতা দুই সমকো-ংনের তল্য করিতেছে অতএব কথ এবং গঘ সমানান্তরাল হইবে।


উপপত্তি। গুছথ কোণ ছজঘ সমান এবং কছজ সহিতও সমান (১৫ প্র.) সুতরাং (১ স্ব. সা) কছজ, ছজঘ সমান, আর ইহারাই ভিন্ন২ পার্ম্মস্থ কোণ, অতএব (২৭ প্র.) কথ এবং গঘ সমানান্তরাল। পুনশ্চ থছজ এবং ছজঘ কোণ দ্বয় দুই সমকোণ তুল্য এবং খছজ ও কছজ কোণ দ্বয়ও দুই সমকোণ তুল্য (১৩ প্র.) অতএব খছজ ও ছজঘ একত্র খছজ ও কছজ সহিত সমান সুতরাং সামান্য কোণ খছজ বিয়োগ করিলে অবশিক্ত কছজ ও ছজঘ পরস্পার সমান আর ইহারাই ভিন্ন২ পার্ম্ম কোণ অতএব কথ ও গঘ সমানান্তরাল। এই রূপে দুই সরল রেখার উপর, ইত্যাদি।

সং. উ. | ∠ওছখ == ∠ওজঘ, ∠কছজ == ∠ওছখ (১৫ প্র.) :. ∠কছজ == ∠ছজঘ (১ ষ. সা.) :. কথ || গঘ (২৭ প্র.) | অপিচ, ∠খছজ + ∠ছজঘ == ২ সম কোণ এবং ∠কছজ + খছজ == ২ সমকোণ ∠(১৩ প্র.) :. ∠খছজ + ∠ছজঘ == ∠কছজ + খছজ :. ∠কছজ == ∠ছজঘ (১ ষ. সা.) :. কথ || গঘ (২৭ প্র.) |

২৯ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য !

দুই সমানান্তরাল সরল রেখার উপর কোন সরল রেখার সম্পাত হইলে এক পাশ্ব কোণ অপর পাশ্ব কোণের সমান হইবে ও এক পাশ্বের বহিঃস্থ কোণ অন্তরত্ব সম্মুখবর্ত্তি কোণের সমান হইবে এবং এক পাশ্বের দুই অন্তরম্ব কোণ একত্র যোগে দুই সমকোণ তুলা হইবে।

কথ ও গঘ সমানান্তরাল রেখা, ওচ তাহাদের
উপর পড়িতেছে। অতএব কৃছজু, ছজঘ ভিন্ন২ ভূ
পাশ্বস্থ কোণ পরস্পার সমান হইবে এবং বহিঃস্থ
কোণ ওছথ অন্তরন্থ সক্ষ্



upon the same side, GHD; and the two interior angles BGH, GHD, upon the same side, are together equal to two right angles.

For if AGH be not equal to GHD, let KG be drawn, making the angle KGH equal to GHD, and produce KG to L; then KL will be parallel to CD (27. 1.); but ABis also parallel to CD; therefore two straight lines are drawn through the same point G, parallel to CD, and vet not coinciding with one another, which is impossible (11. Ax.). The angles AGH, GHD therefore are not unequal, that is, they are equal to one another. Now, the angle EGB is equal to AGH (15. 1.); and AGH has been proved to be equal to GHD:-therefore, EGB is likewise equal to GHD :-add to each of these the angle BGH; therefore, the angles EGB BGH are equal to the angles BGH, GHD, but EGB, BGH are equal (13. 1.) to two right angles; therefore BGH, GHD are also equal to two right angles. Wherefore, if a straight line, &c. Q. E. D.

Con If two lines KL and CD make, with EF, the two angles KGH, GHC taken together less than two right angles, KG and CH will meet on the side of EF on which the two angles are, that are less than two right angles.

For if not, KL and CD are either parallel, or they meet on the other side of EF; but they are not parallel; for the angles KGH, GHC would then be equal to two right angles. Neither do they meet on the other side of EF; for the angles LGH, GHD would then be two angles of a triangle, and less than two right angles; but this is impossible; for the four angles KGH, HGL, CHG, GHD are together equal to four right angles (13.1), of which the two, KGH, CHG are by supposition less than two right angles; therefore, the other two, HGL, GHD are greater than two right angles. Therefore, since KL and CD are not parallel, and since they do not meet towards L and D, they must meet if produced towards K and C.

·ধবর্ত্তি কোণ ছজঘ সমান হইবে ও এক পার্শ্বের দৃই অন্তরস্থ কোণ খছজ ও ছজঘ একত্র দৃই সমকোণ তুল্য হইবে।

উ.। যদি কছজ, ছজঘ সমান না হয় তবে টছজ, ছজঘ সমান করত টছ সরলরেখা টানিয়া ঠ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর তাহাতে (২৭ প্র.) টঠ, গঘ সমানান্তরাল হইবে কিন্তু কথ, গঘ সমানান্তরাল স্কুতরাং কথ, টঠ সমাক না মিলিয়া কেবল এক বিন্তুতে সংস্পর্শ করিয়া উভয়ে গঘ সমানান্তরাল হয় ইহা অসংধ্য (১১ স্ব. সা.)। অতএব কছজ ও ছজঘ কোণ দ্বয় পরস্পার বিষম নহে অর্থাং সমান। অপর ওছখ, কছজ সমান (১৫ প্র.) স্কুতরাং ওছখ ও ছজঘ সমান এবং ইহাতে খছজ যোগ করিলে ওছখ ও খছজ এবং ছজঘ ও খছজ একত্র সমান। পরন্ত ওছখ ও খছজ দুই সমকোণ তুল্য (১৩ প্র.) স্কুতরাং ছজঘ ও খছজ দুই সমকোণ তুল্য। অতএব দুই সমানান্ত-রাল সরল রেখার উপর, ইত্যাদি।

অন্থ্যান। যদি টঠ এবং গঘ দুই সরল রে**খা** ওচ্ সরল রেখা সংযোগে টছজ এবং ছজগ কৌণ দয়কে একত্র দৃই সম-কোণের স্থান করে তবে এই দুই কেংণের দিকে বৃদ্ধি প ইলে कान जातन भवन्यात मरम्भागं केवित्व । किनना यनि ना मरम्भागं করে তবে হয় সমানান্তরাল হইবে নত্তবা ওচ সরল রেখার खना मिरक मर्म्भमं कतिरव। किन्छ তাহার। সমানান্তরাল নহে কেননা তাহা হইলে টছজ ও ছজগ কোণ দয় দুই সম কোণের সমান হইত। এ**ব্লং** ওচ রেখার অন্য দিকেও সংস্পার্শ করিবে না কেননা তাহাঁ হইলে ১ছজ ও ছজঘ ত্রিভুজের দুই কোণ হইয়া দুই সমকোণের স্থান হইত ফলত তাহা অসাধ্য কেননা টছজ, জছঠ, গজছ, ছজঘ এই চারি কোণ (১৩ প্র.) চারি সমকোণ তুল্য তাহার মধ্যে টছজ ও ছজ্ঞ দুই সম-কোণের ম্যান কল্পিত হইয়াছে স্মতরাং জছঠ ও ছজ্জঘ দুই সম কোণের অধিক হইবে। অতএব টঠ এবং গঘ সমানান্তরাল ना श्वराटि ७ रे, घ मिटक मर्म्मा ना कताट व्यवमा है, भ **क्टिक मर्ज्यमं** क्विट्य।

Sym. dem. If \angle AGH \neq \angle GHD make KGH = GHD (23 of 1) \therefore KL \parallel CD (27 of 1) but AB \parallel CD (by Hyp.) This is impossible (11 Ax) \therefore \angle AGH = \angle GHD And \therefore \angle AGH = \angle EGB (15 of 1) \therefore \angle GHD = \angle EGB (1 Ax.) \therefore \angle GHD + \angle BGH = \angle EGB + \angle BGH (2 Ax.) = 2 Rt. \angle s (13 of 1.)


PROP. XXX. THEOR.

Straight lines which are parallel to the same straight line are parallel to one another

Let AB, CD, be each of them parallel to EF; AB is also parallel to CD.

Let the straight line GHK cut AB, EF, CD; and because GHK cuts the

because GHK cuts the parallel straight lines AB EF, the angle AGH is equal (29. 1.) to the A angle GHF. Again, because the straight line GK cuts the parallel straight lines EF, CD, the angle GHF is equal (29. 1.) to the angle GKD; and it was shown that the angle AGK is equal to the angle CHF:



equal to the angle GHF; therefore also AGK is equal to GKD; and they are alternate angles; therefore AB is parallel (27. 1.) to CD. Wherefore, straight lines &c. Q. E. D.

Sym. dem. \therefore AB || EF, \angle AGH = \angle GHF (29 of 1.) And \therefore EF || CD \angle GHF = \angle HKD (29 of 1) \therefore \angle AGH = \angle HKD (1 Ax.) \therefore AB || CD.

PROP. XXXI. PROB.

To draw a straight line through a given point parallel to a given straight line.

Let A be the given point, and BC the given straight

সং. উ.। যদি ∠ক্ছজ ≠ ∠ছজ্ঘ তবে ট্ছজ == ছজ্য কর (২৩ প্র.) .. ট১ || গঘ (২৭ প্র.) কিন্তু (কল্পনাতে) কথ || গঘ! ইহাঅসাধ্য (১১ মৃ. সা.) ... ∠ক্ছজ == ∠ছজ্ঘ। অপর ... ∠ক্ছজ == ∠ঙ্ছ্থ (১৫ প্র.) ∠ছজ্ঘ == ∠ঙ্ছ্থ (১ মৃ. সা.) ∠ছজ্ঘ + ∠থ্ছজ == ∠ঙ্ছ্থ + ∠থ্ছজ == ২ সম ∠

৩০ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

যে২ সরল রেখা কোন এক সরল রেখার সমানান্তরাল তাহারা প্রস্পারও সমানান্তরাল।

কথ ও গঘ উভয়ে ওচ সহিত
সমানান্তরাল অতএব কথ ও ক ছ থ
গঘ পরস্পারও সমানান্তরাল
হইবে। ছজট সরল রেখা কথ
ওচ এবং গঘ রেখার উপর
পড়ুক। ছজট সরল রেখা কথ
ও ওচ সমানান্তরাল সরল রেখার উপর পড়িতেছে অতএব


(২৯ প্র.) কছজ কোণ ছজচ কোণের সমান, এবং ছট রে**ধা** গুচ ও গঘ সমানান্তরাল রেখার উপর পড়িতেছে অতএব ছজচ কোণ জটঘ সমান, স্মৃতরাং কছজ, জটঘ সমান (১ স্ব. সা.) ইহারাই ভিন্নং পার্শ্বন্থ কোণ, অতএব (২৭ প্র.) কথাও গঘ সমানান্তরাল। স্মৃতরাং যে২ সরল রেখা, ইত্যাদি।

সং. উ.। .. কথ।। ওচ, ∠কছজ — ∠ছজচ (২৯ প্র.) এবং .. ওচ।। গঘ, ∠ছজচ — ∠জটঘ (২৯ প্র.) .. ∠কছজ — ∠জটঘ (১ স্ব. সা.) .. কথ।। গঘ।

৩১ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

নির্দ্ধিক বিক্সু দিয়া নির্দ্ধিক সরল রেখার সমানান্তরাল সরল রেখা টানিতে হইবে।

ক এক নির্দ্ধি বিন্দু, থগ এক নির্দ্ধিট সরল রেখা, ক বিন্দু দিয়া খগ রেখার সমানাস্তরাল রেখা টানিতে হইবে। line; it is required to draw a straight line E through the point A, parallel to the straight line BC.



In BC take any point B D, and join AD; and at the point A, in the straight line AD, make (23. 1.) the angle DAE equal to the angle ADC; and produce the straight line EA to F.

Because the straight line AD, which meets the two straight lines BC, EF, makes the alternate angles EAD, ADC equal to one another, EF is parallel (27. 1.) to BC. Therefore, the straight line EAF is drawn through the given point A, parallel to the given straight line BC. Which was to be done.


Sym. dem. $\angle DAE = \angle ADC$ (by constr.) ... EF || BC (27 of 1.)

PROP. XXXII. THEOR.

If a side of any triangle is produced, the exterior angle is equal to the two interior opposite angles; and the three interior angles of every triangle are equal to two right angles.


Let ABC be a triangle, and let one of its sides BC be produced to D; the exterior angle ACD is equal to the two interior opposite angles CAB, ABC; and the three interior angles of the triangle, viz. ABC, BCA, CAB, are together equal to two right angles.

Through the point C draw CE parallel (31. 1.) to the straight line AB; and because AB is parallel to CE, and AC meets them, the alter-



nate angles BAC, ACE are equal (29. 1.). Again, be-

খগ মধ্যে কোন বিন্তুর নিদ্রুশ কর যথা ঘ, এবং ক ঘ
সংযুক্ত কর, অপর কঘ রেখার
ক বিন্তুতে কঘগ সমান এক
কোণ (অর্থাৎ ঘকচ) (২৩ প্র.)
অঙ্কিত করিয়া ও পর্যান্ত চক বৃদ্ধি কর।




ঙচ ও খগ রেখার উপর কঘ রেখার পাতে ভিন্ন২ পার্শ্বছ কোণ চকঘ ও কঘগ পরস্পর সমান হওয়াতে ঙচ ও খগ সমানাস্তরাল (২৭ প্র.)। এই রূপে ক দিয়া খগ সমানাস্তরাল চ টানা হইল।

সং উ.। ∠ঘকচ == ∠কঘগ (অঙ্কপাত) . ওচ।। খগ (২৭ প্র.)।

৩২ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ক্রিভুজের কোন বাছর বৃদ্ধি করিলে বহিস্থ কোণ অন্তরন্থ সন্মুথবর্ত্তি কোণ দ্বয়ের সমান হইবে এবং প্রত্যেক ত্রিভুজের তিন অন্তরন্থ কোণ একত্র যোগে ছুই সমকোণ তুল্য হইবে।

কথগ এক ত্রিভুজ তাহার এক বাছ অ-থাং খগ, ঘ প্রয়স্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক-গঘ বহিস্থ কোণ অন্ত-রম্থ সম্মুখবর্ত্তি কোণ




দম কথগ, গকথ উভয়ের যোগ তুল্য, এবং তিন অস্তরহু কোণ অর্থাৎ কথগ, থগক এবং গকথ একত্র ছুই সম কোণ তুল্য।

উ.। গ বিন্দু ইইতে গঙ, কথ রেখার সমানান্তরাল করিয়া টান। কথ ও ওগ সমানান্তরাল স্কুতরাং কগ দারা তাহাদের সংস্পাশ হওয়াতে কগঙ ও থকগ ভিন্ন২ পার্শ্বস্থ কোণ দ্বর পরক্ষার সমান (২৯ প্র.)। পুনশ্চ কথ ও ওগ সমানান্তরাল স্কুতরাং থঘ তাহাদিগকে সংস্পাশ করাতে বহিঃস্থ কোণ ঙগঘ cause AB is parallel to CE, and BD falls upon them, the exterior angle ECD is equal to the interior opposite angle ABC; but the angle ACE was shown to be equal to the angle BAC; therefore, the whole exterior angle ACD is equal to the two interior opposite angles CAB, ABC; to these angles add the angle ACB, and the angles ACD, ACB are equal to the three angles CBA, BAC, ACB; but the angles ACD, ACB are equal (13. 1.) to two right angles; therefore also the angles CBA, BAC, ACB are equal to two right angles. Wherefore, if a side of a triangle, &c. Q. E. D.

Con. 1. All the interior angles of any rectilineal figure are equal to twice as many right angles as the figure has sides, wanting four right angles.

For any rectilineal figure ABCDE can be divided into as many triangles as the figure has sides, by drawing straight lines from a point F within the figure to each of its angles. And, by the preceding proposition, all the angles of these triangles are equal to twice as many

right angles as there are triangles, that is, as there are sides of the figure; and the same angles are equal to the angles of the figure, together with the angles at the point F, which E is the common vertex of the triangles: that is, (2. cor. 15.1.) together with four right angles. Therefore, twice as many right angles as the figure has sides, are equal to all the angles of



the figure, together with four right angles, that is, the angles of the figure are equal to twice as many right angles as the figure has sides, wanting four.


Con. 2. All the exterior angles of any rectilineal figure are together equal to four right angles

Because every interior angle ABC, with its adjacent exterior ABD, is equal (13.1.) to two right angles;

অন্তরত্ত সম্মুখবর্ত্তি কখন সহিত সমান অতএব থকণ ও কখন ইহাদের যোগ কগঙ ও ওগঘ ইহাদের যোগ (অর্থাৎ বহিস্থ কোন কগঘ) তুলা, পরে উভয়তঃ খগক যোগ করিলে থকণ ও কখন ও খনক একত্র কগঘ ও খনক তুলা। কগঘ ও খনক ছুই সমকোন তুলা (১৩ প্র.)। স্থতরাং থকণ ও কখন ও খনক ছুই সমকোন তুলা, অতএব ত্রিভুজের কোন বাছর, ইত্যাদি।

১ অন্থযান—সরল বৈথিক ক্ষেত্রের অন্তরস্থ কোণ সকলের একত্র যোগে ঐ ক্ষেত্রের যত বাহু আছে তাহার দ্বিগুণিত চতু-ক্লন সমকোণের তুলা হইবে।


উপপত্তি। কেননা কোন সরল রৈখিক ক্ষেত্রের মধ্যে (যথা কথগ ঘঙ) এক বিন্তু (যথা চ) নির্দেশ করিয়া ক্ষেত্রের সমস্ত কোণ চিচ্ছের সহিতৃ সংযুক্ত করিলে ক্ষেত্রের যত বাছ আছে তত ত্রিভুক্ত হইবে এবং উক্ত প্রতিজ্ঞান্ত্র্সারে এই ত্রিভুক্ত সমূহের সমস্ত কোণ যত



ত্রিভুজ আছে তাহার দিগুণ সমকোণ তুল্য, আর সেই কোণ
সমূহ ক্ষেত্রত্ব কোণ ও তন্মধ্য চ বিন্দুস্থ কোণের যোগ তুল্য,
কেননা এই চ বিন্দু ত্রিভুজ সমূহের সাধারণ শৃঙ্গ কিন্তু এই বিন্দুস্থ কোণ (১৫ প্র. ২ অন্থমান) চারি সমকোণ তুল্য অতএব ক্ষেত্রের কোণ সমূহে চারি সমকোণ যোগ করিলে উক্ত ত্রিভু-জের সকল কোণের তুল্য হইবে, স্থতরাং ক্ষেত্রের কোণ যত বাহু আছে তাহার দিগুণ চতুরুন সমকোণ তুল্য।

২ অমুমান— সরল রৈথিক ক্ষেত্রের বহিস্থ সকল কোণএকত্র যোগে চারি সমকোণের তুল্য হয়।

উ.৷ - প্রত্যেক অস্তরস্থ কোণ যথা কথগ বহিস্থ যথা কথ্য সহিত যোগে ছুই সমকোণ তুল্য (১৩ প্রঃ), অতএব therefore all the interior, together with all the exterior angles of the figure, are equal to twice as many right angles as the figure has sides; that is, by the foregoing corollary, they are equal to all interior angles



of the figure, together with four right angles; therefore, all the exterior angles are equal to four right angles.

Sym. dem. $\angle ACE = \angle BAC$ and $\angle ECD = \angle ABC$ (29 of 1) $\therefore \angle ACD = \angle ACE + \angle ECD = \angle BAC$ + $\angle ABC$ (2 Ax.) $\therefore \angle BAC + \angle ABC + \angle ACB =$ $\angle ACD + \angle ACB$ (2 Ax.) = 2 Rt. $\angle s$. (13 of 1).

Cor. 1. All \angle s of the \triangle s = \angle s of the Figure + \angle s at $\mathbf{F} \cdot \cdot \cdot \angle$ s of the Figure = \angle s of the \triangle s - \angle s at $\mathbf{F} \cdot \cdot \cdot \angle$ s of the \triangle s - \angle s at $\mathbf{F} \cdot \cdot \cdot \angle$ s of the \triangle s - \angle s (2 Cor. 15 of 1.) But there are as many \triangle s as there are sides to the Fig. ... \angle s of the \triangle s = 2 as many Rt. \angle s as there are sides to the Fig. ... \angle s of the Fig. = 2 as many Rt. \angle s as there are sides to the Fig. - 4 Rt. \angle s.


COR. 2. : Every int. \angle (as ABC) + its ext. \angle (as ABD) = 2 rt. \angle s (13. of 1.) : All int. \angle s + ext. \angle s = 2 as many rt. \angle s as the figure has sides i. e. all int. \angle s + all ext. \angle s = all int. \angle s + 4 rt. \angle s : all ext. \angle s = 4 rt. \angle s (3 Ax.)

PROP. XXXIII. THEOR.

The straight lines which join the extremities of two equal and parallel straight lines, towards the same parts, are themselves equal and parallel.

Let AB, CD, be equal and parallel straight lines, and joined towards the same parts by the straight lines. AC, BD; AC, BD are also equal and parallel.

সকল অন্তর্ম্থ ও বহিস্থ কোণ
একত্র যোগে ক্ষেত্রের যত বাছ্
আছে তাহার দিগুণ সমকোণ
তুল্য, এবং পূর্কোক্ত অন্তমানান্তমারে তাহারাই অন্তর্ম্থ
কোণ ও চারি সমকোণের যোগ তুল্য অতএব বহিস্থ কোণ
সমূহ চারি সমকোণ তল্য।




おং. উ. । ∠কগও = ∠থকগ, এবং ওগঘ = ∠কখগ
 (২৯ প্র.) ∴ ∠কগঘ = ∠কগও + ∠ওগঘ = ∠থকগ + ∠কথগ (২ য় য়.) ∴ ∠থকগ + ∠কথগ + ∠কগধ = ∠কগঘ + ∠কগথ = ২ য়য় ∠ (১৩ প্র.) ।

৩৩ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ছুই তুল্য এবং সমানান্তরাল সরল রেখার প্রান্তবন্ধ যে ছুই সরল রেখা দারা এক২ দিকে সংযুক্ত হয় তাহারাও পরস্পর তুল্য ও সমানান্তরাল।

কঁথ ও গঘ রেখাদ্রয় তুলাও সমানান্তরাল, কগ ও থঘ রেখা তাহাদিগকে এক২ দিকে গংযুক্ত করে অতএব কগ ও থঘ Join BC; and because AB is parallel to CD, and BC meets them, the alternate angles ABC, BCD are equal (29.1.): and because AB is equal to CD, and BC common to the two triangles ABC, DCB, the



two sides AB. BC are equal to the two DC, CB; and the angle ABC is equal to the angle BCD; therefore the base AC is equal (4. 1.) to the base BD, and the triangle ABC to the triangle BCD, and the other angles to the other angles (4. 1.), each to each, to which the equal sides are opposite; therefore, the angle ACB is equal to the angle CBD; and because the straight line BC meets the two straight lines AC, BD, and makes the alternate angles ACB, CBD equal to one another, AC is parallel (27. 1.) to BD; and it was shown to be equal to it. Therefore, straight lines, &c. Q. E. D.

Sym. dem. \therefore AB || CD, \therefore \angle ABC = \angle BCD (29 of 1.) And \therefore AB = CD, BC common to \triangle s ABC, BCD and \angle ABC = \angle BCD \therefore (4 of 1.) AC = BD, and \angle ACB = \angle CBD \therefore also AC || BD (27 of 1.)

PROP. XXXIV. THEOR.


The opposite sides and angles of a parallelogram are equal to one another, and the diagonal bisects it, that is, divides it into two equal parts.

N. B.—A Parallelogram is a four-sided figure, of which the opposite sides are parallel; and the diagonal is the straight line joining two of its opposite angles.*

Let ACDB be a parallelogram, of which BC is a diagonal; the opposite sides and angles of the figure are equal to one another; and the diagonal BC bisects it.

The symbol is used to express a parallelogram.

, তুল্য ও সমানাস্তরাল। থ, গ
সংযুক্ত কর, কথ গঘ সমানান্তরাল, থগ তাহাদিগকে সংস্পর্শ করে, অতএব কথগ ও
থগঘ ভিন্ন২ পার্শ্বের কোণ
পরস্পর সমান (২৯ প্র.), অ-



পর কথ, গঘ সমান ও খগ, কখগ ও খগঘ এ উভয়ের সাধারণ বাছ এবং কখগ, খগঘ মধ্যবর্ত্তি কোন দ্বয় সমান এই কারণ কগ ভূমি খঘ ভূমির তুলা এবং কখগ ত্রিভুক্ত খগঘ ত্রিভুক্তর সমান এবং সমান২ বাছর সম্মুখস্থ অন্যান্য কোণও সমান স্থতরাং কগখ, গখঘ সহিত সমান। এবং খগ, কগ ও খঘ রেখা দ্বয়ের উপর পড়িয়া ভিন্ন২ পার্শ্বন্থ কোন কগখও গখঘ সমান করাতে (২৭ প্র.) কগ ও খঘ পরস্পার সমানান্তরাল, আর পূর্ফো দর্শিত হইয়াছে ইহার। সমান। অতএব ছুই তুলা এবং সমানান্তরাল, ইত্যাদি।

সং উ.। \cdot কথ \parallel গঘ, \angle কথগ = \angle থগঘ (২৯ প্র.) এবং \cdot কথ = গঘ, খগ, \triangle কথগ, খগঘ উভয়ের সামান্য বাহু ও \angle কথগ = \angle খগঘ \cdot (৪ প্র.) কগ = খঘ, \angle কগখ = \angle গখঘ \cdot কগ \parallel খঘ (২৭ প্র)।

৩৪ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।


সমানান্তরাল ক্ষেত্রের সম্মুখবর্ত্তি বাহু ও কোণ পরস্পর সমান এবং তাহার কর্ণ ক্ষেত্রকে দ্বি**থও অর্থাৎ দুই সমান** ভাগে বিভক্ত করে।

*** যে চতুর্জের সন্মুখন্থ বাছ সমানান্তরাল তাহার নাম সমানান্তরাল ক্ষেত্র এবং যে সরল রেখাদারা দুই সন্মুখন্থ কোণ সংযুক্ত হয় তাহার নাম কর্ণ*।

ক্রম্থ এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র, থগ তাহার কর্ণ, এই ক্ষেত্রের সম্মুখবর্ডি বাহু ও কোণ পরস্পার সমান এবং কর্ণ

^{*} সম্বানান্তরাল ক্ষেত্রের চিহ্ন এই 🗀।

Because AB is parallel to CD, and BC meets them, the alternate angles ABC, BCD are equal (29. 1.) to one another; and because AC is parallel to BD and BC meets them, the alternate angles ACB, CBD are




equal (29. 1.) to one another; wherefore the two triangles ABC, CBD have two angles ABC, BCA in the one, equal to two angles BCD, CBD in the other, each to each, and the side BC, which is adjacent to these equal angles, common to the two triangles; therefore their other sides are equal, each to each, and the third angle of the one to the third angle of the other (26. 1.) viz. the side AB to the side CD, and AC to BD, and the angle BAC equal to the angle BDC. And because the angle ABC is equal to the angle BCD, and the angle CBD to the angle ACB, the whole angle ABD is equal to the whole angle ACD: And the angle BAC has been shown to be equal to the angle BDC; therefore the opposite sides and angles of a parallelogram are equal to one another: also, its diagonal bisects it; for AB being equal to CD, and BC common, the two AB, BC are equal to the two DC, CB, each to each; now the angle ABC is equal to the angle BCD; therefore the triangle ABC is equal (4. 1.) to the triangle BCD, and the diagonal BC divides the parallelogram ACDB into two equal parts. Therefore, the opposite, &c. Q. E. D.

Sym. dem. \therefore AB || CB, \angle ABC = \angle BCD (29 of 1.) \therefore AC || BD, \angle ACB = \angle CBD \therefore \angle s ABC + ACB = \angle s BCD + CBD each to each and CB common to \triangle s ABC and BDC \therefore (26 of 1.) AB = CD, AC = BD, \angle BAC = \angle BDC \therefore also (4 of 1.) \triangle ABC = \triangle BDC and \angle ABC + \angle CBD (or \angle ABD) = \angle BCD + \angle ACB (or \angle ACD.) (2 Ax.)

ক্ষেত্রকে দ্বিখণ্ড করিতেছে।

উ.। কথ ও গঘ সমানান্ত-রাল, থগ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, অতএব কখগ ও খগঘ দুই ভিন্ন২ পার্শ্বস্থ কোণ



পরস্পর সমান (২৯ প্র.)। এবং কগ ও খঘ সমানান্তরাল, খগ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে অতএব ভিন্ন২ পার্শ্বস্থ কোণ কগথ ও গথঘ পরস্পর সমান। সূতরাং কথগ ও গথঘ এই দূই ত্রিভজের মধ্যে একটার দৃই কোণ অর্থাৎ কথগ ও খগক অন্টার দুই কোণ খগঘ ও গখঘ সহিত ক্রমশ স্মান এবং ঐ সমান কোণ দ্যের সমীপস্থ বাছ খণ দুই তিভজের সামান্য হওয়াতে তাহাদের অন্যান্য বাহু ক্রমণ সমানও একটার তৃতীয় কোণ অন্যের তৃতীয় কোণের সমান অর্থাৎ কথ গঘ সমান, কগ খঘ সমান, এবং খকগ কোণ খঘগ সমান (২৬ প্র.)। কোণ থগঘ সমান, এবং গথঘ, থগক সমান হওয়াতে সমুদ্য কথঘ কোণ কগঘ সমান হইবে, আর পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে থকগ কোণ থঘণ সমান, অতএব সমানান্তরাল ক্ষেত্রের সম্মুখ-বর্ত্তি বাছ ও কোণ পরস্পার সমান এবং কর্ণ তাহাকে দ্বিখণ্ড করে। কেননা কথ, গঘ সমান ও থগ সামান্য হওয়াতে কথ খগ ক্রমশ ঘগ গখ সহিত সমান এবং কখগ কোণ খগঘ সমান সূত্রাং (৪ প্র.) কথগ ত্রিভুজ থগঘ সহিত সমান এবং কগঘর্থ সমানান্তরাল ক্ষেত্র থগ কর্ণ দারা দ্বিথণ্ড হইল।

সং উ.। \therefore কথ \parallel গঘ, \therefore \angle কথগ = \angle থগঘ (২৯ প্র.)। \therefore কগ \parallel খঘ, \therefore \angle কগথ = \angle গথঘ । \therefore \angle কথগ + \angle কগধ (ক্রমশ) = \angle থগঘ + \angle গথঘ এবং গথ \triangle কথগ, ধঘগ উভয়ের সামান্য, \therefore (২৬ প্র.) কথ = গঘ, কগ = থঘ, \angle ধকগ = \angle থঘগ, \therefore (৪ প্র.) \triangle কথগ = \triangle থঘগ, ও (২ মু.সান) \angle কথগ + \angle গথঘ (অর্থাৎ \angle কথঘ) = \angle ধগঘ + \angle কগধ (অর্থাৎ \angle কগঘ)।


PROP. XXXV. THEOR.

Parallelograms upon the same base, and between the same parallels, are equal to one another.

Let the parallelograms ABCD, EBCF* be upon the same base BC, and between the same parallels AF, BC; the parallelogram ABCD is equal to the parallelogram EBCF.

If the sides AD, DF of the parallelograms ABCD, A D BCF, opposite to the base BC, be terminated in the same point D; it is plain that each of the parallelograms is double (34. 1.) B C the triangle BDC; and they are therefore equal to one another.

But, if the sides AD, EF, opposite to the base BC of the parallelograms ABCD, EBCF, be not terminated in the same point; then, because ABCD is a parallelogram, AD is equal (34.1.) to BC; for the same reason, EF is equal to BC; wherefore AD is equal (1 Ax.) to EF; and DE is common; therefore the whole, or the remainder AE is equal (2 or 3 Ax.) to the whole, or the remainder DF; now AB is also equal to DC; therefore the two EA, AB are equal to




the two FD, DC, each to each; but the exterior angle FDC is equal (29. 1.) to the interior EAB, wherefore

^{*} See the 2nd. and 3rd. figures.

৩৫ প্রতিজ্ঞ:—উপপাদ্য।


যে২ সনানান্তরাল ক্ষেত্র এক ভূমির উপর এবং একি সমানা-স্তরালের মধ্যে থাকে তালার। পরস্পার সমান।

কথপঘ ওওখণচ* তুই সমানান্তরাল ক্ষেত্র খণ একি
ভূমির উপর এবং কচ খণ একি সমানান্তরালের মধ্যে
আছে কখণব সমানান্তরাল ক্ষেত্র ওখণচ সহিত্র সমান।



কথগৰ ব্যাচ দুই সমানান্তরার কেরের খগ ভূমির সমুখহ ক্ষ ব্যাচ বাছর থেপ্র বাদি হা বিন্তুতে হয় ভবে স্পাইট দেখা বাইতেছে যে প্রত্যেক সমানান্তরাল ক্ষেত্র (১৪ প্র.) খ্যাগ ক্রিভুজের বিপ্তণ স্থভরাং ভাহারা প্রস্পার সমান (৬ স্ব. সা.)।

কিন্তু ক্থগদ ওথগচ সমনে তেরাল কেতে থগ ভূমির সন্মু-থস্ত ক্ষ ওচ বাজ্র অগ্র যদি এক বিন্তুতে ন। থাকে তবে কথা গল সনানাত্রাল কেত্র হওগতে (১৪ প্র.) ক্য, থগ সনান। ঐ কারণে ওচ, থগ সমনে স্কৃত্রং (১ স্ব. সা.) ক্য, ওচ সনান। অতএব সানান্য ঘণ্ড যোগ বা বিয়োগ ক্রিলে (২ বা ৩ স্ব. সা.) সমুদ্য বা অবশিক্ত কণ্ড সমুদ্য বা অবশিক্ত ঘ্চ সনান হইবে।



অপর কখ, গঘ সমান, অতএব ডক কথ ক্রমশ চঘ ঘণ সহিত সমান এবং (২৯ প্র.) বহিঃও চঘণ কোণ অন্তরস্থ ওকথ সহিত সমান স্থৃতরাং (৪ প্র.) ওথ ভূমি চণ ভূমির সমান এবং ওকথ ক্রিভুক্ত চঘণ ক্রিভুজের সমান। কথণচ বিষম চতুর্জ

^{*} দিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টি কর।

the base EB is equal to the base FC, and the triangle EAB (4. 1.) to the triangle FDC. Take the triangle FDC from the trapezium ABCF, and from the same trapezium take the triangle EAB; the remainders will then be equal (3. Ax.), that is, the parallelogram ABCD is equal to the parallelogram EBCF. Therefore, parallelograms upon the same base, &c. Q. E. D.

First Case.—Sym. dem. \square ABCD $= 2 \triangle$ DBC (34 of 1.) \square DBCF $= 2 \triangle$ DBC (34 of 1.) \therefore ABCD = DBCF (6 Ax.)

Second Case.—Sym. dem. AD = BC; EF = BC (34 of 1.) .. AD = EF .. AD + DE = EF + DE i. e. AE = DF; AB = DC (34 of) $\angle EAB = \angle FDC$ (29 of 1.) .. $\triangle EAB = \triangle FDC$ (4 of 1.) .. $\triangle BCF - \triangle EAB = \triangle FDC$ i. e. $\Box ABCD = \Box EBCF$.


PROP. XXXVI. THEOR.

Parallelograms upon equal bases, and between the same parallels, are equal to one another.

Let ABCD, EFGH be parallelograms upon equal

bases BC, FG, and between the same parallels AH, BG; the parallelogram ABCD is equal to EFGH.

Join BE, CH; and because BC is equal to FG, and FG, to B (34. 1.) EH, BC is



equal to EII; and they are parallels, and joined towards the same parts by the straight lines BE, CH: But straight lines which join equal and parallel straight lines towards the same parts, are themselves equal and parallel (33. 1.); therefore EB, CH are both equal and parallel, and EBCH is a parallelogram; and it is equal (35. 1.) to ABCD, because it is upon the same base BC, and between the same parallels BC, AH. For the like reason, the parallelogram EFGH is equal


স্ইতে চ্ছপ ও ওকথ ত্রিভুজ একে২ স্বইলে অবশিষ্ট সমান স্কৃতিব (৩ ব. সা.), স্কৃত্রাং কথপঘ সমানান্তরাল ক্ষেত্র ওখগচ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের সমান। অতএব যে২ সমানান্তরাল ক্ষেত্র, ইত্যাদি।

২ প্রকরণ। কঘ — খগ। গুচ — খগ (৩৪ প্র.), \therefore কঘ — গুচ \therefore কঘ + ঘণ্ড — গুচ + ঘণ্ড, অর্থাৎ কণ্ড — ঘচ। কথ — ঘগ (৩৪ প্র.), \angle ওকথ — \angle চঘগ (২৯ প্র.), \therefore \triangle ওকথ — \triangle চঘগ (৪ প্র.), \therefore কথগচ — \triangle ওকথ — কথগচ — \triangle চঘগ, অর্থাৎ — কথগঘ — — গুথগচ।

৩৬ প্রতিক্রা—উপপাদ্য।

যে২ সমানান্তরাল ক্ষেত্র সমান২ ভূমির উপর এবং একি সমানান্তরালের মধ্যে থাকে তাহার। পরস্পর সমান।

কথগঘ ও ওচছজ
দুই সমানাস্তরাল ক্ষেত্র
থগ চছ সমান২ ভূমির
উপর এবং কজ থছ
একি সমানাস্তরালের
মধ্যে আছে।



কথগছ সমানান্তরাল কেত্র ওচছক্ত সহিত সমান।

খণ্ড গজ রেথা টান। খগ, চছ সমান, ও চছ, ওজ সমান (৩৪ প্র.), অতএব (১ স্ব. সা.) খগ, ওজ সমান, এবং ইহারা সমানান্তরাল ও একং দিকে খণ্ড, গজ দারা সংযুক্ত ইইয়াছে। অপর তুল্য ও সমানান্তরাল সরল রেখা যে২ সরল রেখা দারা একং দিকে সংযুক্ত হয় তাহারাও তুল্য এবং সমানান্তরাল, স্তরাং খণ্ড ও গজ তুল্য ও সমানান্তরাল, এবং ওখগজ এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র, আর এই ক্ষেত্র কখগঘ সহিত খগ এক ভূমির উপর ও একি সমানান্তরাল কজ ও খগ মধ্যে থাকাতে

to the same EBCH: Therefore also, the parallelogram ABCD is equal to EFGH. Wherefore, parallelograms, &c. Q. E. D.

Sym, dem. BC = FG; (Hyp) FG = EH (34 of 1.) ∴ BC = EH ∴ BE || CH ∴ EBCH is a = ABCD (35, of 1.) And EFGH = EBCH ∴ ABCD = EFGH.


PROP. XXXVII. THEOR.

Triangles upon the same base, and between the same parallels, are equal to one another.

Let the triangles ABC, DBC be upon the same base

BC, and between the same parallels, AD BC: The triangle ABC is equal to the triangle DBC.

Produce AD both ways to the points E, F, and through B draw (31 1.) BE parallel to



CA; and through C draw CF parallel to BD: Therefore, each of the figures EBCA, DBCF is a parallelogram: and EBCA is equal (35. 1.) to DBCF, because they are upon the same base BC, and between the same parallels BC, EF; but the triangle ABC is the half of the parallelogram EBCA, because the diagonal AB bisects (34. 1) it; and the triangle DBC is the half of the parallelogram DBCF, because the diagonal DC bisects it; And the halves of equal things are equal (7. Ax.); therefore the triangle ABC is equal to the triangle DBC. Wherefore, triangles, &c. Q. E. D.

Sym. dem. \(\sigma EBCA = \sigma DBCF\) (35. of 1.) \(\triangle ABC = \frac{1}{2}EBCA\) (34. of 1.) \(\triangle DBC = \frac{1}{2}DBCF\).

\(\triangle ABC = \sigma DBCF\) (7. Ax.)


তাহার সহিত সমান (৩৫ প্র.)। ঐ কারণে ওচছক্ত ওখগজ্জ সহিত সমান। অতএব কখগঘ, ওচছজ্জ সমান (১ স্ব. সা.)। এই নিমিত্তে যে২ সমানান্তরাল ক্ষেত্র, ইত্যাদি।

সং. উ.। খগ — চছ (কল্পনা) চছ — জজ (৩৪ প্র.) ∴ খগ — জজ ∴ খজ∥ গজ, ∴ জখগজ এক □ — কখগদ (৩৫ প্র.)। জচছজ — জখগজ ∴ কখগদ — জচছজ।

৩৭ প্রতিক্রা—উপপাদ্য।

যে২ ত্রিভূজ এক ভূমির উপর এবং একি সমানান্তরালের মধ্যে থাকে তাহার। প্রস্পর সমান।

কথগ, ঘখগ দুই ত্রিভুজ খগ এক ভূমির এবং কঘ, খগ একি সমানাস্তরালের মধ্যে আছে। কখগ ত্রিভুজ ঘখগ ত্রিভুজের সমান হইবে।



কঘ সরল রেখা উভয় পান্ধে ও ও চ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর এবং থ দিয়া থও, গক সমানান্তরাল করিয়া টান এবং গ দিয়া গচ, খঘ সমানান্তরাল করিয়া টান (৩১ প্র.), স্থৃতরাং ওথগক ও ঘখগচ প্রত্যেকে সমানান্তরাল ক্ষেত্র। ওথগক ও ঘখগচ এক ভূমি থগ উপর এবং ওচ ও থগ সাধারণ সমানান্তরাল রেখার মধ্যস্থ হওয়াতে পরস্পার সমান (৩৫ প্র.)। অপর কথগ ত্রিভুক্ত ওথগক সমানান্তরাল ক্ষেত্রের অর্দ্ধ, কেননা কথ কর্ণ তাহাকে বিখও করিতেছে (৩৪ প্র.), এবং ঘখগ ত্রিভুক্ত ঘখগচ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের অর্দ্ধ, কেননা যগ তাহাকে বিখও করিতেছে, অভএব (৭ স্ব. সা.) সমানহ বস্তুর অর্দ্ধও সমান হওয়াতে কথগ ত্রিভুক্ত ঘখগ ত্রিভুক্তর সমান। অভএব যেহ ত্রিভুক্ত, ইত্যাদি।


সহ উ। \square ওখনক $= \square$ ঘখনচ (৩৫ প্র.), \triangle কখন $= \frac{1}{2}$ ওখনক (৩৪ প্র.), \triangle ঘখন $= \frac{1}{2}$ ঘখনচ \triangle কখন $= \triangle$ খঘন (৭ মৃ. সা.)

PROP. XXXVIII. THEOR.

Triangles upon equal bases, and between the same parallels, are equal to one another.

Let the triangles ABC, DEF be upon equal bases BC, EF, and between the same parallels BF, AD: The triangle ABC is equal to the triangle DEF.

Produce AD both ways to the points G, H, and through B draw BG parallel (31. 1.) to CA, and



are upon equal bases BC, EF, and between the same parallels BF, GH; and the triangle ABC is the half (34. 1.) of the parallelogram GBCA, because the diagonal AB bisects it; and the triangle DEF is the half (34. 1.) of the parallelogram DEFH, because the diagonal DF bisects it: But the halves of equal things are equal (7. Ax.); therefore the triangle ABC is equal to the triangle DEF. Wherefore, triangles &c. Q. E. D.

Sym. dem. GBCA = DEFH (36. of 1.) \triangle ABC = $\frac{1}{2}$ GBCA (34. of 1.) \triangle DEF = $\frac{1}{2}$ DEFH \therefore \triangle ABC = \triangle DEF (7. Ax.)

PROP. XXXIX. THEOR.

Equal triangles upon the same base, and upon the same side of it, are between the same parallels.


Let the equal triangles ABC, DBC be upon the same base BC, and upon the same side of it, they are between the same parallels.

Join AD; AD is parallel to BC; for, if it be not, through the point A draw (31. 1.) AE parallel to BC,

৩৮ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

থে২ ত্রিভুজ সমান২ ভূমির উপর এবং একি সমানান্ত-রালের মধ্যে থাকে তাহারা পরস্পার সমান।

কথগ ও ঘঙচ ছই ছ
ক্রিভুক্ক থগ ও ঙচ
সমনিং ভূমির উপর
এবং থচ ও কঘ একি
সমানান্তরালের মধ্যে আছে । কথগ



ত্রিভূজ ঘঙচ সহিত সমান হইবে।

ক্য ছই দিকে ছ ও জ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর এবং খ দিয়া খছ, গক রেখার সমানান্তরাল করিয়া টান, এবং চ দিয়া চজ, ওঘ রেখার সমানান্তরাল করিয়া টান, তাহাতে ছখগক ও ঘওচজ প্রত্যেকে সমানান্তরাল ক্ষেত্র ছইবে, এবং ইহারা খগ ও ওচ সমান২ ভূমির উপর এবং খচ ও ছজ একি সমানান্তরালের মধ্যে থাকাতে (৩৬ প্র.) পরস্পার সমান। অপর কথগ ত্রিভুজ ছখগক সমানান্তরাল ক্ষেত্রের অর্দ্ধ, কেননা (৩৪ প্র.) কখ কর্ণ তাহাকে দিখও করে, এবং ঘওচ ত্রিভুজ ঘওচজ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের অর্দ্ধ, কেননা ও করে স্ক্তরাং সমান২ বস্তুর অন্ধ্র সমান হওয়াতে (৭ স্ব. সা.) কথগ ত্রিভুজ ঘওচ সমান। অতএব যে২ ত্রিভুজ, ইত্যাদি।

সং উ। ছথগক = ঘণ্ডচজ (৩৬ প্র.), \triangle কথগ = ξ ছথগক (৩৪ প্র.), \triangle ঘণ্ডচ= ξ ঘণ্ডচজ, \therefore \triangle কথগ = \triangle ঘণ্ডচ (৭ স. সা.)

৩৯ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।


সমান২ ত্রিভুজ এক ভূমির উপর এক পার্শ্বে থাকিলে একি সমানাস্তরালের মধ্যে হইবে।

কথণ ও ঘথণ সমান২ ত্রিভুজ থগ এক ভূমির উপর এক পার্শ্বে আছে ইহারা একি সমানান্তরালের মধ্যে হইবে।

ক ঘ সংযুক্ত কর, কৃঘ থগ সমানান্তরাল হইবে, কেননা যদি

and join EC: The triangle ABC is equal (37. 1.) to the

triangle EBC, because it is upon the same base BC, and between A the same parallels BC, AE: But the triangle ABC is equal to the triangle BDC; therefore also the triangle EBC; the greater to the less, which is impossible: Therefore AE is not parallel to BC. In



the same manner, it may be demonstrated that no other line than AD is parallel to BC; AD is therefore parallel to it. Wherefore, equal triangles upon &c. Q. E. D.

Sym. dem. If AD \parallel BC draw AE \parallel BC. Then \triangle ABC \Longrightarrow \triangle EBC (37. of 1.) \triangle ABC \Longrightarrow \triangle DBC (Hyp.) \therefore \triangle EBC \Longrightarrow \triangle DBC which is impossible (9. Ax.) \therefore AD \parallel BC


PROP. XL. THEOR.

Equal triangles on the same side of bases, which are equal and in the same straight line, are between the same parallels.

Let the equal triangles ABC, DEF be upon equal


bases BC, EF, in the same straight line BF, and towards the same parts; they are between the same parallels.

Join AD; AD is parallel to BC: For, if it be not, through A draw (31.1.) AG pa-



rallel to BF, and join GF. The triangle ABC is equal (38.1.) to the triangle GEF, because they are upon equal bases BC, EF, and between the same parallels BF, AG: But the triangle ABC is equal to the triangle DEF; therefore also, the triangle DEF is equal

না হয় তবে (৩১ প্র.) ক বিন্দু দিয়া কণ্ডখণ রেখার সমানান্তরাল করিয়া টান এবং ও গ সংযুক্ত কর, কখণ ত্রিভুজ ওখণ ত্রিভুজের সমান (৩৭ প্র.) কেননা ইহারা খণ এক ভূমির উপর এবং খণ কণ্ড একি সমানা-




ন্তরালের মধ্যে আছে। অপর কথগ ত্রিভুক্ত ঘথগ ত্রিভুক্ত করে সমান (কল্পনা), অতএব ঘথগ ত্রিভুক্তও ওথগ সহিত সমান, কিন্তু বৃহত্র লঘ্তরের সমান হইতে পারেনা, অতএব কঙ থগ সমানান্তরাল নহে। এই রূপে ইহাও উপপন্ন হইতে পারে যে কঘ ভিন্ন অন্য কোন রেখা থগ রেখার সমানান্তরাল নহে স্তরং কঘখগ সমানান্তরাল। অতএব সমানহ ত্রিভুক্ত, ইত্যাদি।

সং উ। যদি কঘ ႃ∦ থগ তবে কঙ ‖ থগ কর। ∴ △ কথগ ➡ △ ঙথগ (৩৭ প্র.), △ কথগ ➡ △ ঘথগ (কল্পনা) ∴ △ ঙথগ ➡ △ ঘথগ ইহা অসাধ্য (৯ ষ. সা.)। ∴ কঘ∥খগ।

৪০ প্রতিক্রা—উপপাদা।

সমানহ ত্রিভুজ এক রেখাও সমানহ ভূমির উপর এক পার্শ্বে থাকিলে একি সমানান্তরালের মধ্যে ইইবে।

কথণ ও ঘণ্ডচ ছুই স্বা নং ত্রিভূজ থচ এক রেখাস্থ খণ ও ওচ স্বান্থ ভূমির উপর এক পার্শ্বে আছে। ইহার। একি স্বান্ডরা-লের মধ্যে হুইবে।



ক ঘ সংযুক্ত কর. কঘ খচ রেখার সমানান্তরাল হইবে। কেননা যদি না হয় তবে (৩১ প্র.) ক বিক্তু দিয়া কছ খচ রেখার স্মানান্তরাল করিয়া টান এবং চছ সংযুক্ত কর। কথা বিভুক্ত ছঙ্চ বিভক্তের সম্বা (১৮ প্র.) কেননা ইহারা to the triangle GEF, the greater to the less, which is impossible: Therefore AG is not parallel to BF: And in the same manner, it may be demonstrated, that there is no other parallel to it than AD; AD is therefore parallel to BF. Wherefore, equal triangles, &c. Q. E. D.

Sym dem. If AD \P BF draw AG \parallel BF. Then \triangle ABC \Longrightarrow \triangle GEF (38. of 1.) \triangle ABC \Longrightarrow \triangle DEF (Hyp.) \therefore \triangle GEF \Longrightarrow \triangle DEF which is impossible (9. Ax.) \therefore AD \parallel BF.


PROP. XLI. THEOR.

If a parallelogram and a triangle are upon the same base, and between the same parallels; the parallelogram is double of the triangle.

Let the parallelogram ABCD and the triangle EBC

be upon the same base BC, and between the same parallels BC, AE: the parallelogram ABCD is double of the triangle EBC.

Join AC; then the triangle ABC is equal (37. 1.) to the triangle EBC, because they are upon the same base BC, and between the same pa-



rallels BC, AE. But the parallelogram ABCD is double (34.1.) of the triangle ABC, because the diagonal AC divides it into two equal parts; wherefore ABCD is also double of the triangle EBC. Therefore, if a parallelogram, &c. Q. E. D.

Sym. dem. $\triangle ABC = EBC$ (37. of 1.) $\triangle ABCD = 2 \triangle ABC$ (34. of 1.) $= 2 \triangle EBC$.

পণ ওচ সমান হ ভূমির উপর এবং খচ কছ একি সমানান্তরালের মধ্যে আছে। অপর কথগ ত্রিভুজ ঘওচ ত্রিভুজের
সমান অতএব ঘওচ ত্রিভুজ ও ছওচ সহিত সমান, কিন্তু বৃহর্ত্তর
লঘুতরের সমান হইতে পারে না অতএব কছ খচ সমানান্তরাল
নহে। এই রূপে ইহাও উপপন্ন হইতে পারে যে কঘ ভিন্ন অন্য
কোন রেখা খচ রেখার সমানান্তরাল নহে, স্ত্তরাং কঘ খচ
সমানান্তরাল। অতএব সমান হ ত্রিভুজ, ইত্যাদি।


সং উ.। যদি কঘ ++ থচ তবে কছ+ থচ কর। \cdot \cdot \cdot কথগ ++ \cdot \cdot ছঙচ (১৮ প্র.), \cdot কথগ ++ \cdot ঘঙচ (কল্পনা) \cdot \cdot হঙচ ++ ঘঙচ। ইহা অসাধ্য (৯ স্ব. সা.) \cdot কঘ++ থচ।

৪১ প্রতিক্রা—উপপাদ্য।

এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র এবং এক ত্রিভূজ এক ভূমির উপর ও একি সমানান্তরালের মধ্যে থাকিলে ঐ সমানান্তরাল ক্ষেত্র ঐ ত্রিভজের দ্বিগুণ হইবে।

শ্বগীঘ সমানান্তরাল ক্ষেত্র এবং ঙথগ ত্রিভুজ থগ এক ভূমির উপ-র ও কঙ থগ একি সমানান্ত-রালের মধ্যে আছে। কথগঘ সমানান্তরাল ক্ষেত্র ঙথগ ত্রিভুজের দিশুণ হইবে।

উ.। ক গ সংযুক্ত কর, তাহাতে ক্থগত্রিভূজ ওখগত্রিভূজের সমান



হইবে (৩৭ প্র.), কেননা তাহারা থগ এক ভূনির উপর ও কণ্ড ধগ একি সমানান্তরালের মধ্যে আছে। অপর কথগঘ সমা-নান্তরাল ক্ষেত্র কথগ ত্রিভুজের দ্বিগুণ (৩৪ প্র.), কেননা কগ কর্ণ তাহাকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে, স্কুতরাং কথগুর্ম ওখগ ত্রিভুজেরও দ্বিগুণ। অতএব এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র, ইত্যাদি।

সং উ.। \triangle কথা ন = \triangle ঙথা (৩৭ প্র.), = কথাম = ২ \triangle কথা (৩৪ প্র.) = ২ \triangle ঙথা।


PROP. XLII. PROB.

To describe a parallelogram that shall be equal to a given triangle, and have one of its angles equal to a given rectilineal angle.

Let ABC be the given triangle, and D the given rectilineal angle. It is required to describe a parallelogram that shall be equal to the given triangle ABC, and have one of its angles equal to D.

Bisect (10. 1.) BC in E, join AE, and at the point E in the straight line EC make (23. 1.) the angle CEF equal to D; and through A draw (31. 1.) AG parallel to BC, and through C draw CG (31. 1.) parallel

to EF: Therefore FECG is a parallelogram: And because BE is equal to EC, the triangle ABE is likewise equal (38.1.) to the triangle AEC, since they are upon equal bases BE, EC, and between the same parallels BC, AG; therefore, the triangle ABC is double the




triangle AEC. And the parallelogram FECG is likewise double (41.1.) of the triangle AEC, because it is upon the same base, and between the same parallels: Therefore the parallelogram FECG is equal to the triangle ABC, and it has one of its angles CEF equal to the given angle D: Wherefore, a parallelogram FECG has been described, equal to a given triangle ABC, and having one of its angles CEF equal to the given angle D. Which was to be done.

Sym. dem. BE = EC (by constr.) AG \parallel BC : \triangle ABE = \triangle AEC (38. of 1.) : \triangle ABC = 2 \triangle AEC; FECG = 2 \triangle AEC (41. of 1.) = \triangle ABC.

৪২ প্রতিজ্ঞা— সম্পাদ্য।

কোন নিদ্দিউ ত্রিভুজের সমান এবং কোন নিদ্দিউ সরল বৈথিক কোণের সমান এক কোণ বিশিষ্ট এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র আঁকিতে হইবে।

্কখগ নির্দিখ্য ত্রিভুজ এ-বং ঘ নির্দিখ্য কোণ। কখগ নির্দিখ্য ত্রিভুজের সমান এ-বং ঘ নির্দিখ্য কোণের সমা-ন এক কোণ বিশিষ্ট সমা-নান্তরাল ক্ষেত্র আঁ;কিতে হইবে।



থগ ও বিন্তৃতে দ্বিখণ্ড কর (১০ প্র.), এবং ওগ রেখার ও বিন্তৃতে ঘ সমান চঙগ কোন (২৩ প্র.) অঙ্কিত কর, এবং ক দিয়া কছ, খগ রেখার সমানান্তরাল করিয়া টান এবং গ দিয়া গছ, চও রেখার সমানান্তরাল টান (৩১ প্র.)। অতএব চঙগছ এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র। খও ওগ পরস্পার সমান হওয়াতে কখও ত্রিভুজ কওগ ত্রিভুজের সমান (৩৪ প্র.), কেননা ইহারা খও ওগ সমানহ ভূমির উপর ও খগ কছ একি সমানান্তরালের মধ্যে আছে, স্কৃতরাং কখগ ত্রিভুজ কঙগ ত্রিভুজের দিগুণ, এবং চঙগছ সমানান্তরাল ক্ষেত্রও কঙগ ত্রিভুজের দিগুণ (৪১ প্র.), কেননা ইহারা ওগ এক ভূমির উপর ও কছ ওগ একি সমানান্তরালের মধ্যে আছে। অতএব চঙগছ সমানান্তরাল ক্ষেত্র কথগ ত্রিভুজের সমান এবং ইহার গওচ কেণে ঘ নির্দিন্ট কোণ সমান। স্কৃত্রোং কখগ নির্দিন্ট ত্রিভুজের সমান এবং ঘ নির্দিন্ট কোণের সমান চঙগ এক কোণ বিশিষ্ট চঙগছ সমানান্তরাল ক্ষেত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

সং. উ.। খণ্ড — ভগ (অঙ্কপাত) কছ \parallel খগ \cdot . \triangle কখণ্ড — \triangle কঙগ (৩৮ প্র.) \cdot . \triangle কখগ — ২ \triangle কঙগ। — চঙগছ — ২ \triangle কঙগ (৪১ প্র.) — \triangle কখগ।

PROP. XLIII. THEOR.

The complements of the parallelograms which are about the diagonal of any parallelogram, are equal to one unother.


Let ABCD be a parallelogram, of which the diagonal is AC; let EH, FG be the parallelograms about AC, that is, through which

H

K

AC passes, and let BK, KD be the other parallelograms, which make up the whole figure ABCD, and are therefore called the complements:

The complement BK is equal to the complement KD.



equal (34 1.) to the triangle ADC: And, because EKHA is a parallelogram and AK its diagonal, the triangle AEK is equal to the triangle AHK: For the same reason, the triangle KGC is equal to the triangle KFC. Then, because the triangle AEK is equal to the triangle AHK, and the triangle KGC to the triangle KFC; the triangle AEK, together with the triangle, KGC, is equal to the triangle AHK, together with the triangle KFC: But the whole triangle ABC is equal to the whole ADC, therefore the remaining complement BK is equal to the remaining complement BK is equal to the remaining complement KD. Wherefore, the complements, &c. Q. E. D.

Sym. dem. $\triangle ABC = \triangle ADC$ (34. of 1.) $\triangle AEK = \triangle AHK$; $\triangle KGC = \triangle KFC \cdot \cdot \cdot \triangle ABC - (\triangle AEK + \triangle KGC) = \triangle ADC - (\triangle AHK + \triangle KFC)$ i. c. \square BK = $\square KD$.


PROP. XLIV. PROB.

To a given straight line to apply a parallelogram, which shall be equal to a given triangle, and have one of its angles equal to a given rectilineal angle.

৪৩ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সমানান্তরাল ক্ষেত্রের কর্ণের পরিতস্থ যে২ সমানান্ত-রাল ক্ষেত্র, তাহাদের অবশিষ্ট পরস্পর সমান।

কথগছ এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র, তাহার কর্ণ কগ। কগ পরিতস্থ (অর্থাং যাহাদের মধ্য দিয়া কগ চলিতেছে এমত) সমানান্তরাল ক্ষেত্র ওজ ও চছ। খট ও টঘ অন্যান্য সমানান্ত-রাল ক্ষেত্র ইহাদের যোগে সমু-




দয় ক্ষেত্ৰ কথগঘ পূৰ্ণ হইতেছে, এই নিমিত্তে ইহাদিগকৈ অব-শিঊ কহা যায়। অবশিঊ থট অবশিঊ টঘ সমান হইবে।

কথপঘ এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র, কগ ইহার কর্ণ, অতএব (৩৪ প্র.) কথগ ত্রিভুজ কঘণ ত্রিভুজের সমান। এবং ওটজক এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র, কট তাহার কর্ণ, অতএব কওট ত্রিভুজ কজট ত্রিভুজের সমান। এই রূপে টছণ ত্রিভুজ টচণ ত্রিভুজ কজট ত্রিভুজের সমান এবং টছণ ত্রিভুজ টচণ ত্রিভুজের সমান হওরাতে কওট ও টছণ ছই ত্রিভুজের যোগে কজট ও টচণ ছই ত্রিভুজের যোগ তুলা, এবং সমুদয় ত্রিভুজ কখণ সমুদয় কঘণ সমান, স্কৃতরাং অবশিষ্ট খট অবশিষ্ট টঘ সমান হইবে। অতএব কোন সমানান্তরাল ক্ষেত্রের, ইত্যাদি।


৪৪ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

কোন নির্দ্দিন্ট ত্রিভুজের সমান এবং কোন নির্দ্দিন্ট সরল রৈখিক কোণের সমান এক কোণ বিশিষ্ট এক সমানান্তরাল ক্ষেত্রকে এক নির্দ্দিন্ট সরল রেখাতে সংলগ্ন করিতে ছইবে। Let AB be the given straight line, and C the given triangle, and D the given rectilineal angle. It is required to apply to the straight line AB a parallelogram equal to the triangle C, and having an angle equal to D. Make (42.1.) the parallelogram BEFG equal to



the triangle C, having the angle EBG equal to the angle D, and the side BE in the same straight line with AB: produce FG to II, and through A draw (31. 1.) All parallel to BG, or EF, and join HB. Then, because the straight line UF falls upon the parallels AH, EF, the angles AHF, HFE, are together equal (29.1.) to two right angles; wherefore, the angles BHF, HFE are less than two right angles a But straight lines which with another straight line make the interior angles, upon the same side, less than two right angles, do meet if produced (cor. 29, 1.): Therefore HB, FE will meet, if produced; let them meet in K, and through K draw KL parallel to EA or FH, and produce HA, GB to the points L, M: Then HLKF is a parallelogram, of which the diagonal is HK, and AG, ME are the parallelograms about IIK; and LB, BF are the complements; therefore LB is equal (34.1.) to BF: But BF is equal to the triangle C: wherefore LB is equal to the triangle C; and because the angle GBE is equal (15, 1.) to the angle ABM, and likewise to the angle D; the angle ABM is equal to the angle D: Therefore, the parallelogram LB, which is applied to the straight line

ক্থ এক নিদি ই সরল রেথা, গ এক নিদি ই তিভুজ,
এবং ঘ এক
নিদি ই সরল
বৈর্থিক কোণ।
গ তিভুজের স-



মান এবং ঘ কোণের সমান এক কোণ বিশিক্ত সমানান্তরাল ক্ষেত্র কথ সরল রেখাতে সংলগ্ন করিতে হইবে।

গ তিত্তের সমান ও ঘ কোণের সমান ওথছ এক কোণ বি-শিউ খঙ্চছ সমানান্তরাল ক্ষেত্র অস্কিত কর (৪২ প্র.), তাহার খও বাহু যেন কথ সহিত এক রেখাতে থাকে। পরে চছ জ পর্যান্ত বদ্ধি কর এবং ক দিয়া কজ, ছথ অথবা চঙ রেখার সমানান্তরাল করিয়া টান এবং জ থ সংযুক্ত কর। অপর কজ চঙ সমানান্তরালের উপর জচ রেখার পাতে কজচ জচঙ একত্র তুই সমকোণ তুল্য হইতেছে (২৯ প্র.), স্মৃতরাং খজচ ও জচঙ এই ছুই কোণ একত্র ছুই সমকোণের স্থান হইতেছে, এবং যে২ সরল রেখা অন্য সরল রেখার সম্পাতে এক পার্শ্বের ছই অস্ত-রস্থ কোণকে ছুই সম কোণের স্থান করে তাহারা বৃদ্ধি পাইলে মিলিবে (২৯ প্র. অমু.) অতএব ইহারা যেন ট বিন্তুতে মিলি-তেছে। অপর ট দিয়া টঠ, ঙক কিম্বা চজ রেখার সমানাস্তরাল করিয়া টান এবং জক ও ছথ ক্রমশ ঠ ও ড পর্যান্ত বৃদ্ধি কর। স্থতরাং জঠটচ এক সমানাস্তরাল ক্ষেত্র, ইহার কর্ণ জট, এবং কছ ডঙ জট পরিতম্ব সমানান্তরাল ক্ষেত্র, আর ঠথ ও খচ দুই অবশিষ্ট অতএব ঠথ থচ সমান (৪৩ প্র.)। থচ গ ত্রিভুজ সমান, স্মৃতরাং ঠথ গ ত্রিভজ সমান। অপর ছথও কোণ (১৫ প্র.) কথড ও ঘ কোণের প্রত্যেকের সমান স্কুতরাং কথড ঘ কোলের সমান। অতএব ঠথ সমানান্তরাল ক্ষেত্র গঁ ত্রিভ্জের সমান ও ঘ কোণের সমান কথড এক কোণ বিশিষ্ট হইয়া কথ রেখায় সংলগ্ন হইয়াছে, ইহাই এ স্থলে সম্পাদ্য।

AB, is equal to the triangle C, and has the angle ABM equal to the angle D. Which was to be done.


Sym. dem. $\Box BF = \triangle C$ (by constr.) $\Box LB = BF$ (43. of 1.) $= \triangle C$ (1. Ax.) $\angle ABM = \angle EBG$ (15. of 1.) $= \angle D$.

PROP. XLV. PROB.

To describe a parallelogram equal to a given rectilineal figure, and having an angle equal to a given rectilineal angle.

Let ABCD be the given rectilineal figure, and E the given rectilineal angle: it is required to describe a parallelogram equal to ABCD, and having an angle equal to E.

Join DB, and describe (42. 1.) the parallelogram FH equal to the triangle ADB, and having the angle HKF equal to the angle E; and to the straight line GH (44. 1.) apply the parallelogram GM equal to the triangle DBC, having the angle GHM equal to the angle E. And because the angle E is equal to each of the angles FKH, GHM, the angle FKH is equal to GHM: add to each of these the angle KHG; therefore the angles FKH, KHG are equal to the angles KHG, GHM; but FKH, KHG are equal (29. 1.) to two right angles; therefore also KHG, GHM are



equal to two right angles: and because at the point H in the straight line GH, the two straight lines KH, HM, upon the opposite sides of GH, make the adja-

সং. উ.। \square খচ $= \triangle$ গ (অঙ্কপাত)। \square ঠখ $= \square$ খচ (৪৩ প্র.) $= \triangle$ গ (১ স্ব. স!.)। \triangle কথ ড $= \triangle$ ঙখ ছ (১৫ প্র.) $= \triangle$ য়।

৪৫ প্রতিক্রা—সম্পাদ্য।

কোন নিৰ্দিষ্ট সরল বৈথিক ক্ষেত্রের ত্ল্য এবং নিৰ্দিষ্ট সরল বৈথিক কোণের সমান এক কোণ বিশিষ্ট এক সমানান্ত-রাল ক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হইবে।

কথগঘ নি-

দিন্ট সরল রৈ
থিক ক্ষেত্র, গু

নির্মিষ্ট সরল

রৈথিক কোণ।

কথগঘ সন্মান

এক কোণ বি-

শিষ্ট এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র অঙ্কিত করিতে হইবে।

ঘ থ সংযুক্ত কর। কঘথ তি ভুক্ত সমান এবং ও সমান জটচ কোণ বিশিষ্ট চক্ত এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র অঙ্কিত কর (৪২ প্র.), এবং থঘণ তি ভুক্ত সমান ওও সমান ডক্তছ কোণ বিশিষ্ট ছড সমানান্তরাল ক্ষেত্র ছক্ত সরল রেথাতে সংলগ্ন কর (৪৪ প্র.)। চটক্ত ও ছক্তড প্রত্যেকে ও কোণ সমান হওয়াতে চটক্ত কোণ ও ছক্তড কোণ পরস্পার সমান। উভয় পক্ষে টক্তছ কোণ যোগ কর তাহাতে চটক্ত ও টক্তছ এই ছই কোণ একত্র টক্তছ ও ছক্তড সমান। চটক্ত ও টক্তছ এই ছই কোণ একত্র টক্তছ ও ছক্তড সমান। চটক্ত ও টক্তছ ছই সমকোণ তুল্য। ছক্ত সকল রেথার ক্ত বিন্দুতে টক্ত ও ক্তড ভিন্ন২ পার্ম্ম হইতে আসিয়া সমীপস্থ কোণ ঘ্যুকে একত্র ছই সমকোণ তুল্য করিতিছে এই হেতুক্ টক্ত ও ক্তড একি সরল রেথাতে আছে (১৪ প্র.)। এবং চছ ও টড সমানান্তরালের উপর ছক্ত

cent angles equal to two right angles, KII is in the same straight line (14. 1.) with HM. And because the straight line HG meets the parallels KM, FG, the alternate angles MIIG, HGF are equal (29. 1.); add to each of these the angle HGL; therefore the angles MHG, HGL, are equal to the angles HGF, HGL: But the angles MIIG, HGL, are equal (29). 1.) to two right angles; wherefore also the angles HGF, HGL are equal to two right angles, and FG is therefore in the same straight line (14. 1.) with GL. And because KF is parallel to HG, and HG, to ML, KF is parallel (30, 1.) to ML; but KM, FL are parallels; wherefore KFLM is a parallelogram. because the triangle ABD is equal to the parallelogram HF, and the triangle DBC to the parallelogram GM, the whole rectilineal figure ABCD is equal to the whole parallelogram KFLM; therefore the parallelogram KFLM has been described equal to the given rectilineal figure ABCD, having the angle FKM equal to the given angle E. Which was to be done.

Con. From this it is manifest how, to a given straight line, to apply a parallelogram, which shall have an angle equal to a given rectilineal angle, and shall be equal to a given rectilineal figure, viz. by applying (44. 1.) to the given straight line a parallelogram equal to the first triangle ABD, and having an angle equal to the given angle.

Sym. dem. \angle FKH = \angle E; \angle GHM = \angle E \therefore \angle GHM = \angle FKH \therefore \angle GHM + \angle GHK = \angle FKH + \angle GHK = 2 Rt. \angle s (29. of 1.) \therefore KH is in the same straight line with HM (14. of 1.) And \angle FGH = \angle GHM (29. of 1.) \therefore \angle FGH + \angle HGL = \angle GHM + \angle HGL = 2 Rt. \angle s (29. of 1.) \therefore FG is in the same straight line with LG. And \therefore KF || HG and HG || ML \therefore KF || ML (30. of 1. \therefore FKML is a \square = FH + GM = DAB + DBC = DABC.

পাত হওয়াতে ছজড ও চছজ ভিন্ন পার্শ্ব কোণ দয় পরস্পর সমান হইতেছে, ইহাদের প্রত্যেকে জছঠ যোগ করিলে
ছজড ও জছঠ ছই কোণ চছজ ও জছঠ ছই কোণের সমান
হইবে, অপর ছজড ও জছঠ ছই সমকোণ তুল্য এবং তিরিমিত্তে
চছছঠ একি সরল রেখা (১৪ প্র.)। আর উচ জছ সমানান্তরালও জছ ডঠ সমানান্তরাল অতএব উচ ডঠ সমানান্তরাল (৩০
প্র.), এবং উচ চঠ ও সমানান্তরাল স্কুতরাং উচঠড সমানান্তরাল ক্ষেত্র। অপর কঘখ ত্রিভুজ জচ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের
সমান এবং খঘগ ত্রিভুজ জচ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের
সমান এবং ব্যা সরল রৈখিক ক্ষেত্র কথগঘ সমুদ্য চউডঠ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের সমান। অতএব চউডঠ সমানান্তরাল ক্ষেত্র
কথগঘ নির্দ্ধিত সরল রৈখিক ক্ষেত্রের সমান ও ও সমান চউড
এক কোণ বিশিষ্ট হইয়া অক্ষিত হইরাছে, ইহাই এ স্থলে
সম্পাদ্য।

অন্থান। কোন নির্দ্ধি সরল বৈথিক ক্ষেত্রের সমান এবং নির্দ্দি উসরল বৈথিক কোণের সমান এক কোণ বিশিক্ত এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র কোন নির্দ্দি সরল রেখাতে কিরুপে সংলগ্ন করিতে হয় তাহা স্বতই বোধ গদ্য, কেননা নির্দ্দি রেখাতে প্রথম কিন্তুল কথ্য সমান ও নির্দ্দি কোণ সমান এক কোণ বিশিক্ত সমানান্তরাল ক্ষেত্র সংলগ্ন করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে।

ਸ਼९. উ. | ∠চটজ = ∠ঙ | ∠ছজড = ∠ঙ .. ∠চটজ = ∠ছজড : ∠ছজড + ∠ছজট = ∠চটজ + ∠ছজট = २ মন ∠ (२৯ প্র.) .. টজ ও জড এক রেখা (১৪ প্র.) | অপর ∠চছজ = ∠ছজড (२৯ প্র.) .. ∠চছজ + ∠জছঠ = ∠ছজড + ∠জছঠ = २ মন ∠ (२৯ প্র.) .. চছ ঠছ এক রেখা | এবং .. টচ || জছ ও জছ || ডঠ .. টচ || ডঠ (৩০ প্রেং) .. চট ডঠ এক □ = চজ + ছড = ঘকখ + ঘখণ = কখণঘ!


PROP. XLVI. PROB.

To describe a square upon a given straight line.

Let AB be the given straight line; it is required to describe a square upon AB.

From the point A draw (11.1.) ΛC at right angles to AB; and make (3.1.) AD equal to AB, and through the point D draw DE parallel (31.1.) to AB, and through B draw BE parallel to AD; therefore ΛDEB is a parallelogram: Whence ΛB is equal (34.1.) to DE, and AD to BE; but

DE, and AD to BE; but BA is equal to AD: therefore the four straight lines BA, AD, DE, EB are equal to one another, and the parallelogram ADEB is equilateral: it is likewise rectangular; for the straight line AD meeting the parallels AB, DE, makes the angles BAD, ADE equal (29. 1.) to two right angles; but BAD is a right angle; there-



fore also ADE is a right angle; now the oppositer angles of parallelograms are equal (34.1.) therefore each of the opposite angles ABE, BED is a right angle; wherefore the figure ADEB is rectangular, and it has been demonstrated that it is equilateral; it is therefore a square, and it is described upon the given straight line AB: Which was to be done.

Con. Hence every parallelogram that has one right angle has all its angles right angles.

Sym. dem. DE = AB (34. of 1.) = DA = EB; \angle DAB + \angle ABE = 2 Rt. \angle s (29. of 1.) But \angle DAB is a Rt. \angle : \angle ABE is a Rt. \angle ; \angle ADE = \angle ABE = a Rt. \angle ; \angle DEB = \angle DAB = a Rt. \angle : DB is a \Box .

৪৬ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক নির্দিষ্ট সরল রেখার উপর সমচতুর্ভুজ আঁকিতে হইবে।

কথ নির্দিষ্ট সরল রেখা, ইহার গ উপর এক সমচতুর্ভুক্ত আঁকিতে হইবে। ক হইতে কথ রেখার লম্বভাবে কগ হা টান (১১ প্র.) এবং কঘ কথ সমান কর, ওঘ দিয়া ঘঙ,কথ রেখার সমানান্তরাল টান, এবং থ দিয়া খঙ, কঘ রেখার সমা নান্তরাল টান, তাহাতে কঘঙ্খ সমানা-ন্তরাল ক্ষেত্র হইবে,অতএব কথ ঘঙ্সমান ক্

কঘ সমান হওয়াতে কথ কঘ ঘণ্ড ওথ চারি রেখা পরস্পর সমান, এবং তলিনিত্তে কঘণ্ডথ সমানান্তরাল ক্ষেত্র সমবাছক, আর তাহা সমকোণিও বটে কেননা কঘ রেখা কথ ঘণ্ড সমানান্ত-রালের উপর পড়িয়া থকঘ ও কঘণ্ড তুই কোণকে তুই সমকোণ তুল্য করিতেছে (২৯ প্র.), এবং থকঘ স্বয়ং এক সমকোণ হওয়াতে কঘণ্ডও সনকোণ, অপর সমানান্তরাল ক্ষেত্রের সম্মুখস্থ কোণ পরস্পর সমান (৩৪ প্র.), স্মৃতরাং কথণ্ড থণ্ডঘ উহাদের সম্মুখন্ত কোণ দ্ব প্রত্যেকে সমকোণ, তলিমিত্তে কঘণ্ডথ সমকোণি ক্ষেত্র, আর ইহা যে সমবাছক তাহা পুর্বের দর্শিত হইয়াছে অতএব ইহা সমচতুর্ভুক্ত, এবং কথ নির্দিষ্ট সরল রেখার উপর অক্ষিত হইয়াছে। ইহাই এ স্থলে সম্পাদ্য।

অমুনান। অতএব সমানান্তরাল ক্ষেত্রের মধ্যে এক সম কোণ থাকিলে সকলি সমকোণ হইবে।

 π ং. উ.। घঙ — कथ (৩৪ প্র.) — घक — ঙথ। \angle घकथ + \angle कघঙ — २ সম \angle (२৯ প্র.)। \angle घकथ এক সম \angle , \therefore \angle कध§ — সম \angle । \angle कथঙ — \angle कघঙ — সম \angle । \angle घঙथ — \angle घकथ — সম \angle , \therefore घथ এক \Box ।


PROP. XLVII. THEOR.

In any right angled triangle, the square which is described upon the side subtending the right angle, is equal to the squares described upon the sides which contain the right angle.

Let ABC be a right angled triangle having the right angle BAC; the square described upon the side BC is equal to the squares described upon BA, AC.

On BC describe (46. 1.) the square BDEC, and on BA, AC, the squares GB, HC; and through A draw (31. 1.) AL parallel to BD or CE, and join AD, FC;

then, because each of the angles BAC, BAG is a right angle (25. Def.), the two straight lines AC, AG upon the F opposite sides of AB, make with it at the point A the adjacent angles equal to two right angles; therefore CA is in the same straight line (14. 1.) with AG; for the same reason, AB, and AH are in the same straight line. Now because the angle DBC is equal to




the angle FBA, each of them being a right angle, adding to each the angle ABC, the whole angle DBA will be equal (2. Ax.) to the whole FBC; and because the two sides AB, BD, are equal to the two FB, BC, each to each, and the angle DBA, equal to the angle FBC, therefore the base AD is equal (4. 1.) to the base FC, and the triangle ABD to the triangle FBC. But the parallelogram BL is double (41. 1.) the triangle ABD, because they are upon the same base BD, and between the same parallels, BD, AL; and

৪৭ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

সমকোণি ত্রিভুজে সমকোণের সন্মুখস্থ বাছর উপর অক্ষিত সমচত্তু জ সমকোণের পার্শ্ব স্বরূপ ছুই বাহুর উপরে অঙ্কিত ছুই সঁমচতুর্ভু জের যোগ তুল্য। কথগ এক সমকোণি

ত্রিভুজ তাহার নধ্যে খ-

🖚 গ সমকোণ। খগ উপর অঙ্কিত সমচতুর্জ থক উভয়ের উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের যোগ তুল্য। খগ রেখার উপর থঘঙণ সমচতুর্ভু 🖚 অঙ্কিত কর (৪৬ প্র.) এবং খক কগ উপর ছখ জগ় দুই সমচত্যভু জ অঙ্কিত কর। এবং ক দিয়া কঠ খঘ কিয়া গঙ রেখার



সমান[া]ন্তরাল টান এবং ক ঘ ও চ গ সংযুক্ত কর। খকগ ও থকছ প্রত্যেকে সমকোণ (২৫ সং), স্থতরাং খক রেখার ক বিন্দুতে ছক পক ভিন্ন২ দিক হইতে আসিয়া সমীপস্থ কোণ দ্বয়কে একত্ৰ ছুই সমকোণ তুল্য করিতেছে অতএব (১৪ প্র.) গক কছ একি সরল রেখাতে আছে। ঐ কারণ কথ কজও এক সরল রেখাতে আছে। যথগ চথক প্রত্যেকে সমকোণ হইয়া পরস্পর সমান হওয়াতে কথগ উভয়তঃ যোগ করিলে সমুদয় কোণ ঘথক সমুদয় চথগ সহিত সমান হইবে। অপর কথ খঘ তুই বাস্থ ক্রমশ চর্থ থগ সহিত সমান ও চথগ কোণ কথঘ কোণের সমান হও-রাতে (৪ প্র.) কঘ ভূমি চগ ভূমির সমান ও কথঘ ত্রিভূজ চথগ ত্রিভুজের সমান ইইতেছে। খঠ সমানান্তরাল ক্ষেত্র কথঘ ত্রিভুজের দিশুণ কেননা তাহারা থঘ এক ভূমির উপর ও থঘ कर्र बेकि नर्मानाखतात्वत मरधा चार्ट (८५ छे.), बदर इथ नम-

the square GB is double of the triangle BFC, because these also are upon the same base FB, and between the same parallels FB, GC. Now the doubles of equals are equal (6. Ax.) to one another; therefore the parallelogram BL is equal to the square GB: And, in the same manner, by joining AE, BK, it is demonstrated, that the parallelogram CL is equal to the square HC. Therefore the whole square BDEC is equal to the two squares GB, HC; and the square BDEC is described upon the straight line BC, and the squares GB, HC upon BA, AC: wherefore the square upon the side BC is equal to the squares upon the sides BA, AC Therefore, in any right angled triangle &c. Q. E. D.


Sym. dem. \angle BAC is a rt. angle; \angle BAG is a rt. angle (25. Def.) \therefore CA, GA are in the same straight line (14. of 1.); AB = FB; BD = BC; \angle CBD = \angle FBA (10. Ax.) \therefore \angle CBD + \angle ABC (or \angle ABD) = \angle FBA + \angle ABC (or \angle FBC) \therefore (4. of 1.) \triangle ABD = \triangle FBC; \triangle ABD = $\frac{1}{2}$ BL (41. of 1.); \triangle FBC = $\frac{1}{2}$ BG \therefore BL = BG (6. Ax.) = AB². Similarly CL = CH = AC² \therefore BL + CL = BE = BC² = BG + CH = AB² + AC².

PROP. XLVIII. THEOR.

If the square described upon one of the sides of a triangle is equal to the squares described upon the other two sides of it; the angle contained by these two sides is a right angle.

If the square described upon BC, one of the sides of the triangle ABC, is equal to the squares upon the other sides BA, AC, the angle BAC is a right angle.

From the point A, draw (11.1.) AD at right angles to AC, and make AD equal to BA, and join DC. Then, because DA, is



চতুর্জ চথগ ত্রিভুজের দ্বিগুণ কেননা তাহারা চথ এক ভূমির উপর ও চথ ছগ একি সমানান্তরালের মধ্যে আছে। অপর সমান২ বস্তর দ্বিগুণও সমান (৬ স্ব. সা) অতএব খঠ সমানান্তরাল ক্ষেত্র ছথ সমচতুর্জ তুল্য। ঐ রূপে ক ও ও থ ট সংযুক্ত করিয়া দেখা যাইতেছে যে গঠ সমানান্তরাল ক্ষেত্র জগ সমানতুর্জ ছথ সমচতুর্জর মমান। অতএব থঘঙগ সম্দয় সমচতুর্জ ছথ জগ ছই সমচতুর্জুজর যোগ তুল্য, আর থঘঙগ সমচতুর্জ থগ উপর অক্ষিত ও ছথ জগ ছই সমচতুর্জ থক ও কগ উপর অক্ষিত প্রতরাং থগ বাহুর উপরিস্থ সমচতুর্জ থক কগ বাহুর উপরিস্থ ছই সমচতুর্জুজর মান। অতএব সমকোণি ত্রিভুজে, ইত্যাদি।


সং. উ.) | \angle থকগ এক সমকোণ; \angle থকছ এক সমকোণ (২৫ সং·) \therefore গক ছক একি রেখা (১৪ প্র.) | কখ = $\mathbf{5}$ । $\mathbf{4}$ 된 = $\mathbf{4}$ গ | \angle গথঘ = \angle চথক (১০ ম্ব. সা.) \therefore \angle গথঘ + \angle কখগ (অর্থাৎ কখঘ) = \angle চথক + \angle কখগ (অর্থাৎ \angle চখগ) \therefore (৪ প্র.) \triangle কথঘ = \triangle চখগ | \triangle কথঘ = $\mathbf{4}$ **3** (৪১ প্র.), \triangle চখগ = $\mathbf{4}$ যছ $\mathbf{5}$ তেনে গঠ = $\mathbf{4}$ যছ (৬ ম্ব. সা.) = $\mathbf{5}$ কখ । তেনেপ গঠ = $\mathbf{1}$ জ = $\mathbf{5}$ কগ । $\mathbf{5}$ তেনেপ গঠ = $\mathbf{4}$ জ = $\mathbf{5}$ কগ । $\mathbf{5}$ তেনেপ গঠ = $\mathbf{5}$ আছ । $\mathbf{5}$ আছে ।

৪৮ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

়কোন ত্রিভুজের এক বাছর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ যদি অন্য ছই বাছর উপর অঙ্কিত ছই সমচতুর্ভুজের সমান হয় তবে ঐ ছই বাছর মধ্যবন্তি কোণ সমকোণ হইবে।

কথগ ত্রিভুজের খগ বাহুর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ যদি কথ কগ অন্যান্য বাহুর উপর অঙ্কিত সম-চতুর্ভুজের সমান হয় তবে খকগ এক সমকোণ।

ক বিন্দু হইতে কগ উপর কঘ লয় ভাবে টান (১১ প্র.) এবং কঘ খক



equal to AB, the square of DA is equal to the square of BA: To each of these add the square of AC; therefore the squares of AD, AC, are equal to the squares of BA, AC. But the square of DC is equal (47. 1.) to the squares of DA, AC, because DAC is a right angle; and the square of BC, by hypothesis, is equal to the squares of BA, AC; therefore the square of DC is equal to the square of BC; and therefore also the side DC is equal to the side BC. And because the side DA is equal to AB, and AC common to the two triangles DAC, BAC, and the base DC likewise equal to the base BC, the angle DAC is equal (8. 1.) to the angle BAC: But DAC is a right angle; therefore also BAC is a right angle. Therefore, if the square, &c. Q. E. D.

Sym. dem. $DC^c = AD^c + AC^c$ (47. of 1.) = $AB^c + AC^c = BC^c$... DC = BC; ... AB = AD, AC common to $\triangle s$ ABC, ADC, and BC = DC ... (8. of 1.) $\angle BAC = \angle DAC = Rt$, \angle .



সং. উ.। ঘগ' = কঘ' + কগ' (৪৭ প্র.) = কখ' + কগ' = খগ' \therefore ঘগ = খগ। \because কখ = কঘ, এবং কগ কখগ ও কঘগ ত্রিভুজের সামান্য বাহু, ও খগ = গঘ \therefore (৮প্র.) \angle খকগ = \angle ঘকগ = সম \angle ।



BOOK II*.

DEFINITIONS.

EVERY right angled parallelogram, or rectangle[†], is said to be contained by any two of the straight lines

which are about one of the right angles.

"Thus the right angled parallelogram AC is called "the rectangle contained by AD and DC, or by AD "and AB, &c. For the sake of brevity, instead of "the rectangle contained by AD and DC, we shall sim-"ply say the rectangle AD.DC, placing a point be"tween the two sides of the rectangle. Also, instead "of the square of a line, for instance of AD, we shall "occasionally write AD2."

In every parallelogram, any of the parallelograms about a diagonal, together with the two complements, is

^{*} As the propositions in the 2d Book are almost all capable of being demonstrated algebraically, it has been deemed advisable to add demonstrations by Algebra to the geometrical oftes taken from Dr. Playfair's text. The editor is aware of the objections which some eminent mathematicians have expressed to the introduction of Algebra into Euclid; but as no student can lose anything by the independent addition of such demonstrations, they are appended in the hope of their proving not altogether useless. The elementary rules of Algebra given in the introduction, will, it is hoped, enable the learner to understand these demonstrations; and as the relation between Geometry and Algebra will be more fully explained in a future treatise on Algebra, these demonstrations are now inserted by anticipation, in order that the present work may not be left incomplete.—
Ed. Encyclo. Beng.

^{† &}quot;Rectangles in Geometry and products in arithmetic are frequently put for each other, and their names are applied promiscuously."—Keith. If a stand for AD, b for DC, the rectangle AD.DC is the same as ab; and if a be 4 inches and b 3, ab will be 12, which shall exactly be in such a case the number of square inches on the surface of the rectangle in question.

২ অধ্যায়।

म ९ ज्डा।

প্রত্যেক সমকোণি সমানান্তরাল ক্ষেত্র অর্থাৎ আয়তকে*
 কোন সমকোণের পার্শ্বস্থ তুই সরল রেখার অন্তর্গত কহা যায়।


"যথা কগ সমকোণি সমানান্তরাল ক্ষেত্রকে কঘ ও ঘণ কিষা কঘ ও কথ রেথার অন্তর্গত আয়ত কহা যায়, ইত্যাদি। এ তলে কঘ ঘণ অন্তর্গত আয়ত না কহিয়া সংক্ষেপার্থে তুই পার্শ্ব বোধক অক্ষর মধ্যে এক বিন্তু দিয়া কেবল আয়ত কঘ.ঘণ কহা যাইবে। আর কোন রেথার (যথা কঘ) সনচতুর্ভু লা কহিয়া কথন২ "কঘ^২" এমত কহা যাইবে"।

২. প্রত্যেক সমানাস্তরাল ক্ষেত্রে কর্ণের পরিতস্থ কোন সমানাস্তরাল ক্ষেত্র ছুই অবশিষ্ট সমেত শঙ্কু শব্দ বাচ্য হয়। "যথা জছ সমানাস্তরাল ক্ষেত্রকে কচ চগ ছুই

* "ক্ষেত্র তত্ত্বেতে যাহাকে আয়ত কহে এবং গণিত বিদ্যাতে যাহাকে গুণনের ফল কহে তাহাদিকে কথন২ পরস্পর স্বরূপ ভাবে বর্ণনা করা যায় এবং তাহাদের নামও অভেদ করিয়া লিখা যায়"। ইতি কিথ নামক গ্রন্থ কারকের উক্তি।

যদি কঘ রেখার নাম ক হয় এবং গঘ রেখার নাম খ হয় তবে কঘ ঘণ আয়ত ও কথ বীজ গণিতের অঙ্ক উভয়ই এক হইবে, এবং ক অঞ্চরের পরিমাণ যদি ৪ অঙ্কুলি ও থ অঞ্চরের ৬ অঙ্কুলি হয় তবে গুণন দারা কথ ১২ অঙ্কুলি হইবে, আর এমত হইলে উক্ত আয়তের ক্ষেত্র ফল ঠিক ১২ বর্গাত্মক অঙ্গুলি হইবে।

called a Gnomon. Thus, "the parallelogram HG "together with the com"plements AF, FC, is "the gnomon of the par"allelogram AC. This "gnomon may also, for a "the sake of brevity, be "called the gnomon AGK "or EHC."




PROP. I. THEOR.

If there be two straight lines, one of which is divided into any number of parts; the rectangle contained by the two straight lines is equal to the rectangles contained by the undivided line, and the several parts of the divided line.


Let A and BC be two straight lines; and let BC be divided into any parts in the points D, E; the rectangle A.BC is equal to the several rectangles A.BD, A.DE, A.EC.

From the point B draw (11. 1.) BE at right angles to BC, and make BG equal (3.1.) to A; and through G draw (31. 1.) GH parallel to BC; and through D, E, C, draw (31. 1.) DK, G EL, CH, parallel to BG; then BH, BK, DL, and EH are rectangles, and BH=BK+DL+EH.



But BH=BG.BC=A.BC, because BG=A: Also BK =BG.BD=A.BD, because BG=A; and DL=DK.DE=A.DE, because (34.1.) DK=BG=A. In like manner, EH=A.EC. Therefore A.BC=A.BD+A.DE. + A.EC; that is, the rectangle A.BC is

অবশিষ্টের সহিত একত্র কগ সনানান্তরাল ক্ষেত্রের শক্ষ্ কহা যায়। সংক্ষেপার্থে এই শক্ষুকে কছট কিয়া ওজগ শক্ষ্ কহা যাইতে পারে।




১ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ছুই সরল রেখার মধ্যে যদি একটা কএক অংশে বিভক্ত হয় তবে ঐ ছুই সরল রেখার অন্তর্গত আয়ত অবিভক্ত রেখা এবং বিভক্ত রেখার ভিন্ন২ অংশের অন্তর্গত আয়ত সমূহের সমান।

ক এবং থগ ছই সরল রেখা। থগ ঘ, গু বিন্দুতে কএক অংশে বিভক্ত। ক. খগ আয়ত ক.খঘ, ক.ঘণ্ড, ক.ঙগ এইং আয়তের সমান হইবে।

থ বিন্দু হইতে থচ, থগ রেথার লম্ব ভাবে টানিয়া



(১ অ. ১১ প্র.) খছ ক সমান কর (১। ৩), এবং ছ দিয়া ছজ, খগ সমানান্তরাল করিয়া টান, এবং ঘ, ঙ, গ, দিয়া ঘট, ঙঠ, গজ, খছ রেখার সমানান্তরাল টান তাহাতে খজ, খট, ঘঠ, ওজ আয়ত হইবে। এবং খজ == খট + ঘঠ + ওজ।

অপর থজ = খছ.খগ = ক.খগ, কেননা খছ = ক।
এবং খট = খছ.খঘ = ক.খঘ কেননা খছ = ক। এবং
ঘঠ = ঘট.ঘঙ = ক.ঘঙ, কেননা ঘট = খছ = ক। ঐ
রপে ওজ = ক.ঙগ। অতএব ক.খগ = ক.খঘ + ক.ঘঙ
+ ক.ঙগ, অর্থাং ক.খগ আয়ত ক.খঘ, ক.ঘঙ, ক.ঙগ

equal to the several rectangles A.BD, A.DE, A.EC. Therefore, "if there be two straight lines," &c. Q. E.D.

Demonstration by Algebra.—Suppose s stands for the whole line BC, and a, b, c, for its parts BD, DE, EC severally, and m for the undivided line A. s = a + b + c. ms = m (a + b + c) = ma + mb + mc.


PROP. II. THEOR.

If a straight line be divided into any two parts, the rectungles contained by the whole and each of the parts, are together equal to the square of the whole line.

Let the straight line AB be divided into any two parts in the point C; the rectangle

AB.BC, together with the rectangle AB.AC, is equal to the square of AB; or AB.AC+AB.BC=AB².

On AB describe (46. 1.) the square ADEB, and through C draw CF (31. 1.) parallel to AD or BE; then AF + CE=AE. But AF=AD.AC=AB.AC, because AD=AB; CE=BE.BC=AB.BC; and AE=AB². Therefore, AB.AC + AB.BC=AB².



Therefore, "if a straight line," &c. Q. E. D.

Dem. by Alg.—Suppose s stands for the whole line AB and a, b, for its two parts AC, CB. a + b = s. $\therefore as + bs = s^2$.

PROP. III. THEOR.

If a straight line be divided into any two parts, the rectangle contained by the whole and one of the parts, is equal to the rectangle contained by the two parts, together with the square of the foresaid part.

Let the straight line AB be divided into any two parts in the point C; the rectangle AB.BC is equal to the rectangle AC.BC, together with BC².

এই২ আয়ত সমূহের সমান। অতএব ছুই সরল রেখা, ইত্যাদি।

বীজ গণিতের ধারায় উপপত্তি। খগ সমুদয় রেখার নাম যেন স এবং খঘ, ঘঙ, ঙগ যেন ক্রমশ ক, খ, গ, এবং অবিভক্ত রেখা ক যেন প। স = ক + খ + গ \cdot পস = প (ক + খ + গ) = পক + পখ + পগ।


২ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা ছুই অংশে বিভক্ত হইলে সমুদয় এবং এক২ অংশের অন্তর্গত ছুই আয়ত একত্র সমুদয় রেখার সম-চতুর্ভুজের তুল্য হইবে।

কথ সরল রেখা গ বিন্দুতে ছই
অংশে বিভক্ত। কথ.খগ আয়ত ও
কখ.কগ আয়ত একত্র কখ সমচতুর্ভুক্ত
সমান। অর্থাৎ কথ.কগ + কখ.খগ

== কখ²।
কখ উপর কঘঙ্ডখ সমচতুর্ভুক্ত আঁক

(১। ৪৬), এবং গ विन्द्र मिया গচ, कच किया थंड ममानाखतान টान।




তাহাতে কচ + গঙ = কঙ। অপর কচ = কম.কগ = কথ.কগ, কেননা কঘ = কথ। গঙ = থঙ.থগ = কথ. থগ। এবং কঙ = কথ^ই। অতএব কথ.কগ + কথ.খগ = কথ^ই। অতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

वी. উ.। कथ সমুদয় রেথার নাম যেন স, এবং কগ, খগ
ছই অংশ যেন ক, খ। क + थ == স ∴ কস + খস == স²।

৩ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা ছুই অংশে বিভক্ত হইলে সমুদয় রেখা ও এক অংশের অন্তর্গত আয়ত ছুই অংশের আয়ত ও পূর্ব্বোক্ত অংশের সমচতুর্ভুক্তের যোগ তুল্য হইবে।

Upon BC describe (46. 1.) the square CDEB, and produce ED to F, and through A draw (31. 1.) AF parallel to CD or BE: then AE=AD + CE. But AE=AB.BE=AB.BC,because BE=BC. So also AD = AC.CD = AC.CB: and CE=BC2; therefore $AB.BC = AC.CB. + BC^{\circ}$.



Therefore. "if a straight line," &c. Q. E. D.


Dem. by Alg.—Let s stand for the whole line AB, and a, b for its two parts AC, CB. s=a+b ... sb= $ab + b^2$.

PROP. IV. THEOR.


If a straight line be divided into any two parts, the square of the whole line is equal to the squares of the two parts, together with twice the rectangle contained by the parts.

Let the straight line AB be divided into any two parts in C; the square of AB is equal to the squares, of AC, CB, and to twice the rectangle contained by AC. CB, that is, $AB^2 = AC^2 + CB^2 + 2AC.CB$.

Upon AB describe (46. 1.) the square ADEB, and join BD, and through C draw (31. 1.) CGF parallel to AD or BE, and through G draw HK parallel to AB or DE. And because CF is parallel to AD, and BD falls upon them, the exterior angle BGC is equal (29. 1.) to the interior and H opposite angle ADB, but ADB is equal (5. 1) to the angle ABD because BA is equal to AD, being sides of a square; wherefore the angle CGB is equal to the angle GBC; and therefore the side BC



কথ সরল রেখা গ
বিন্তুতে ছই অংশে বিভক্ত
হইয়াছে। কথ.খগ আয়ত
কগ.গথ আয়ত ও খগ²
উভয়ের যোগ তুল্য। খগ
উপর গঘঙ্থ সমচতুভুজ
(১। ৪৬) আঁকিয়া গুঘ চ
পর্যান্ত বৃদ্ধি কর এবং ক



দিয়া (১।৩১) কচ, গঘ কিয়া খণ্ড সনানান্তরাল করিয়া টান, তাহাতে কণ্ড = কঘ + গণ্ড। অপর কণ্ড = কথ.খণ্ড = কথ.খণ, কেননা খণ্ড = খণ। ঐ রূপে কঘ = কগ.গঘ = কগ.গখ। এবং গণ্ড = খণ², সূত্রাং কখ.খণ = কগ.গখ + খণ²। অতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

वी. উ.। कथ ममूनस त्तथात नाम र्यन म, এবং कन, थन छूटे অংশ राम क, थ। म = क + थ ∴ मथ = कथ + थर।

৪ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেথা ছই অংশে বিভক্ত হইলে সমুদয় রেথার সমচতুর্জ ছই অংশের ছই সমচতুর্জ এবং ছই অংশের অন্তর্গত আয়তের দ্বিগুণের তুল্য হইবে।

কথ সরল রেখা গ বিল্ফুতে ছই অংশে বিভক্ত হউক। কথ সমচতুর্জুজ কগ, গথ উভয়ের সমচতুর্জুজ
এবং কগ ও গথ অন্তর্গত আয়তের
দিগুণ তুল্য, অর্থাৎ কথ² == কগ² ।
গখ² + ২কগ.গখ।

কথ উপর কঘঙথ সমচতুর্ভুক্ত (১। ৪৬) অঙ্কিত করিয়া থ ঘ সংযুক্ত কর 5 E S

এবং গ দিয়া গছচ রেখা কঘ কিষা খঙ সমানাস্তরাল করিয়া টান এবং ছ দিয়া জট কথ কিষা ঘঙ সমানাস্তরাল করিয়া is equal (6. 1.) to the side CG: but CB is equal (34. 1.) also to GK, and CG to BK; wherefore the figure CGKB is equilateral. It is likewise rectangular; for the angle CBK being a right angle, the other angles of the parallelogram CGKB are also right angles (Cor. 46. 1.) Wherefore CGKB is a square, and it is upon the side CB. For the same reason, HF also is a square, and it is upon the side HG, which is equal to AC; therefore HF, CK are the squares of AC, CB. And because the complement AG is equal (43. 1.) to the complement GE; and because AG=AC.CG=AC.CB, therefore also GE=AC.CB, and AG + GE=2AC.CB. Now, HF=AC², and CK=CB²; therefore, HF + CK + AG + GE=AC² + CB² + 2AC.CB.

But HF+CK+ AG+GE=the figure AE, or AB²; therefore AB²=AC²+CB²+ 2AC.CB. Wherefore, "if a straight line be divided," &c. Q. E. D.

COR. From the demonstration, it is manifest that the parallelograms about the diagonal of a square are likewise squares.

Dem. by Alg.—Let s stand for the whole line AB and a, b, for its two parts AC, CB. s = a + b. $s^2 = (a + b) \times (a + b) = a^2 + 2ab + b^2$.

PROP. V. THEOR.

If a straight line be divided into two equal parts, and also into two unequal parts; the rectangle contained by the unequal parts, together with the square of the line between the points of section, is equal to the square of half the line.

Let the straight line AB be divided into two equal parts in the point C, and into two unequal parts in the point D; the rectangle AD.DB, together with the square of CD, is equal to the square of CB, or AD. DB+CD² = CB².

Upon CB describe (46. 1.) the square CEFB, join BE, and through D draw (31. 1.) DHG parallel to CE


টান। অপর গচ কঘ সমানান্তরাল হওয়াতে তাহাদের উপর খঘ পাতে বহিস্থ খছগ কোণ অন্তরস্থ সম্মুখবর্ত্তি কঘখ কোণের সমান হইতেছে (১। ২৯)। কিন্তু কথঘ ও কঘথ সমান (১। ৫) কেননা কথ কঘ সমচতুর্ভুজের বাছ হইয়া সমান হইতেছে, স্ত্রাং গছ্থ ও গখ্ছ সমান, অতএব গখ গছ সমান (১। ৬), এবং গখ ছট সমান ও গছ খট সমান হওয়াতে গছটখ ক্ষেত্র সমবাহুক, আর ইহা সমকোণিও বটে, কেননা গখট কোণ সমকোণ হওয়াতে গছট্থ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের অন্যান্য কোণও সনকোণ (১। ৪৬, অহ); স্নতরাং গছটথ সন্চতুর্ভুজ হইয়া গখ উপর আছে। ঐ কারণে জচও সমচতুর্ভুজ এবং তাহা কগ সনান যে জছ রেখা তাহার উপর আছে স্নতরাং জচ গট ক্রনশ কগ গথ রেথার সমচতৃর্ভুজ। অপর অবশিষ্ট কছ অবশিষ্ট ছঙ সমান এবং কছ 🚃 কগ.গছ 🚃 কগ. গথ অতএব ছঙ 😑 কগ.গথ এবং কছ 🕂 ছঙ 😑 ২কগ.গথ। পরুস্ত জচ == কগং এবং গট == গখং অতএব জচ 🕂 গট + কছ + ছঙ = কগ^২ + গখ^২ + ২কগ.গখ। **অপর** জ্ঞ + গট + কছ + ছঙ = কঙ ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ কথ[্]। স্কুতরাং কথ[ং] = কগ[ং] 🕂 গথ[ং] 🕂 ২কগ.গথ। **অতএব** কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

অন্নমান। এই উপপত্তিতে স্পাই বোধ হইতেছে যে সম-চতুর্ভুজের কর্ণের পরিতম্থ সমানান্তরাল ক্ষেত্রও সমচতুর্ভুজ হইবে।

বী. উ.। কথ সমুদয় রেখার নাম যেন স, এবং কথ, খগ ছুই অংশ যেন ক, খ। স = ক + খ \cdot স = (ক + খ) \times (ক + খ) = ক + ২ কখ + খ ।

ে প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা তুই সমান ও তুই অসমান ভাগে বিভক্ত হইলে তুই অসমান ভাগের অন্তর্গত আয়ত ও ছেদ চিহ্ন দ্বয়ের মধ্যন্থ রেখার সমচতুর্ভুজ একত্র যোগে অদ্বেক রেখার সমচতুর্ভুজ তুলা হইবে। or BF; and through H draw KLM parallel A to CB or EF; and also through A draw AK parallel to CL, or BM: K And because CH=HF (43. 1.) if DM be added to both, CM=DF. But AL=(36. 1.) CM, therefore AL=DF, and



adding CH to both, AH=gnomon CMG. But AH =AD.DH=AD.DB, because DH=DB (Cor. 4.2.); therefore gnomon CMG=AD.DB. To each add LG=CD², then gnomon CMG+LG=AD.DB+CD². But CMG+LG=BC², therefore AD.DB+CD²=BC². Wherefore "if a straight line," &c. Q. E. D.

"Cor. From this proposition it is manifest, that "the difference of the squares of two unequal lines, "AC, CD, is equal to the rectangle contained by their "sum and difference, or that $AC^2 - CD^2 = (AC + CD)$." (AC-CD)."


Dem. by Alg.—If a stand for each of the equal parts AC, CB, and b for the line between the points of section i. e.CD, then a + b shall represent the greater of the unequal parts AD, and a-b the less BD. $(a + b) \times (a-b) = a^2-b^2 \cdot (a + b) \times (a-b) + b^2 = a^2-b^2+b^2=a^2$.

PROP. VI. THEOR.

If a straight line be bisected, and produced to any point; the rectangle contained by the whole line thus produced, and the part of it produced, together with the square of half the line bisected, is equal to the square of the straight line which is made up of the half and the part produced.

Let the straight line AB be bisected in C, and produced to the point D; the rectangle AD.DB, to-

কথ রেখা গ বিক্তৃতে ছই সমান ভাগে ও ঘ বিকৃতে ছই অসমান ভাগে বিভক্ত হউক। কঘ ঘথ এবং গঘ সমচতুর্ভু জ একত্র গথ সমচতুর্ভু জের ভুণা হইবে অর্থাৎ কঘ.



ঘথ + গঘ² = গথ²। গথ উপর গঙ্চথ সমচতুর্ভু জাঁক (১। ৪৬), থ ও সংযুক্ত কর, এবং ঘ দিয়া ঘজছ গঙ কিয়া খচ রেথার সমানান্তরাল করিয়া টান (১। ৩১), এবং ক দিয়া কট, গঠ কিয়া থড রেথার সমানান্তরাল টান। অপর গজ = জচ (১। ৪৩), এবং উভয় পক্ষে ঘড যোগ করিলে গড = ঘচ। কিন্তু কঠ = গড (১। ৩৬), স্মৃতরাং কঠ = ঘচ। উভয় পক্ষে গজ যোগ করিলে কজ = শঙ্কু গডছ। অপর কজ = কঘ.ঘজ্ব কজ যোগ করিলে কজ = শঙ্কু গডছ। অপর কজ = কঘ.ঘজ্ব কঘ.ঘথ কেননা ঘজ = ঘথ (২। ৪. অমু.), স্মৃতরাং শঙ্কু গডছ = কঘ.ঘথ। উভয় পক্ষে ঠছ = গঘ² যোগ কর তাহাতে শঙ্কু গডছ + ঠছ = কঘ.ঘথ + গঘ²। কিন্তু গডছ + ঠছ = খগ² সূতরাং কঘ.ঘথ + গঘ² = খগ²। অতএব, ইত্যাদি।

অন্থুমান। অতএব কগ, গঘ ছই অসমান রেখার সমচতু-ভুজের অন্তর তাহাদের যোগ ও অন্তরের আয়ত তুল্য, অর্থাৎ কগ' — গঘ' — (কগ 🕂 গঘ). (কগ — গঘ)।


বী. উ.। কগ খগ ছই সমান অংশের প্রত্যেকের নাম যেন ক, এবং গঘ অর্থাৎ ছেদ চিহ্ন দ্বয়ের অধ্যন্ত রেখা যেন ঋ, তাহাতে ক + খ অসমান অংশের বৃহত্তর যে কঘ তলাচক হইবে, এবং ক — খ লঘুতর খঘ বাচক হইবে। (ক + খ) \times (ক - খ) = ক² - খ² \cdot (ক + খ) \times (ক - খ) + খ² = ক² - খ² + খ² = ক² - খ² + খ²

৬ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোনসরল রেখা দ্বিখণ্ডহইয়া কোন বিল্ফু পর্যান্ত বৃদ্ধি পাইলে এই রূপ বৃদ্ধিত সমুদয় রেখা ও তাহার বৃদ্ধিত অংশের অন্তর্গত gether with the square of CB, is equal to the square of CD.

Upon CD describe (46. 1.) the square CEFD, join DE, and through B draw (31. 1.) BHG parallel to CE or DF, and through H draw KLM parallel to AD or EF, and also through A draw AK parallel to CL or DM. And because

AC is equal to CB, the rectangle AL is equal (36. 1.) to CH; but CH is equal (43. 1.) to HF: therefore, also AL is equal to HF. To each of these add CM: therefore the whole AM is equal to the gnomon CMG. Now, AM



AD.DM=AD.DB, because DM (Cor. 4.2.)= DB. Therefore gnomon CMG=AD.DB, and CMG+LG=AD.DB+CB². But CMG+LG=CF=CD², therefore AD.DB+CB² = CD². Therefore, "if a straight line," &c. Q. E. D.

Dem. by Alg.—Let a stand for each of the equal parts AC, CB and b for BD the part produced; then 2a + b shall represent AD the whole line produced. $(2a + b) \times b = 2ab + b^2 \cdot \cdot \cdot (2a + b) \times b + a^2 = 2ab + b^2 + a^2 = (a + b)^2$.


PROP. VII. THEOR.

If a straight line be divided into any two parts, the squares of the whole line, and of one of the parts, are equal to twice the rectangle contained by the whole and that part, together with the square of the other part.

Let the straight line AB be divided into any two parts in the point C; the squares of AB, BC, are equal to twice the rectangle AB.BC, together with the square of AC, or $AB^2 + CB^2 = 2AB.BC + AC^2$.

আয়ত এবং দিখণ্ডিত রেখার অর্দ্ধের সমচতুর্ভু জ একত্র যোগে ঐ অর্দ্ধ রেখা এবং বৃদ্ধিত অংশের যোগে উৎপন্ন রেখার সমচতুর্ভুক্ত তুল্য হইবে।

কথ নিরল রেথা গ
বিন্তুতে দ্বিখণ্ড হইয়া
ঘ পর্যান্ত বৃদ্ধি পাউক।
কঘ খঘ আয়ত এবং
গথ সমচতুর্ভুক্ত একত্র
যোগে গঘ সমচতুর্ভুক্ত
তুল্য হইবে। গঘ উপর
গঙচঘ সমচতুর্ভুক্ত আঙ্কিত




कत (> 1 8%), घ ७ मश्युक्त कत जिर थ मिन्ना थक्क मि किन्ना घठ तिथा त्र मानास्त्रतान होन (> 1 ७२), जिर किन्ना होठे क्य किन्ना छह मानास्त्रतान होन जिर किन्ना कहे मानास्त्रतान होन जिर किन्ना कहे मानास्त्रतान होन जिर किन्ना घड मानास्त्रतान होन । जिर किन्ना घड मानास्त्रतान होन । जिर किन्ना घड मानास्त्रतान किन्ना चित्रतान किन्ना किन्ना

বী. উ.। কগ, খগ ছই সমান অংশের প্রত্যেকের নাম ঘেন ক, এবং খঘ বর্দ্ধিত অংশ ঘেন খ, তাহাতে ২ক + খ, কঘ সমুদয় বর্দ্ধিত রেখাকে বুঝাইবে। (২ক + খ) \times খ \longrightarrow ২কখ + খ' \cdot (২ক + খ) \times খ + ক' \longrightarrow (ক + খ)

৭ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা ছই ভাগে বিভক্ত হইলে সমুদয় রেখার এবং এক ভাগের ছই সমচতুর্জ, সমুদয় রেখা এবং ঐ ভাগের দিগুণিত আয়ত ও অন্য ভাগের সমচতুর্ভুদ্ধের তুল্য হইবে। Upon AB describe (46. 1.) the square ADEB, and construct the figure as in the preceding propositions: Because AG=GE (43. 1.), AG+CK=GE+CK, that

is, AK=CE, and therefore AK+CE=2AK. But AK+CE=2AK. But AK+CE=gnomon AKF+CK; and therefore, AKF+CK=2AK = 2AB.BK = 2AB.BC, because BK=(Cor. 4. 2.) BC. Since then, AKF+CK=2AB. BC, AKF+CK+HF=2AB. BC+HF; and because AKF+F=AE=AB², AB²+CK=2AB.BC+HF, that is, (since CK=CB², and HF=AC²,)



AB²+CB²=2AB.BC+AC². Wherefore, "if a straight line, &c. Q. E. D.

Otherwise:

"Because $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2AC.BC$ (4.2.), adding "BC² to both, $AB^2 + BC^2 = AC^2 + 2BC^2 + 2AC.BC$. "But BC² + AC.BC = AB.BC (3.2.); and therefore, "2BC²+2AC.BC=2AB.BC; and therefore $AB^2 + BC^2 = AC^2 + 2AB.BC$."


Cor. Hence, the sum of the squares of any two "lines is equal to twice the rectangle contained by the "lines together with the square of the difference of the "lines."

Dem. by Alg.—Let s stand for the whole line AB, and a, b, for the parts AC, CB. Then s = a + b. $s^2 = (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. $s^2 + b^2 = a^2 + 2ab + 2b^2 = a^2 + (a + b) \times 2b = a^2$. +2sb; since s = a + b.

কথ সরল রেখা গ বিল্পুতে দুই
ভাগে বিভক্ত হউক। কথ ও গথ
সমচতুভূজ কথ.খগ আরতের
দিগুণ ও কগ সমচতুভূজ এই দুএর
যোগ তুল্য, অর্থাৎ কথ² + খগ²

= ২কথ.গথ + কগ²।

কথ উপর কঘঙথ সমচতুর্ভুজ আঁক (১। ৪৬), এবং পূর্ব্বোক্ত



প্রতিজ্ঞার ন্যায় ক্ষেত্রের ন্যাস কর। কছ = ছঙ (১।৪৩), অতএব কছ + গট = ছঙ + গট অর্থাৎ কট = গঙ, স্থতরাৎ কট + গঙ = ২কট। অপর কট + গঙ = শঙ্কু কটচ + গট অতএব কটচ + গট = ২ কট = ২ কথ.খট = ২কথ খগ কেননা খট = খগ (২।৪ অন্থ.)। কটচ + গট = ২ কথ.খগ অতএব কটচ + গট + জচ = ২কথ.খগ + জচ। এবং কটচ + জচ = কঙ = কথ স্থতরাং কখ + গট = ২ কথ.খগ + জচ অর্থাৎ (গট = গখ ও জচ = কগ হও-য়াতে) কখ + খগ = ২কথ.খগ + কগ । অতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

প্রকারান্তরে উপপত্তি। কখ² — কগ² + খগ² + ২কগ. খগ (২। ৪)। উভয় পক্ষে খগ² যোগ করিলে কখ² + খগ² — কগ² + ২ খগ² + ২ কগ.খগ। অপর খগ² + কগ.খগ — কখ.খগ (২। ৩) অতএব ২ খগ² + ২কগ.খগ — ২কখ.খগ স্থতরাং কখ² + খগ² — কগ² + ২ কখ. খগ।

অন্থান অতএব ছই রেখার সমচতুর্ভুজের যোগ ঐ ছুই রেখার অন্তর্গত দিগুণিত আয়ত এবং তাহাদের অন্তরের সম-চতুর্ভুজ তুল্য।

বী. উ.। সমুদয় কথ রেখার নাম স, এবং করা, খগ ছুই অংশ যেন ক, খ, তাহাতে স = ক + খ \therefore স² = (ক + খ)² = ক² + ২কখ + খ² \therefore স² + খ² = ক² + ২কখ + ২খ² = ক² + (ক + খ) \times ২খ = ২সখ + ক²।


PROP. VIII. THEOR.

If a straight line be divided into any two parts, four times the rectangle contained by the whole line, and one of the parts, together with the square of the other part is equal to the square of the straight line which is made up of the whole and the first-mentioned part.

Let the straight line AB be divided into any two parts in the point C; four times the rectangle AB.BC together with the square of AC, is equal to the square of the straight line made up of AB and BC together.

Produce AB to D, so that BD be equal to CB, and upon AD describe the square AEFD; and construct two figures such as in the preceding. Because GK is equal (34. l.) to CB, and CB to BD, and BD to KN, GK is equal to KN. For the same reason, PR is equal to RO; and because CB is equal to BD and KG to KN, the rectangles CK and BN are equal, as also the rectangles GR and RN: But CK is equal (43. l.) to RN, because they are the complements of the parallelogram CO; therefore also BN is equal to GR; and the four rectangles BN, CK, GR, RN are therefore equal to one another,

and so CK+BN+GR+RN= A
4CK. Again, Because CB
is equal to BD, and BD equal
(Cor. 4. 2.) to BK, that is, to
CG; and CB equal to GK, X
that (Cor. 4. 2.) is, to GP;
therefore CG is equal to GP;
and because CG is equal to
GP, and PR to RO, the rectangle AG is equal to MP
and PL to RF: But MP is



equal (43.1.) to PL, because they are the complements of the parallelogram ML; wherefore AG is equal also to RF: Therefore the four rectangles AG, MP, PL, RF, are equal to one another, and so AG+MP+PL+RF=4AG. And it was demonstrated, that


৮ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা ছুই অংশে বিভক্ত হইলে সমুদয় রেখা ও এক অংশের অন্তর্গত চতুর্গুণিত আয়ত অন্য অংশের সমচতুর্তু-জের সমেত, সমুদয় রেখা ও পূর্ব্বোক্ত অংশের যোগে উৎপন্ন রেখার সমচতুর্ক তুলা হইবে।

কথ সরল রেখা গ বিন্দুতে ছুই অংশে বিভক্ত হইতেছে। কথ থগ আয়তের চতুর্গুণ এবং কগ সমচতুর্ভু জ ইহারা একত্র কথ ও থগ যোগে উৎপন্ন রেখার সমচতুর্ভু জ তুল্য।

কথ ঘ পর্যান্ত বৃদ্ধি করিয়া থঘ থগ সমান কর এবং কঘ উপর কণ্ডচঘ সমচতুর্ভুক্ত আঁক এবং পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞার ন্যায় ছই ক্ষেত্র কর। ছট থগ সমান (১। ৩৪) এবং থগ খঘ সমান প্রথঘ টঢ সমান স্থতরাং ছট টঢ সমান। ঐ কারণে তদ দণ সমান, এবং থগ খঘ সমান ও টছ টঢ সমান হওয়াতে গট খঢ আয়ত পরস্পার সমান এবং ছদ ও দঢ ভদ্ধপ সমান। অপর গট দঢ সমান (১। ৪৩), কেননা তাহারা গণ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের শ্বই অবশিষ্ট, অতএব শ্বাচ ও ছদও সমান ত্রিমিত্তে খঢ

গট ছদ দট এই চারি আয়ত পরস্পার সমান, স্কৃতরাং গট + খট + ছদ + দট == ৪ গট। অপর খগ খঘ সমান এবং (২। ৪. অনু.) খঘ খট অর্থাৎ গছ সমান ও গখ ছট অর্থাৎ ছত সমান হওয়াতে গছ ছত সমান। এবং গছ ছত সমান ও তদ দণ সমান হওয়াতে



কছ আয়ত ডত আয়ত সমান এবং তঠ দচ সমান। কিন্তু ডত তঠ সমান (১। ৪৩) কেননা তাহারা ডঠ সমানান্ত-রাল ক্ষেত্রের হুই অবশিষ্ট স্থতরাং কছ ও দচ সমান অতএব কছ ডত তঠ দচ এই চারি আয়ত পরস্পার সমান এবং কছ + ডত + তঠ + দচ == ৪কছ। পুর্বের দর্শিত হইয়াছে যে গট CK+BN+GR+RN=4CK; wherefore adding equals to equals, the whole gnomon AOII=4AK. Now AK =AB.BK=AB.BC, and 4AK=4AB.BC; therefore, gnomon AOH=4AB.BC; and adding XH or (Cor. 4.2.) AC², to both, gnomon AOII+XH=4AB.BC+AC². But AOH+XH=AF=AD²; therefore AD²=4AB.BC+AC². Now AD is the line that is made up of AB and BC, added together into one line: Wherefore, if a straight line, &c. Q. E. D.

"Cor. 1. Hence, because AD is the sum, and AC "the difference of the lines AB and BC; four times "the rectangle contained by any two lines together with "the square of their difference, is equal to the square

"of the sum of the lines."

"Cor. 2. From the demonstration it is manifest, "that since the square of CD is quadruple of the "square of CB; the square of any line is quadruple of "the square of half that line."

Otherwise:

"Because AD is divided any how in C (4. 2.) AD'

"= $AC^2 + CD^2 + 2 CD.AC$. But CD= $2 CB^2$ and
"therefore CD'= $CB^2 + BD^2 + 2CB.BD'=4CB^2$, and
"also 2CD.AC=4CBAC; therefore, AD' = AC^2 "+ $4BC^2 + 4BC.AC$. Now BC' + BC.AC=AB.BC"(3. 2.); and therefore AD' = $AC^2 + 4AB.BC$."
Q. E. D.

Dem. by Alg. Let s stand for the whole line AB and a, b, for the parts AC, CB. Then s = a + b. s-b = a. $(s-b)^2 = a^2$ i. e. $a^2 = s^2 - 2sb + b^2$ and by adding 4sb to both we have $4sb + a^2 = s^2 - 2sb + b^2 + b^2 + 4sb = s^2 + 2sb + b^2 = (s + b)^2$.

+ খট + ছদ + দণ = ৪গট, অতএব সমানে সমান যোগ করিলে, সমুদয় শঙ্কু কণজ = ৪ কট। অপর কট = কখ.খট = কখ.খগ অতরাং শঙ্কু কণজ = ৪ কখ.খগ অতরাং শঙ্কু কণজ = ৪ কখ.খগ, এবং ভজ অর্থাৎ কগ (২।৪. অত্ন.) উভয়ে যোগ করিলে শঙ্কু কণজ + ভজ = ৪ কখ.খগ + কগ । কিন্তু কণজ + ভজ = কচ = কঘ অতএব কঘ = ৪ কখ.খগ + কগ । আর কঘ রেখা কখ ও খগ যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

১ অমৃ.। অতএব কথ ও থগ রেথার যোগ কঘ এবং অন্তর কগ হওয়াতে কোন ছই রেথার অন্তর্গত আয়তের চতুগুণ তাহাদের অন্তরের সমচতুর্জ সমেত ছই রেথার যোগের সমচতুর্জ তুল্য হইবে।

২ অন্থ.। গঘ সমচতুর্জ থগ সমচতুর্জের চতুগুণ হওয়াতে কোন রেথার সমচতুর্জ তাহার অর্দ্ধের সমচতুর্জের
চতুর্গুণ হইবে ইহা এই উপপত্তি হইতে স্পান্ট বোধ হইতেছে।
প্রকারান্তরে উপপত্তি। কঘ গ বিন্দুতে বিভক্ত হইয়াছে
অতএব (২।৪) কঘ² = কগ² + গঘ² + ২ গঘ. কগ। অপর
গঘ = ২থগ স্থতরাং গঘ² = থগ² + থঘ² + ২ থগ.থঘ =
৪গখ² এবং ২গঘ.কগ = ৪ খগ.কগ। অতএব কঘ² = কগ²
+ ৪ খগ² + ৪ খগ.কগ। অপর খগ² + খগ.কগ = কখ
খগ (২।৩) অতএব কঘ² = কগ² + ৪ কখ.খগ।

বী. উ.। সমুদয় কথ রেখার নাম যেন স এবং কগ খগ ছুই অংশ যেন ক, থ। তাহাতে স = ক + খ \cdot স — খ = ক \cdot (স — খ) 2 = ক' অর্থাৎ ক' = স' — ২সথ + খ'। উভয়ে ৪সথ যোগ করিলে ৪সথ + ক' = স' — ২সথ + খ' + ৪সথ = স' + ২সথ + খ' = (স + খ) 2 ।


PROP. IX. THEOR.

If a straight line be divided into two equal, and also into two unequal parts; the squares of the two unequal parts are together double of the square of half the line, and of the square of the line between the points of section.

Let the straight line AB be divided at the point C into two equal, and at D into two unequal parts: The squares of AD, DB are together double of the squares of AC, CD.

From the point C draw (11. 1.) CE at right angles to AB, and make it equal to AC or CB, and join EA EB; through D draw (31. 1.) DF parallel to CE, and through F draw FG parallel to AB; and join AF: Then, because AC is equal to CE, the angle EAC is equal (5. 1.) to the angle AEC; and because the angle ACE is a right angle, the two others AEC, EAC together make one right angle (32. 1.); and they are equal to one another; each of them therefore is half a right angle. For

the same reason, each of the angles CEB, EBC is half a right angle: and therefore the whole AEB is a right angle; And because the angle, GEF is half a right angle, and EGF a right angle, for it is equal (29. A 1.) to the interior opposite an-




gle ECB, the remaining angle EFG is half a right angle; therefore the angle GEF is equal to the angle EFG, and the side EG equal (6. 1.) to the side GF: Again, because the angle at B is half a right angle; and FDB a right angle, for it is equal (29. 1.) to the interior opposite angle ECB, the remaining angle BFD is half a right angle; therefore the angle at B is equal to the angle BFD, and the side DF to (6. 1.) the side DB. Now, because AC = CE, AC² = CE², and AC² + CE² = 2AC². But (47. 1.) AE² = AC² + CE²;

৯ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা ছুই সমান এবং ছুই অসমান ভাগে বিভক্ত হইলে ছুই অসমান ভাগের ছুই সমচতুর্ভুজ একত্র অন্ধেক রেখার ও ছেদচিচ্ছের মধ্যন্থ রেখার সমচতুর্ভুজের দ্বিগুণ হইবে।

কথ সরল রেখা গ বিন্দুতে ছুই সমান ভাগে ও ঘ বিন্দুতে ছুই অসমান ভাগে বিভক্ত হইতেছে। কঘ, ঘথ ছুই রেখার সমচতুর্কু একত্র কগ, গঘ রেখার সমচতুর্ক্তের দিগুণ হইবে।

গ বিন্দু হইতে গঙ, কথ রেখার উপর লম্বভাবে (১।১১) টানিয়া তাহাকে কগ কিয়া গথ সমান কর এবং ও ক ও ও থ সংযুক্ত কর। ঘ দিয়া (১। ৩১) ঘচ গঙ্সমানান্তরাল টান এবং চ দিয়া চছ কথ



সমানান্তরাল টান ও ক চ সংযুক্ত কর। কগ গঙ সমান হওয়াতে (১। ৫) ওকগ কোণ কঙগ কোণের সমান। এবং কগঙ
সমকোণ হওয়াতে অন্য ত্বই কোণ ওকগ ও কঙগ (১। ৩২)
একত এক সমকোণ, আর তাহারা পরস্পার সমান হওয়াতে
প্রত্যেকে এক অর্দ্র সমকোণ। ঐ কারণে গঙ্থ ও ওথগ কোণও
প্রত্যেকে এক জর্দ্র সমকোণ। ঐ কারণে গঙ্থ ও ওথগ কোণও
প্রত্যেকে অর্দ্র সমকোণ স্থতরাং সমুদয় কঙথ কোণ এক সমকোণ। অপর ছঙচ অর্দ্র সমকোণ এবং ওছচ (১। ২৯)
অন্তরন্থ সম্মুখবর্ত্তি ওগখ সমান হওয়াতে এক সমকোণ হইতেছে, স্থতরাং ওচছও অর্দ্র সমকোণ, তরিমিত্তে ছঙ্চ ও ওচছ
পরস্পার সমান স্থতরাং ছঙ বাছ ছচ সমান (১। ৬)। অপর
থ কোণ অর্দ্র সমকোণ এবং চঘথ অন্তরন্থ সম্মুখবর্ত্তি ওগখ
সমান হওয়াতে এক সমকোণ, স্থতরাং অবশিষ্ট খচঘ কোণও
আর্দ্র সমকোণ, অতএব থ কোণ থচ্য সমান এবং (১। ৬) চঘ
থঘ বাছও পরস্পার সমান। কগ — গঙ স্থতরাং কগং —
গঙং এবং কগং + গঙং — ২কগং কিন্তু (১। ৪৭) কঙং —

therefore $AE^2 = 2AC^2$. Again, because EG = GF. $EG^2 = GF^2$, and $EG^2 + GF^2 = 2GF^2$. But $EF^2 = EG^2 + GF^2$; therefore, $EF^2 = 2GF^2 = 2CD^2$ because (34. 1.) CD = GF. And it was shown, that $AE^2 = 2AC^2$; therefore $AE^2 + EF^2 = 2AC^2 + 2CD^2$. But (47. 1.) $AF^2 = AE^2 + EF^2$, and $AD^2 + DF^2$, $= AF^2$ or $AD^2 + DB^2 = AF^2$; therefore, also $AD^2 + DB^2 = 2AC^2 + 2CD^2$. Therefore, "if a straight line," &c. Q. E. D.

Otherwise:

"Because AD² = (4.2.) AC² +CD² +2AC.CD, "and DB² + 2BC.CD = (7.2.) BC² +CD² =AC² "+CD², by adding equals to equals, AD² +BD² +2BC. "CD= $2AC^2 + 2CD^2 + 2AC.CD$; and therefore taking "away the equal rectangles 2BC.CD and 2AC.CD, "there remains AD² +DB² = $2AC^2 + 2CD^2$."

Dem. by Alg.—Let a stand for each of the equal parts AC, CB and b for CD the line between the points of section; then a + b shall represent the greater of the two unequal parts, and a-b the less. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ and $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. $(a + b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$.

PROP. X. THEOR.

If a straight line be bisected, and produced to any point; the square of the whole line thus produced, and the square of the part of it produced, are together double of the square of half the line bisected, and of the square of the line made up of the half and the part produced.

Let the straight line AB be bisected in C, and produced to the point D; the squares of AD, DB are double of the squares of AC, CD.

From the point C draw (11.1.) CE at right angles to AB, and make it equal to AC or CB; join AE, EB; through E draw (31.1.) EF parallel to AB, and through D draw DF parallel to CE. And because the straight line EF meets the parallels EC, FD, the angles

কগ' + গঙ' স্থতরাং কঙ' = ২কগ'। পুনশ্চ গুছ = চছ স্থতরাং গুছ' = চছ' এবং গুছ' + চছ' = ২চছ' কিন্তু গুচ' = ২চছ' = ২গঘ' কেননা (১। ৩৪) গঘ = চছ। পুর্ম্মে দর্শিত হইয়াছে যে কঙ' = ২কগ' স্থতরাং কঙ' + ওচ' = ২ কগ' + ২ গঘ'। কিন্তু (১। ৪৭) কচ' = কঙ' + ওচ' এবং কঘ' + ঘচ' = কচ', অর্থাৎ কঘ' + খঘ' = ২ কগ' + ২ গঘ'। স্থতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

প্রকারান্তরে উপপত্তি। কঘ² == কগ² + গঘ² + २ कগ.
গঘ (২। ৪) এবং খঘ² + ২খগ.গঘ == খগ² + গঘ² (২। ৭)
= কগ² + গঘ² সূতরাং সমানে সমান যোগ করিলে কঘ² +
খঘ² + ২খগ.গঘ == ২কগ² + ২গঘ² + ২কগ.গঘ বিয়োগ
করিলে কঘ² + খঘ² == ২কগ² + ২গঘ²।

বী. উ.। কগ, খগ ছুই সমান অংশের প্রত্যেকের নাম যেন ক এবং ছেদ চিহ্নের মধ্যস্থ খঘ রেখার নাম যেন খ। তাহাতে ক + খ অসমান অংশের বৃহত্তর হইবে এবং ক - খ লঘুতর। $(ক+ খ)^2 = 6^2 + 264 + 44^2$ এবং $(6- 4)^2 = 6^2 - 264 + 44^2 \cdot \cdot \cdot \cdot (6+ 4)^2 + (6- 4)^2 = 26^2 + 24^2 \cdot \cdot \cdot$


১০ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা দিখণ্ড হইয়া কোন বিন্দু পর্যান্ত বৃদ্ধি পাইলে সমুদয় বর্দ্ধিত রেখার এবং বর্দ্ধিত অংশের ছই সমচতু-র্ভু একত দিখণ্ডিত রেখার অর্দ্ধের এবং অর্দ্ধ ও বর্দ্ধিত অংশের যোগে উৎপন্নরেখার ছই সমচতুর্ভুক্তের দিগুণ হইবে। কথ সরল রেখা গ বিন্দুতে দিখণ্ড হইয়া ঘ পর্যান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কঘ খঘ রেখার ছই সমচতুর্ভু জ একত্র কগ গঘ রেখার ছই সমচতুর্ভুক্তের দিগুণ।

গ বিল্কু হইতে গঙকখ রেখার উপর লম্বভাবে টানিয়া তাহা কগ কিয়া খগ সমান কর।ুক ও ও ও খ সংযুক্ত কর।

CEF, EFD are equal (29. 1.) to two right angles; and therefore the angles BEF, EFD are less than two right angles: But straight lines which, with another straight line, make the interior angles, upon the same side, less than two right angles, do meet (Cor. 29. 1.) if produced far enough: Therefore EB, FD will meet, if produced towards B, D; let them meet in G, and join AG: then, because AC is equal to CE, the angle CEA is equal (5. 1.) to the angle EAC; and the angle ACE is a right angle; therefore each of the angles CEA, EAC is half a right angle (32.1.): For the same reason, each of the angles CEB, EBC is half a right angle; therefore AEB is a right angle: And because EBC is half a right angle, DBG is also (15. 1.) half a right angle, for they are vertically opposite; but BDG is a right angle, because it is equal (29. 1.) to the alternate angle DCE; therefore the remaining angle DGB is half a right angle, and is therefore equal to the angle DBG; wherefore also the side DB is equal (6. 1.) to the side DG. Again, because EGF is


half a right angle, and the angle at F a right angle, being equal (34. 1.) to the opposite angle ECD, the remaining angle FEG. is half a right angle, and equal to the angle EGF; wherefore also the side GF is equal (6 1.) to the side FE. And because



EC=CA, EC² + CA² = 2CA². Now AE² = (47.1.) AC² + CE²: therefore, AE² = 2AC². Again, because EF=FG, EF² = FG², and EF² + FG² = 2EF². But EG² = (47.1.) EF² + FG²; therefore EG² = 2EF²; and since EF=CD, EG² = 2CD². And it was demonstrated, that AE² = 2AC²; therefore AE² + EG² = 2AC² + 2CD². Now, AG² = AE² + EG², wherefore AG² = 2AC² + 2CD², but AG² (47.1.)=AD² + DG²

শু দিয়া (১। ৩১) ওচ কথ সমানান্তরাল টান এবং ঘ দিয়া
বিচ গঙ সমানান্তরাল টান। ওগ চঘ সমানান্তরাল রেখার
উপর ওচ পাতে (১। ২৯) গঙ্চ ও ওচঘ একত তুই সমকোণ
তুল্য হইতেছে স্তুতরাং খঙ্চ ও ওচঘ তুই সমকোণের ন্থান
হইতেছে। অপর যে২ সরল রেখা অন্য সরল রেখার সম্পাতে
এক পার্শের তুই অন্তরম্থ কোণকে তুই সমকোণের ন্থান করে
তাহারা বৃদ্ধি পাইলে মিলিবে (১। ২৯. অন্থ.) অতএব ওখ
ও ঘচ বৃদ্ধি পাইলে খ ঘ দিকে মিলিবে, তাহারা যেন ছ
বিন্দুতে মিলিতেছে। ক ছ সংযুক্ত কর। কগ গঙ্ সমান

স্থতরাং গকঙ ও কঙগ
কোণ পরস্পার সমান (১।
৫) এবং কগঙ সমকোণ
হওয়াতে গকঙ ও কঙগ
প্রত্যেকে অর্দ্ধ সমকোণ (১। ক্
৩২)। ঐ কারণে গঙখ
ও গখঙ কোণও প্রত্যেকে
অর্দ্ধ সমকোণ স্থতরাং ক-



ঙ্থ এক সমকোণ, এবং ঙ্খণ অন্ধ্ সনকোণ হওয়াতে তাহার সম্মুখহ ঘখছ কোণও অন্ধ্ সমকোণ (১।১৫), আর খঘছ সমকোণ কেননা তাহা ভিন্ন পার্ম্ম জগঘ সমান (১।২৯) অত-এব অবশিষ্ট কোণ ঘছখ অন্ধ্ সমকোণ হইয়া ঘণছ সমান হইতেছে স্কুতরাং খঘ ও ঘছ বাহুও পরস্পার সমান (১।৬)। অপর গুছচ অন্ধ্ সমকোণ ও চ কোণ সম্মুখন্ত গুগঘ সমান হইয়া (১।৬৪) সমকোণ হওয়াতে অবশিষ্ট চঙ্ছ কোণও অন্ধ্ সমকোণ হইয়া চছঙ সমান, স্কুতরাং গুচ ও চছ বাহু পরস্পার সমান (১।৬), পরে জগ — গক স্কুতরাং গঙ্ক + গকং — হগকং, এবং কঙ্ক = কগং + গঙ্কং (১।৪৭), অতএব কঙ্কং — হকগং। অপর গুচ — চছ স্কুতরাং গুচং — চছং এবং গুচং + চছং — ২গুচং কিন্তু গুছং — গুচং + চছং। অতএব গুছং — ২গুচং এবং গুচ — গুম হওয়াতে গুছং — ২গুচং এবং গুচং — হুদ্ধিৰ গুছং — হুদ্ধিৰ ভালে শ্ৰেম — হুদ্ধিৰ — হুদ্

=AD² + DB², because DG=DB: Therefore, AD² + DB² =2AC² + 2CD². Wherefore, "if a straight line," &c. Q. E. D.

Dem. by Alg.—Let a stand for each of the equal parts AC,CB, and b for BD the part produced. Then 2a + b shall represent AD the whole line produced, and a + b shall represent CD the half and the part produced. $(2a + b)^2 = 4a^2 + 4ab + b^2 \cdot \cdot \cdot (2a + b)^2 + b^2 = 4a^2 + 4ab + 2b^2 = 2 (2a^2 + 2ab + b^2) = 2 (a^2 + 2ab + b^2 + a^2) = 2 \times (a + b)^2 + 2a^2$.

PROP. XI. PROB.

To divide a given straight line into two parts, so that the rectangle contained by the whole, and one of the parts, may be equal to the square of the other part.

Let AB be the given straight line; it is required to divide it into two parts, so that the rectangle contained by the whole, and one of the parts, shall be equal to the square of the other part.

Upon AB describe (46. 1.) the square ABDC; biq sect (10. 1.) AC in E, and join BE; produce CA to F, and make (3. 1.) EF equal to EB, and upon AF describe (46. 1,) the square FGHA; AB is divided in H, so that the rectangle AB, BH is equal to the square of AH.

Produce GH to K: Because the straight line AC is bisected in E, and produced to the point F, the rectangle CF.FA, together with the square of AE, is equal (6.2.) to the square of EF: But EF is equal to EB; therefore the rectangle CF.FA, together with the square of AE, is equal to the square of EB. And the squares of BA, AE, are equal (47. 1.) to the square of EB, because the angle EAB is a right angle; therefore the rectangle CF.FA, together with the square of AE, is equal to the squares of BA, AE: take away the square of AE, which is common to both,

দর্শিত হইয়াছে কঙা = ২কগা স্থতরাং কঙা + ঙছা = ২কগা + ২গঘা । অপর কছা = কঙা + ওছা স্থতরাং কছা = ২কগা + ২গঘা কিন্তু কছা = কঘা + ঘছা = কঘা + খঘা + খঘা + ২গঘা । অতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

বী. উ.। কগ, থগ ছই সমান অংশের প্রত্যেকের নাম যেন ক এবং থঘ বর্দ্ধিত অংশ যেন থ। তাহাতে সমুদয় বিদ্ধিত রেখা কঘ, ২ক + খ হইবে, এবং অর্দ্ধ ও বিদ্ধিত অংশের যোগ থঘ,ক + খ হইবে। অপর (২ক + খ)² = ৪ক² + ৪কখ + খ² \cdot (২ক + খ)² + খ² = ৪ক² + ৪কখ + ২খ² = ২ (২ক² + ২কখ + খ²) = ২ (ক² + ২কখ + খ² + ক²) = ২ × $(\overline{a} + \overline{a})^2 + 2\overline{a}$ ।

১১ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।


এক নির্দিন্ট সরল রেখাকে এমত রূপে ভাগ করিতে হইবে যে তাহাতে যেন সমুদয় এবং এক অংশের অন্তর্গত আয়ত অন্য সংশের সমচতুর্ভুক্ত তুল্য হয়।

ুকথ নির্দিষ্ট সরল রেখা, ইহাকে এমত ছই অংশে বিভক্ত বিতে হইবে যে সমুদয় এবং এক অংশের আয়ত অন্য শংশের সমচতুর্ভুক্ত তুল্য হয়।

কথ উপর কথিব সমচতুর্ভুজ অঙ্কিত কর (১। ৪৬)। কগ বিন্দুতে দ্বিথণ্ড কর (১। ১০) এবং খ ও সংযুক্ত কর। গক প্রথান্ত বৃদ্ধি করিয়া ওছ ওখ সমান কর এবং কছ উপর ছচ-ক্রক সমচতুর্ভুজ আঁক। কথ জ বিন্দুতে এমত রূপে বিভক্ত ইয়াছে যে কথ.থজ আয়ত কজ সমচতুর্ভুজ তুলা।

চজ ট পর্যান্ত বৃদ্ধি কর। কগ সরল রেখা ও বিন্দুতে বিশ্বও
ইয়া ছ পর্যান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এ নিমিত্তে গছ.ছক আয়ত কও
শ্বাচতুর্ভুজ সনেত ওছ সমচতুর্ভুজের তুল্য (২। ৬)। অপর
ছৈ ওখ সমান স্থতরাং গছ.ছক আয়ত কও সমচতুর্ভুজ সমেত
অথ সমচতুর্ভুজ সমান। এবং কখ ও কঙ এ ছুএর সমচতুভুজ ওখ সমচতুর্ভুজ তুল্য (১। ৪৭), কেননা খকও এক সম-

therefore the remaining rectangle CF.FA, is equal to the square of AB. Now, the figure FK is the rectangle CF.FA, for AF is equal to FG; and AD is the square of AB; therefore FK is equal to AD: take away the common part AK, and the remainder FH is equal to the remainder HD. But HD is the rectangle AB.BH, for AB is equal to BD: and FH is the square of AH: therefore the rectangle AB.BH is equal to



the square of AH: Wherefore the straight line AB is divided in H, so that the rectangle AB.BH is equal


to the square of AH. Which was to be done.

Dem. by Alg.-" A line thus divided is, in arithmetic, incommensurable; for there is no number whatever that can be so divided, that the product of the whole by one of its parts shall be equal to the square of the other part.—Let the whole line AB be represented by a, and let the part AII be called x, then will BH be equal to a-x, and AB \times BH = $a \times (a-x)$ $=a^2-ax$: but AB \times BH=AH², that is, $a^2-ax=x^2$, from which equation $x=\frac{1}{2}a\sqrt{5}-\frac{1}{2}a=AH$; and BH $=\frac{3}{2}a-\frac{1}{2}a\sqrt{5}$."—Keith.

PROP. XII. THEOR.

In obtuse angled triangles, if a perpendicular be drawn from any of the acute angles to the opposite side produced, the square of the side subtending the obtuse angle is greater than the squares of the sides containing the obtuse angle, by twice the rectangle contained by the side upon which, when produced, the perpendicular falls, and the straight line intercepted between the perpendicular and the obtuse angle.

কোণ স্থতরাং গছ.ছক আয়ত কঙ সমচতুর্ভুক্ত সমেত কথ কঙ এ ছুএর ছু সমচতুর্ভুক্ত বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট গছ.ছক আয়ত কথ সমচতুর্ভুক্তর সমান হইবে। অপর ছট ক্ষেত্রই গছ.ছক আয়ত, কেননা কছ ছচ সমান, এবং কথ রেথার সমচতুর্ভুক্ত কঘ, স্থতরাং ছট কঘ সমান। কট সামান্য অংশ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ছক্ত কঘ সমান হইবে। অপর কথ থক্ত আয়তই কঘ, কেননা কথ প্রদান মান এবং চক্ত ক্ত বেথার স



কথ থঘ সমান,এবং ছজ, কজ রেখার সমচতুর্ভুজ, অতএব কথ। খজ আয়ত কজ সমচতুর্ভুজের সমান। এই রূপে কথ সরল রেখা জ বিন্তুতে এমত রূপে বিভক্ত হইয়াছে যে কথ থজ আয়ত কজ সমচতর্ভুজের সমান, ইহাই এ স্থলে সম্পাদ্য।


বী. উ.। গণিত বিদ্যাতে এপ্রকারে বিভক্ত রেখা অপবর্ত্ত্য হইতে পারেনা, কেননা ছুই ভাগ করিলে সমুদয় ও এক ভাগের শুণিত ফল অন্য ভাগের বর্গ সমান হয় এমত কোন সংখ্যা নাই। কথ সমুদয় রেখার নাম যেন ক এবং কজ অংশের নাম যেন অ; তাহাতে ক — অ,থজ হইবে। কথ \times থজ — ক \times (ক — অ) — ক' — কআ। অপর কথ \times থজ — কজে' আর্থাৎ ক' — কআ — অ'; এই সমীকরণে অ — ইক \sqrt{c} — ইক — কজ এবং থজ — ১ইক — ইক \sqrt{c} ।

১২ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

অধিককোণি ত্রিভুজে যদি কোন লঘুকোণ হইতে সন্মুখস্থ বর্দ্ধিত বাছর উপর লম্ব টানা যায় তবে অধিক কোণের সন্মু-খস্থ বাছর সমচতুর্ভুজ অধিক কোণের পার্শ্বস্থ ছুই বাছর সম-চতুর্ভুজ হইতে, বৃদ্ধি পাইলে যে বাছর উপর ঐ লম্ব পাত Let ABC be an obtuse angled triangle, having the obtuse angle ACB, and from the point A let AD be drawn (12. 1.) perpendicular to BC produced: The square of AB is greater than the squares of AC, CB, by twice the rectangle BC.CD.

Because the straight line BD is divided into two

parts in the point C, BD^2 = (4. 2.) $BC^2 + CD^2 + 2BC.CD$; add AD^2 to both: Then $BD^2 + AD^2 = BC^2 + CD^2 + AD^2 + AD^2 + AD^2 + AD^2$ (47. 1.), and $AC^2 = CD^2 + AD^2$ (47. 1.); therefore, $AB^2 = BC^2 + AC^2 + 2BC.CD$; that is, AB^2 is greater than




BC² + AC² by ²BC.CD. Therefore, "in obtuse angled triangles," &c. Q. E. D.

PROP. XIII. THEOR.

In every triangle, the square of the side subtending any of the acute angles, is less than the squares of the sides containing that angle, by twice the rectangle contained by either of these sides, and the straight line intercepted between the perpendicular, let fall upon it from the opposite angle, and the acute angle.


Let ABC be any triangle, and the angle at B one of its acute angles, and upon BC, one of the sides containing it, let fall the perpendicular (12. 1.) AD from the opposite angle: The square of AC, opposite to the angle B, is less than the squares of CB, BA by wice the rectangle CB.BD.



First, Let AD fall within the triangle ABC; and because the straight line CB is divided into two parts

হয় তাহার এবং লম্ব ও অধিক কোণের মধ্যস্থ সরল রেখার আয়তের দ্বিগুণ পরিমাণে অতিরিক্ত হইবে।

কথগ এক অধিক কোণি ত্রিভূজ তাহার মধ্যে কগথ অধিক
কোণ। থগ বৃদ্ধি করিয়া ক বিন্দু
হইতে তাহার উপর কঘ এক
লম্ব টান। কথ সমচতুর্ভুজ থগ.
গঘ আর্মিতের দিগুণ পরিমাণে থগ
ও কগ ছই রেখার ছই সমচতুভূজ হইতে অতিরিক্ত হইবে।




ঁখঘ সরল রেখা গ বিন্দুতে ছুই অংশে বিভক্ত হুইয়াছে একারণ (২। ৪) খঘ² — খগ² + গঘ² + ২খগ.গঘ। উভয়ে কঘ² যোগ কর তাহাতে খঘ² + কঘ² — খগ² + গঘ² + কঘ² + ২খগ.গঘ কিন্তু কখ² — খঘ² + কঘ² (১। ৪৭) এবং কগ² — গঘ² + কঘ² + কগ² + ২খগ.গঘ অর্থাৎ কখ², ২খগ.গঘ পরিমাণে, খগ² + কগ² হুইতে অতিরিক্ত। অতএব অধিককোণি ত্রিভুজে, ইত্যাদি।

১৩ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

প্রত্যেক ত্রিভুজে কোন লঘু কোণের সম্মুখন্থ বাছর সম-চতুভুজি, ঐ কোণের পার্শ্বস্থ ছই বাছর ছই সমচতুভুজি অপেকা, ঐ ছই বাছর মধ্যে কোন বাছর এবং সম্মুখন্থ কোণ হইতে তদ্বপরি পতিত লম্ব ও লঘু কোণের মধ্যন্থ সরল রেখার অন্তর্গত আয়তের দিগুণ পরিমাণে লঘুতর হইবে।

কখগ এক ত্রিভুজ, খ লঘ্ কোণ, এই কোণের এক পার্থস্থ খগ উপর সম্মুখস্থ কোণ হইতে কম্ব লম্ব পাত কর, খ কোণের সম্মুখস্থ কগ সম চতুভুজ খগ ও কখ সমচতুভুজ অপেকা ২খগ.খঘ পরিমাণে ল্যুত্র হইবে।



in the point D (7.2.) $BC^2 + BD^2 = 2BC.BD + CD^2$. Add to each AD^2 ; then $BC^2 + BD^2 + AD^2 = 2BC.BD + CD^2 + AD^2$. But $BD^2 + AD^2 = AB^2$, and $CD^2 + DA^2 = AC^2$ (47.1.); therefore $BC^2 + AB^2 = 2BC.BD + AC^2$; that is, AC^2 is less than $BC^2 + AB^2$ by 2BC.BD.

Secondly, Let AD fall without the triangle ABC*: Then because the angle at D is a right angle, the angle ACB is greater (16. 1.) than a right angle, and . AB²=(12. 2.) $AC^2 + BC^2 + 2BC.CD$. Add BC² to each; then $AB^2 + BC^2 = AC^2 + 2BC^2 + 2BC.CD$. But because BD is divided into two parts in C, BC² + BC. CD=(3. 2.) BC.BD, and $2BC^2 + 2BC.CD = 2BC.BD$: therefore $AB^2 + BC^2 = AC^2 + 2BC.BD$; or AC^2 is less than $AB^2 + BC^2$ by 2BD.BC.

Lastly, Let the side AC be perpendicular to BC; then is BC the straight line between the perpendicular and the acute angle at B: and it is manifest, that (47. 1.) AB² + BC²=AC²+2BC.BC. Therefore, "in every triangle," &c. Q. E. D.



PROP. XIV. PROB.

To describe a square that shall be equal to a given rectilineal figure.

Let A be the given rectilineal figure; it is required to describe a square that shall be equal to A.

Describe (45.1.) the rectangular parallelogram BCDE equal to the rectilineal figure A. If then, the sides of it, BE, ED, are equal to one another, it is a square, and what was required is done; but if they are not equal, produce one of them, BE to F, and make EF equal

^{*} See figure of the last Proposition.

প্রথমতঃ কঘ যেন কথগ ত্রিভুজের মধ্যে পড়িতেছে। অতএব খগ সরল রেখা ঘ বিন্দুতে ছই অংশে বিভক্ত হওয়াতে (২। ৭) খগ² + খঘ² = ২খগ.খঘ + গঘ²। উভয় পক্ষে কঘ² যোগ কর তাহাতে খগ² + খঘ² + কঘ² = ২খগ.খঘ + গঘ² + কঘ²। কিন্তু খঘ² + কঘ² = কখ² এবং গঘ² + কঘ² = কগ² (১। ৪৭), স্ভতরাং খগ² + কখ² = ২খগ.খঘ + কগ² অর্থাং কগ², খগ² + কখ² হইতে ২খগ.খঘ পরিনাণে লঘতর হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, কঘ যেন কথগ ত্রিভুজের বাহিরে পড়িতেছে *।
তাহাতে ঘ কোণ সমকোণ এ কারণ (১। ১৬) কগখ কোণ সমকোণ হইতে অধিক, স্তরাং (২।১২) কখ = কগ + খগ
+ ২খগ.গঘ, উভয় পক্ষে খগ থোগ কর তাহাতে কখ + খগ = কগ + ২খগ + ২খগ.খঘ। কিন্তু খঘ গ বিন্তুতে জুই অংশে বিভক্ত হওয়াতে (২।৩) খগ + খগ.গঘ = খগ.
খঘ এবং ২খগ + ২খগ.গঘ = ২খগ.খঘ স্তরাং কখ + খগ = কগ + ২খগ.খঘ, অর্থাৎ কগ ন কথ + খগ হতরাং কথ কা কা কিন্তুতে হথঘ.খগ পরিনাণে লঘ্তর।

অবশেষে কগ যেন খগ উপর লম্বভাবে আছে তাহাতে খগ সরল রেখা কগ লম্ব এবং খ লঘু কোণের মধ্যে হইতেছে, স্থৃতরাং স্পাই দেখা ঘাইতেছে যে (১। ৪৭) কথ² + খগ² = কগ² + ২খগ খগ। অতএব প্রত্যেক বিভুজে, ইত্যাদি।



১৪ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।


্রথক নির্দিষ্ট সরল রৈখিক ক্ষেত্রের সদৃশ এক সমচতুর্ভুক্ত আঁকিতে হুইবে।

ক নিদ্দিন্ট সরল রৈথিক ক্ষেত্র। ক সমান এক সমচতুর্ভু জ আঁকিতে হইবে।

পূর্ব প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকর।

to ED, and bisect BF in G: and from the centre G, at the distance GB, or GF, describe the semicircle BHF, and produce DE to H, and join GH. Therefore, because the straight line BF is divided into two equal parts in G, and into two unequal parts in E, the rectangle BE.EF, together with the square of EG, is equal (5. 2.) to the square of GF: but GF is equal to GH: therefore the rectangle BE.EF, together with

the square of EG, is equal to the square of GH: But the squares of HE and EG are equal (47. 1.) to the square of GH: Therefore also the rectangle BE.EF, together with the square of EG.




is equal to the squares of HE and EG. Take away the square of EG, which is common to both, and the remaining rectangle BE.EF is equal to the square of EH. But BD is the rectangle contained by BE and EF, because EF is equal to ED; therefore BD is equal to the square of EH; and BD is also equal to the rectilineal figure A; therefore the rectilineal figure A is equal to the square of EH: Wherefore a square has been made equal to the given rectilineal figure A, viz. the square described upon EH. Which was to be done.

Sym. Dem. BE.EF+GE² = BG² (5. 2.) = GH² = HE.² +GE.² (47. 1.) \therefore BE.EF = HE.² But BE. EF = rect. \square BD = Fig A (by constr.) \therefore HE² = Fig. A.

খগঘণ্ড সমকোণি সমানান্তরাল ক্ষেত্র ক সরল রৈথিক ক্ষেত্রের সমান অক্ষিত কর। যদি ইহার খণ্ড ওঘ বাছ পরস্পর সমান হয় তবে ইহাই সমচতুভূজ এবং তবে যাহা অভীষ্ট তাহা হইল। যদি তাহারা সমান না হয় তবে তাহাদের মধ্যে

একটাকে (খণ্ড) চ
পর্যান্ত বৃদ্ধি করিয়া
ওচ ওঘ সমান কর
এবং খচ ছ বিন্তুতে দ্বিখণ্ডকর,এবং
ছ কেন্দ্র হইতে ছখ
দূরে খজচ অর্দ্ধ
বৃত্ত অঙ্কিত কর
এবং ঘণ্ড জ পর্যান্ত
বৃদ্ধি করিয়া ছ জ



সংখুক্ত কর, অতএব খচ সরল রেখা ছ বিন্দুতে ছই সমান ভাগে ও ঙ বিন্দুতে ছই অসমান ভাগে বিভক্ত হওয়াতে খঙ.ঙচ আয়ত ঙছ সমচতুর্ভু জ সমেত চছ সমচতুর্ভু জ সমান (২।৫), কিন্তু চছ ছজ সমান, অতরাং খঙ.ঙচ আয়ত ঙছ সমচতুর্ভু জের সহিত একত্র ছজ সমচতুর্ভু জ সমান, অপর (১।৪৭) জঙ ও ৬ছ সমচতুর্ভু জ সমান, অপর (১।৪৭) জঙ ও ৬ছ সমচতুর্ভু জ সমান, তির্মিত্তে খঙ.ঙচ আয়ত ঙছ সমচতুর্ভু জ সহিত একত্র জঙ ও ৬ছ সমচতুর্ভু জের সমান। উভয় হইতে সামান্য ৬ছ সমচতুর্ভু জ বিয়োগ করিলে অবশিক্ট খঙ.ঙচ আয়ত ওজ সমচতুর্ভু জ সমান হইবে। কিন্তু খঙ ও ৬চ অন্তর্গু জর সমান, অতরাং বছ ওজ সমচতুর্ভু জের সমান, কিন্তু খঘ ক সরল রৈখিক ক্ষেত্রের সমান, তির্মিত্তে ক সরল হৈথিক ক্ষেত্র ওজ সমচতুর্ভু জের সমান, তির্মিত্ব ক সরল হৈথিক ক্ষেত্র সমান, অতএব ওজ রেখার সমচতুর্ভু জে নির্দিক্ট ক্ষেত্রের সমান, অতএব ওজ রেখার সমচতুর্ভু জ নির্দিক্ট ক্ষেত্রের সমান হইয়া স্থাপিত হইল, ইহাই এন্থলে সম্পাদ্য।

সং উ.। খড.ওচ + ছঙ' = খছ' $(2 \mid c) =$ ছজ' = জঙ' + ছঙ' $(3 \mid 89) \therefore$ খড.ওচ = জঙ' | অপর খড.ওচ = সম-কোণি = খঘ = ক কেত্র | অস্ব পাত| \therefore জঙ' = ক কেত্র |

PROP. A. THEOR.

If one side of a triangle be bisected, the sum of the squares of the other two sides is double of the square of half the side bisected, and of the square of the line drawn from the point of bisection to the opposite angle of the triangle.

Let ABC be a triangle, of which the side BC is bisected in D, and DA drawn to the opposite angle: the squares of BA and AC are together double of the squares of BD and DA.

From A draw AE perpendicular to BC, and because BEA is a right angle,

 $AB^2 = (47. 1.) BE^2 + AE^2$ and $AC^2 = CE^2 + AE^2$: wherefore $AB^2 + AC^2 = BE^2 + CE^2 + 2AE^2$. But because the line BC is cut equally in D, and unequally in E, $BE^2 + CE^2 = (9. 2.)$ $2BD^2 + 2DE^2$: therefore $AB^2 + AC^2 = 2BD^2 + 2DE^2 + 2AE^2$.

Now, $DE^2 + AE^2 = (47.1.) AD^2$, and $2DE^2 + 2AE^2 = 2AD^2$; wherefore $AB^2 + AC^2 = 2BD^2 + 2AD^2$. Therefore, &c. Q. E. D.

PROP. B. THEOR.


The sum of the squares of the diagonals of any parallelogram is equal to the sum of the squares of the sides of the parallelogram.

Let ABCD be a parallelogram, of which the diagonals are AC and BD; the sum of the squares of AC and BD is equal to the sum of the squares of AB, BC, CD, DA.

ক প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন ত্রিভুজের এক বাছ দিখণ্ড হইলে অন্য ছুই বাছর সমচতৃভুজের যোগে, দিখণ্ডিত বাছর অর্দ্ধের সমচতৃভুজের এবং দিখণ্ড চিহ্ন হইতে সম্মুখস্থ কোণ পর্যান্ত অঙ্কিত রেখার সমচতুভুজের দিগুণ হইবে।

কখন এক ত্রিভুজ, তাহার খন বাছ ঘ বিল্কুতে দিখণ্ড হইয়াছে, এবং ঘক সম্মুখস্থ কোণ পর্যান্ত টানা নিয়াছে। কথ এবং কন দ্বএর সমচত্র্ভুজ একত্র যোগে খঘ ও কঘ দ্বএর সমচত্রুভুজের দি-শুণ হইবে।



ক হইতে থগ উপর কঙ লয়ভাবে টান। কঙখ সমকোণ হওয়াতে (১।৪৭) কথ² = থঙ² + কঙ² এবং কগ² = গঙ² + কঙ² স্থতরা² কথ² + কগ² = থঙ² + গঙ² + হকঙ²। অপর থগ রেথা ঘ বিন্তুতে ছুই সমান ভাগে ও ঙ বিন্তুতে ছুই অসমান ভাগে বিভক্ত হওয়াতে (২।৯) থঙ² + গঙ² = ২থঘ² + ২ঘঙ² স্থতরাং কথ² + কগ² = ২থঘ² + ২ঘঙ² + ২কঙ²।


অপর ঘঙ + কঙ + = কঘ এবং ২ঘঙ + ২কঙ = ২কঘ স্থতরাং কথ + কগ = ২থঘ + ২কঘ + ১০০০ কেনি ত্রিভুজের, ইত্যাদি।

খ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সমানান্তরাল ক্ষেত্রের ছুই কর্ণের ছুই সমচতুর্ভু জ একত্র যোগে ঐ সমানান্তরাল ক্ষেত্রের বাছ সমূহের সমচতুর্ভু-জের যোগ সমান হইবে।

কথগঘ এক সমানান্তরাল ক্ষেত্র, কগ,খঘ ইছার ছুই কর্ণ, কগ, খঘ এ ছুএর সমচতুর্ভুক্ত কথ, খগ, গঘ, ঘক, এ সকলের সমচতুর্ভুক্ত সমান হইবে। Lct AC and BD intersect one another in E: and because the vertical angles AED, CEB are equal (15. 1.), and also the alternate angles EAD, ECB (29. 1.), the triangles ADE, ECB have two angles in the one equal to two angles in the other, each to each: but the sides

AD and BC, which are opposite to equal angles, in these triangles are also equal (34. 1.); therefore the othersides which



are opposite to the equal angles are also equal (26. 1.) viz. AE to EC, and ED to EB.

Since, therefore, BD is bisected in E, $AB^2 + AD^2 = (A. 2) 2BE^2 + 2AE^2$; and for the same reason, $CD^2 + BC^2 = 2BE^2 + 2EC^2 = 2BE^2 + 2AE^2$, because EC = AE. Therefore $AB^2 + AD^2 + DC^2 + BC^2 = 4BE^2 + 4AE^2$. But $4BE^2 = BD^2$; and $4AE^2 = AC^2$ (2. cor. 8. 2.) because BD and AC are both bisected in E; therefore $AB^2 + AD^2 + CD^2 + BC^2 = BD^2 + AC^2$. Therefore, "the sum of the squares, and account of the squares, and account of the squares."


Cor. From this demonstration, it is manifest that the diagonals of every parallelogram bisect one another.

PROP. C. THEOR.

'If a straight line be drawn from any point in the base of an isosceles triangle, or the base produced, to the opposite angle; the rectangle contained by the segments between the point and the extremities of the base is equal to the difference between the square of the line drawn to the opposite angle, and the square of one of the equal sides.

'Let ABC be an isosceles triangle, and let a straight 'line be drawn from any point D in the base, (fig. 1.)

কগওখন ও বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করুক। কঙম ও গঙ্থ সন্মুখন্থ কোণ(১।১৫) পরস্পর সমান, এবং ওকম ও ডগখ ভিন্ন২ পার্শ্বন্থ



কোণ ও সমান (১। ২৯) একারণ কঘণ্ড ও জগথ ত্রিভুজের মধ্যে একটার তুই কোণ ক্রমশ অন্যের তুই কোণের সমান এবং ক্ষ ও থগ সমান ২ কোণের সম্মুখস্থ বাহুও পরস্পার সমান, অতএব সমান ২ কোণের সম্মুখস্থ অবশিষ্ট বাহুও সমান (১। ২৬) অর্থাং ক্ষ ও গুগ সমান এবং গুঘ ও গুখ সমান।


অপর থঘ ও বিন্দুতে দ্বিথও হইয়াছে একারণ কথ' + কঘ' = ২থঙ' + ২কঙ' (২। ক) ঐ কারণ গঘ' + খগ' = ২থঙ' + ২৬৬' + ২৯৬' + ২৯৬' কেননা ওগ = কঙ, স্থতরাং কখ' + কঘ' + ঘগ' + খগ' = ৪খঙ' + ৪৯৬' কিন্তু ৪খঙ' = খঘ' এবং ৪৯৬' = কগ' (২। ৮০৯৯) কেননা খঘ ও কগ উভয়ে ও বিন্দুতে দ্বিখণ্ডিত, তন্ধিমির্ভে কখ' + কঘ' + গঘ' + খগ' = খঘ' + কগ'। অত্ত এব কোন সমানাস্তরাল ক্ষেত্রের, ইত্যাদি।

অমুমান। এই উপপত্তিতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে প্রত্যেক সমানাস্তরাল ক্ষেত্রের চুই কর্ণ পরস্পারকে দ্বিখণ্ডিত করে।

গ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

সমদ্বাহু ত্রিভুজের ভূমির কোন বিন্দু ইইতে অথবা ভূমি বৃদ্ধিত ইইলে তথা ইইতে সম্মুখন্থ কোণ পর্যান্ত এক সরল রেখা যদি টানা যায় তবে ঐ বিন্দু ইইতে ভূমির ছুই প্রান্ত পর্যান্ত যে ছুই রেখা খণ্ড থাকিবে তাহাদের অন্তর্গত আয়ত সম্মুখন্থ কোণ পর্যান্ত অন্ধিত ঐ রেখা এবং এক সমান বাহু ইহাদের সমচতুর্ভুক্তের অন্তর তুলা ইইবে।

কথগ এক সমন্বিবাহু ত্রিভুজ, ইহার ভূমির এক বি**ন্তু** (১ ক্ষেত্রে দৃষ্টি কর) অথবা ভূমি বন্ধিত হইলে তথা হইতে or in the base produced, (fig. 2.) to the opposite angle A; the rectangle BD.DC is equal to the difference between the squares of AD and AB.




Bisect the base BC in E (10.1.) and join EA; then, because BE is equal to CE, and EA common to the two triangles BEA, CEA, there are two sides in the one equal to two sides in the other, also the base BA is equal to the base CA, therefore the angle BEA is equal to the angle CEA (8.1.), and each is a right angle (7. Def. 1.)

'And, first, Let D be between E, the middle of the base, and one of its extremities; then BD.DC + $DE^2 = (5.2.) BE^2$: and, adding AE^2 to these equals, BD.DC + DE^2 + $EA^2 = BE^2$ + EA^2 ; but DE^2 + $EA^2 = DA^2$ (47. 1.) and BE^2 + $EA^2 = BA^2$; therefore BD.DC + DA^2 = BA^2 , and hence, the rectangle BD.DC is equal to the excess of BA^2 , above DA^2 .

'Secondly. Let D be in BC produced, then BD.DC '+ BE' = DE' (6.2.), and adding AE to these 'equals, BD.DC + BE' + EA2 = DE2 + EA2: but 'BE' + EA2 = BA2 (47. 1.) and DE2 + EA2 = 'DA2; therefore BD.DC + BA2 = DA3, and the 'rectangle BD.DC is the excess of DA2 above BA3.

'Thirdly, when the D is in the middle of the base, the truth of the proposition is manifest (47. 1.).'

(২ ক্ষেত্রে দৃষ্টি কর) অর্থাৎ ঘ বিন্তু হইতে সম্মুখস্থ ক কোণ পর্যান্ত এক সরল রেখা অঙ্কিত হউক। খঘ.গঘ আয়ত কঘ ও কথ এ ত্বএর সমচতুর্ভুজের অন্তর তুল্য।



খগ ভূমি ও বিল্কুতে দ্বিখণ্ড করিয়া ক ও সংযুক্ত কর। খও গও সমান, এবং ওক খওক ও গওক ত্রিভুজের সামান্য বাছ হওয়াতে একটার ছই বাছ ক্রমশ অন্যের ছই বাছ সমান, এবং কথ
ভূমিও গক সমান, অতএব খঙক কোণ গওক কোণের সমান
(১।৮) আর ইহারা প্রত্যেকে সমকোণ (১।৭ সংজ্ঞা)।

অপর প্রথমতঃ যেন ঘ বিন্দু ভূমির মধ্যন্থ ও এবং প্রান্তের মধ্যে আছে তাহাতে খঘ গঘ + ঘঙ² = খঙ² (২।৫) উভয় পক্ষে কঙ² যোগ করিলে খঘ গঘ + ঘঙ² + কঙ² খঙ² + কঙ², কিন্তু ঘঙ² + কঙ² ঘক² এবং খঙ² + কঙ² কখ² (১।৪৭) স্থতরাং খঘ গঘ + ঘক² = খক², অতএব খঘ গঘ আয়ত কথ² এবং কঘ² ইহাদের অন্তর ভুলা।


দিতীয়তঃ যেন ঘ বিন্দু খগ ভূমি বর্দ্ধিত হইলৈ তাহাতে আছে। অতএব খঘ.গঘ + খঙ² = ঘঙ² (২। ৬) উভয় পক্ষেকঙ² যোগ করিলে খঘ.গঘ + খঙ² + কঙ² = ঘঙ² + কঙ² কিন্তু খঙ² + কঙ² = কখ² এবং ঘঙ² + কঙ² = ঘক² (১। ৪৭) স্থতরাং খঘ.গঘ + কখ² = ঘক², এবং খঘ.গঘ আয়ত কঘ² এবং কখ² ইহাদের অন্তর তুল্য।

যদি ঘ বিন্দু ভূমির মধ্যভাগে থাকে তবে প্রতিক্রাই স্পষ্ট দেখা যায়, উপপত্তির অপেক্ষা থাকে না, (১। ৪৭)।

BOOK III.*

DEFINITIONS.

- A. THE radius of a circle is the straight line drawn from the centre to the circumference.
- I. A straight line is said to touch a circle, when it meets the circle, and being produced, does not cut it.
- II. Circles are said to touch one another, which meet, but do not cut one another.



- III. Straight lines are said to be equally distant from the centre of a circle, when the perpendiculars drawn to them from the centre are equal.
- IV. And the straight line, on which the greater perpendicular falls, is said to be farther from the centre.



B. An arch of a circle is any part of the circumference.

^{*} Signifies a circle, — the circumference, 10 or a somi-

৩ অধ্যায়।

সংজ্ঞা


ক.। বৃত্তের কেন্দ্র ইইতে পরিধি পর্যান্ত কোন সরল রেখা টানিলে তাহাকে কর্ক ট কছে।

১। যদি কোন সরল রেখা বৃত্তেতে সংলগ্ন হইয়া বৃদ্ধি পাই-লেও বৃত্তকে ছেদ না করে তবে ঐ রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করিতেছে এমত কহা যায়।

২। যে২ বৃত্ত সংলগ্ন


হইয়া পরস্পারকে ছেদ
করে না তাহারা পরস্পার

স্পাণ করিতেছে এমত
কহা যায়।



৩। যে২ রেখার উপর বৃত্তের কেন্দ্র ছইতে লয় টানিলে লয় সমান২ হয় সেই২ রেখাকে কেন্দ্র ছইতে সমদ্র কহা যায়।

৪। আর যে রেখার উপর বৃহত্তর লম্ব পড়ে তাহাকে কেন্দ্র হইতে দূর তর কহা যায়।




খ। পরিধির কোন অংশের নাম চাপ।

V. A segment of a circle is the figure contained by a straight line, and the arch which it cuts off.



VI. An angle in a segment is the angle contained by two straight lines drawn from any point in the circumference of the segment, to the extremities of the straight line which is the base of the segment.




VII. And an angle is said to insist or stand upon the arch intercepted between the straight lines which contain the angle.



VIII. The sector of a circle is the figure contained by two straight lines drawn from the centre, and the arch of the circumference between them.

IX. Similar segments of a circle are those in which the angles are equal, or which contain equal angles.



PROP. I. PROB.

To find the centre of a given circle.


Let ABC be the given circle; it is required to find its centre.

Draw within it any straight line AB, and bisect (10. 1.) it in D; from the point D draw (11. 1.) DC. at

 ৫। কোন সরল রেখা এবং তদ-বচ্ছিন্ন চাপের মধ্যে যে ক্ষেত্র থাকে তাহাকে বৃত্তখণ্ড কহে।



৬। খণ্ডের পরিধির কোন বিন্তু হইতে খণ্ডের ভূমিরেখার প্রান্ত পর্যা-ন্ত ছাই সরল রেখা টানিলে তাহা-দের মধ্যবর্ত্তি কোণকে খণ্ডন্থ কোণ কহে।



৭। এবং কোণের ছুই পার্শ্বস্থ সরল রেথার মধ্যে যে চাপ থাকে ঐ কোণকে সে চাপের উপরিস্থ কছে।

৮। কেন্দ্র হইতে অঙ্কিত ছুই সরল রেখার এবং তন্মধ্যস্থ পরিধি চাপের অন্তর্গত ক্ষেত্রকে বৃত্তচ্ছেদক কহে।



৯। যে২ বৃত্তথণ্ডের কোণ পরস্পর সমান তাহাদিগকে সদৃশ খণ্ড কহে।




১ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক নির্দ্ধিট বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় করিতে হইবে।
কথগ নির্দ্ধিট বৃত্ত, ইহার কেন্দ্র নির্ণয় করিতে হইবে। বৃত্ত
মধ্যে কথ সরল রেখা টানিয়া ঘ বিন্দুতে তাহা দ্বিখণ্ড কর
(১। ১০), এবং কথ উপর ঘ হইতে গঘ লম্বভাবে (১।
১১) টানিয়া ও পর্যান্ত বৃদ্ধি কর, এবং গঙ চ বিন্দুতে দ্বিখণ্ড
কর। চক্থগ বৃত্তের কেন্দ্র হইবে।

right angles to AB, and produce it to E, and bisect CE in F: the point F is the centre of the circle ABC.

For, if it be not, let, if possible, G be the centre, and join GA, GD, GB: Then because DA is equal to

DB, and DG, common to the two triangles ADG, BDG, the two sides AD,DG are equal to the two BD, DG, each to each; but the base GA is also equal to the base GB, because they are radii of the same circle: therefore the angle ADG is equal (8. 1.) to the angle GDB: But when a straight line, standing upon another straight line, makes the adjacent angles equal to one another, each of the an-



gles is a right angle (7. Def. 1.) Therefore the angle GDB is a right angle: But FDB is likewise a right angle; wherefore the angle FDB is equal to the angle GDB the greater to the less, which is impossible. Therefore G is not the centre of the circle ABC: In the same manner, it can be shown, that no other point than F is the centre; that is F is the centre of the circle ABC. Which was to be found.

Cor. From this it is manifest, that if in a circle a straight line bisect another at right angles, the centre of the circle is in the line which bisects the other.


Sym. Dem. If F be not the centre, then suppose G to be the centre. AD = DB (by constr.) GD common to \triangle s ADG, GDB and AG = GB (11 Def. I) \triangle \triangle ADG = \triangle GDB (8. 1.) \triangle \triangle ADG is a rt. \triangle (7 Def. 1.) But \triangle FDA is a rt. \triangle (by constr.) \triangle \triangle ADG = \triangle FDA which is impossible (9 Ax. 1.) \triangle G is not the centre, nor any other, but F.

PROP. II. THEOR.

If any two points be taken in the circumference of a circle, the straight line which joins them will fall within the circle.

কেননা যদি না হয় তবে বোধ কর ছ যেন কেন্দ্র। ছ ক, ছ ম, এবং ছ খু সংযুক্ত কর। কম খম সমান এবং ঘছ

কঘছ ও খঘছ ত্রিভুজের সামান্য বাহু, স্মৃতরাং কঘ ঘছ ছুই বাহু ক্রমশ খঘ ঘছ ছুই বাহুর সমান, এবং ছক ভূমিও ছখ ভূমি সমান কেন্না তাহারা উভয়ে এক বৃত্তের ককট রেখা, অতএব(১।৮) ছঘখ কোণ ছঘক কোণের সমান, অপর এক সরল রেখা অন্য রেখার উপর দাঁড়াইয়া সমীপস্থ ছুই কোণকে



সমান করিলে প্রত্যেক কোণ সমকোণ হয় (১। ৭ সং.), স্থতরাং ছযথ এক সমকোণ, কিন্তু চঘথও সমকোণ তাহাতে চঘথ ও ছযথ এ ছুই কোণ সমান হয়, কিন্তু বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারেনা অতএব ছ কথগ বৃত্তের কেন্দ্র নহে। ঐ রূপে চ ভিন্ন অন্য কোন বিন্তু কথগ বৃত্তের কেন্দ্র নহে ইহাও দর্শিত হইতে পারে, স্থতরাং চ কথগ বৃত্তের কেন্দ্র, ইহাই এস্থলে নির্ণেয়।


অমুমান। অতএব স্পাই দেখা যাইতেছে যে বৃত্তের মধ্যে যদি এক সরল রেখা অন্য সরল রেখাকে লম্ব ভাবে দ্বিওও করে তবে ঐ দ্বিওও করে তবে ঐ দ্বিওও কারক রেখার মধ্যে কেন্দ্র থাকিবে।

সং উ.। চ যদি কেন্দু না হয় তবে ছ কেন্দু কল্পনা কর। কঘ = খঘ (অঙ্কপাত) ছঘ, কঘছ ও ছঘখ ত্রিভূজের সামান্য, এবং কছ = খছ (১। ১১ সং), \dots \angle কঘছ = \angle ছঘখ (১। ৮), \dots \angle কঘছ এক সম \angle (১। ৭ সং), কিন্তু চঘক এক সম \angle (অঙ্ক পাত) \dots \angle কঘছ = \angle চঘক ইহা অসাধ্য (১। ৯ খা. সা.) \dots চ ভিন্ন অন্য কোন বিন্দু কেন্দু নহে।

২ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্তের পরিধিতে ছুই বিন্দুর নির্দ্দেশ করিলে তাহাদের সংযোজক সরল রেখা বৃত্তের মধ্যে পড়িবে। Let ABC be a circle, and A, B any two points in the circumference: the straight line drawn from A to B will fall within the circle.

Take any point in AB as E; find D, the centre of the circle ABC; join AD, DB and DE, and let DE meet the circumference in F. Then because DA is equal to DB, the angle DAB is equal (5. 1.) to the angle DBA; and because AE, a side of the triangle DAE, is produced to B, the angle DEB is



greater (16. 1.) than the angle DAE; but DAE is equal to the angle DBE; therefore the angle DEB is greater than the angle DBE: Now to the greater angle the greater side is opposite (19. 1.); DB is therefore greater than DE: but DB is equal to DF; wherefore DF is greater than DE, and the point E is therefore within the circle. The same may be demonstrated of any other point between A and B, therefore AB is within the circle. Wherefore, "if any two points," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. \therefore AD == DB (11 Def. 1) \angle DAE == \angle DBE (5. 1.) \angle DEB7 \angle DAE (16. 1.) \therefore \angle DEB7 \angle DBE \therefore DB7 DE (19. 1.) But DB==DF (11 Def. 1.) \therefore DF7 DE \therefore AB is within the \odot .


PROP. III. THEOR.

If a straight line drawn through the centre of a circle bisect a straight line in the circle, which does not pass through the centre, it will cut that line at right angles; and, if it cut it at right angles, it will bisect it.

Let ABC be a circle, and let CD, a straight line drawn through the centre, bisect any straight line AB, which does not pass through the centre, in the point F: It also cuts it at right angles.

কথগ এক বৃত্ত এবং পরিধিত্ব ছুই বিল্ফু কখ। ক হুইতে খ প্যান্ত সরল রেখাটানিলে বৃত্তের মধ্যে পড়িবে।

কখ রেখার মধ্যে কোন বিল্ফু লপ্ত যথা গু। কখগ বৃত্তের কেন্দ্র (৩।১) নির্ণয় কর যথা ঘ, এবং কঘ ঘখ ঘণ্ড এই২ রেখা টান, ও ঘণ্ড চ বিল্ফুতে পরিধিতে সংলগ্ন




হউক। অপর কঘ ঘথ সমান হওয়াতে ঘকথ কোণ ঘথক কোণের সমান (১। ৫), এবং কঙ কঙঘ ত্রিভুজের এক পার্শ্ব হইয়া থ পর্যান্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে ঘঙথ কোণ ঘকঙ কোণ হইতে অধিক হইবে (১। ১৬), আর ঘকঙ ও ঘথঙ সমান একারণ ঘঙ্থ ঘথঙ অপেক্ষাও অধিক, স্পুতরাং ত্রিভুজের বৃহত্তর কোণের সন্মুখস্থ বাহুও বৃহত্তর হওয়াতে (১।১৯) ঘথ বাহু ঘঙ হইতে বৃহত্তর। অপর ঘথ ও ঘচ সমান, স্পুতরাং ঘচ ঘঙ হইতে বৃহত্তর, তমিনিত্তে ও বিন্দু বৃত্তের মধ্যে আছে। কথ রেখার মধ্যে যে কোন বিন্দু লও তাহা বৃত্তের মধ্য হুইাও এই রূপে উপপন্ন হয় স্পুতরাং কথ বৃত্তের মধ্যে আছে। অত-এব বত্তের পরিধিতে, ইত্যাদি।

সং উ.। ∵ কঘ == থঘ (১। ১১ সং), ∠ঘকঙ == ∠**ঘধঙ** (১।৫)। ∠ঘঙথ ৴ ∠ঘকঙ (১। ১৬) ∴ ∠ঘঙথ ৴ ∠ঘ**ধঙ,** ∴ থঘ ৴ ঘঙ (১। ১৯) কিন্তু থঘ == ঘচ (১।১১ সং) ∴ ঘচ ৴ ঘঙ ∴ কথ ⊙ মধ্যে আছে।

৩ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা বৃত্তের কেন্দ্র দিয়া আসিয়া, কেন্দ্র দিয়া না যায় এমত কোন বৃত্তস্থ সরল রেখাকে যদি দ্বিখণ্ড করে তবে লম্বভাবে দ্বিখণ্ড করিবে, এবং যদি লম্বভাবে ছেদ করে তবে দ্বিখণ্ড করিবে। Take (1.3.) E the centre of the circle, and join EA, EB. Then, because AF is equal to FB, and FE common to the two triangles AFE, BFE, there are two sides in the one equal to two sides in the other; but

the base EA is equal to the base EB; therefore the angle AFE is equal (8. 1.) to the angle BFE. And when a straight line standing upon another makes the adjacent angles equal to another, each of them is a right (7. Def. 1.) angle: Therefore each of the angles AFE, BFE is a right angle; wherefore the straight line CD, drawn through the



centre, bisecting AB, which does not pass through the centre, cuts AB at right angles.

Again, let CD cut AB at right angles; CD also bisects AB; that is, AF is equal to FB.


The same construction being made, because the radii EA, EB are equal to one another, the angle EAF is equal (5. 1.) to the angle EBF; and the right angle AFE is equal to the right angle BFE: Therefore, in the two triangles EAF, EBF, there are two angles in the one equal to two angles in the other; and the side EF, which is opposite to one of the equal angles in each, is common to both; therefore the other sides are equal (26. 1.); AF therefore is equal to FB. Wherefore, "if a straight line," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. \therefore AF=FB (by Hyp.), EF common to \triangle s AEF, EFB and AE = EB (11. Def. 1.) \therefore \angle AFE = \angle EFB \therefore CD is | to AB (7. Def. 1.)

Again, $\angle AFE = \angle EFB$ (10. Ax. 1.); $\angle EAF = \angle EBF$ (5. 1.) : AE = EB (11. Def. 1.); and EF common to $\triangle s$ AFE, EFB.: (26. 1.) AF = FB.

কথগ এক বৃত্ত, এবং গঘ সরল রেখা কেন্দ্র দিয়া আসিয়া, কেন্দ্র দিয়া না যায় এমত কথ রেখাকে চ বিন্তুতে দিখণ্ড করিতেছে। ইহা লম্বভাবেই দ্বিখণ্ড করিবে।

বৃত্তের কেন্দ্র ও নির্ণয় কর, ওক ওখ রেখা টান। তাহাতে কচ চখ সনান,ও ওচ কওচ ও খওচ ছুই তিভ্জের সামান্য বাহু, স্তুত্রাং



একটার ছুই বাছ ক্রমশ অন্যাটার ছুই বাছর সমান, এবং ঙক ভূমিও ঙখ ভূমির সমান, স্থতরাং (১। ৮) কচঙ কোণ খচঙ কোণের সমান। অপর এক সরলরেখা অন্য সরল রেখার উপর দাঁড়োইয়া সমীপস্থ কোণ সমান করিলে প্রত্যেকে সমকোণ হয় অতএব কচঙ ও খচঙ প্রত্যেকে সমকোণ, স্থতরাং কেন্দ্রগত গঘ কেন্দ্র দিয়া না যায় এমত কথ রেখাকে দ্বিধণ্ড করত লম্বভাবে ছেদ করিতেছে।

পুনশ্চ গঘ যেন কথ উপর লম্বভাবে পড়িতেছে। তাহাতে গঘ কথ রেখাকে দ্বিখণ্ড করিবে অর্থাৎ কচ চথ সমান।

পূর্ববং ক্ষেত্রের অঙ্কপাত হইলে ওক ও ওখ ছুই কর্কট রেখা সমান হওয়াতে ওকচ কোণ ওখচ সমান (১।৫), এবং কচঙ ও খচঙ সমকোণ হওয়াতে পরস্পার সমান, স্মৃতরাং ওকচ ও ওখচ ছুই ত্রিভুজে একটীর ছুই কোণ ক্রমশ অন্যটীর ছুই কোণের সমান এবং সমানহ কোণের সম্মুখন্থ বাহু ওচ উভয় ত্রিভুজের সামান্য, স্মৃতরাং অন্যান্য বাহুও সমান (১। ২৬), অতএব কচ খচ সমান। এই রূপে কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

সং উ.। .. কচ = থচ (কল্লনা), ওচ, কণ্ডচ ও ওচথ

ক্রিভুজের সামান্য, এবং কণ্ড = ওথ (১। ১১) .. ∠কচও

= ∠ওচথ .. গঘ, কথ উপর \(\) (১। ৭ সং) । পুনশচ ∠কচও

= ∠ওচথ (১। ১০ খ. সা.), ∠ওকচ = ∠ওথচ (১। ৫) ...


কণ্ড = খণ্ড (১। ১১ সং), এবং ওচ, কচঙ ও ওচথ ক্রিভুজের
সামান্য .. (১। ২৬) কট = চথ।

PROP. IV. THEOR.

If, in a circle, two straight lines cut one another, in a point which is not the centre, they cannot bisect each other.

Let ABCD be a circle, and AC, BD two straight lines in it, which cut one another in a point E, which is not the centre: AC, BD do not bisect one another. For, if possible, let AE be equal to EC, and BE to

ED: If one of the lines pass through the centre, it is plain that it cannot be bisected by the other, which does not pass through the centre. But if neither of them pass through the centre, take (1.3.) F the centre of the circle, and join EF: and because FE, a straight line through the centre, bisects another AC, which does not pass through the centre, it must cut it



at right (3. 3.) angles; wherefore FEA is a right angle. Again, because the straight line FE bisects the straight line BD, which does not pass through the centre, it must cut it at right (3. 3.) angles; wherefore FEB is a right angle: and FEA was shown to be a right angle; therefore FEA is equal to the angle FEB, the less to the greater, which is impossible; therefore AC, BD do not bisect one another. Wherefore, "if in a circle" &c. Q. E. D.


Sym. Dem. If AC, BD bisect each other then FEA is a rt. \angle (3. 3.) So also FEB is a rt. \angle (3. 3) ... \angle EFA = \angle FEB (10. Ax. 1.) which is impossible (9. Ax. 1.) ... AC and BD do not bisect one another.

৪ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্তের মধ্যে যদি ছুই সরল রেখা পরস্পরকে কেন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন বিন্দুতে ছেদ করে ভবে তাহারা পরস্পরকে দ্বিখণ্ড করিতে পারে না।

কথগদ এক বৃত্ত এবং কগ খঘ
তন্মধ্যস্থ ছই সরল রেখা কেন্দ্র ভিন্ন চ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে। কগ ও খঘ পরস্পরকে দ্বিশু করে না।

যদিস্যাৎ সাধ্য হয় তবে কণ্ড গুগ সমান ও খণ্ড গুঘ সমান হউক। যদি ঐ চুই রেখার কোনটা কেন্দ্র



দিয়া যায় তবে স্পান্ত দেখা যাইতেছে যে তাহা অন্য রেখাতে দিখণ্ডিত হইতে পারেনা কেননা সে কেন্দ্র দিয়া যায় না, আর যদি কোনটা কেন্দ্র দিয়া না যায় তবে চ কেন্দ্র নির্ণয় করিয়া (৩। ১) চ ও সংযুক্ত কর। অপর ওচ কেন্দ্র দিয়া আদিয়া কেন্দ্র দিয়া না যায় এমত কগ রেখাকে বিখণ্ড করাতে (৩। ৩) তাহাকে লম্বভাবে ছেদ করিবে, স্মতরাং চঙক এক সমকোণ। এবং ওচ সরল রেখা কেন্দ্র দিয়া না যায় এমত খঘরেখাকে দিখণ্ড করাতে তাহাকেও লম্ব ভাবে ছেদ করিবে, স্মতরাং চঙ্গুথ এক সমকোণ। আর চঙক ও সমকোণ হওয়াতে চঙক ও চঙ্গুথ এক সমকোণ। আর চঙক ও সমকোণ হওয়াতে চঙক ও চঙ্গুথ পরস্পার সমান কিন্তু লঘুতর বৃহত্তরের সমান হইতে পারে না স্মতরাং কগ খঘ পরস্পারকে দিখণ্ড করে না। অতএব বৃত্তের মধ্যে, ইত্যাদি।

সং উ.। কণ খঘ যদি পরস্পারকে দ্বিখণ্ড করে তবে চঙক এক সম ∠ (৩।৩) তদ্ধপ চঙ্গ ও সম ∠ (৩।৩) ∴ ∠চঙক == ∠চঙ্গ (১। ১০ স্ব. সা.) ইহা অসাধ্য (১। ৯ স্ব. সা.) ∴ কণ খঘ পরস্পারকে দ্বিগণ্ড করে না।


PROP. V. THEOR.

If two circles cut one another, they cannot have the same centre.

Let the two circles ABC, CDG cut one another in the points B, C; they have not the same centre.

For, if it be possible, let E be their centre; join

EC, and draw any straight line EFG meeting the circles in F and G; and because E is the centre of the circle ABC, CE is equal to EF: Again, because E is A the centre of the circle CDG, CE is equal to EG: but, CE was shown to be equal to EF, therefore EF is equal to EG, the less to



the greater, which is impossible: therefore E is not the centre of the circles ABC, CDG. Wherefore, "if two circles," &c. Q. E. D.


Sym. Dem. If possible let E be the centre of both \bigcirc s \therefore CE = EF (11. Def. 1.) and also to EG \therefore EF = FG which is impossible (9. Ax. 1.) \therefore E is put the centre of both.

PROP. VI. THEOR.

If two circles touch one another internally, they cannot have the same centre.

Let the two circles ABC, CDE, touch one another internally in the point C; they have not the same centre.

For, if they have, let it be F; join FC, and draw any straight line FEB meeting the circles in E and B; and because F is the centre of the circle ACB, CF is equal to FB;




৫ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ছুই বৃত্ত পরস্পারকে ছিন্ন করিলে উভয়ের কেন্দ্র এক হুইতে পারে না।

কখগ ও গঘছ ছই বৃত্ত গ ও খ বিন্দুতে পরস্পারকে ছিন্ন করুক। উভয়ের কেন্দু এক হইবে না।

যদিস্যাৎ হইতে পারে তবে ও উভয়ের কেন্দু হউক। ও গ সংযুক্ত কর এবং উভয় বৃত্তের উপর চ ও ছ বিন্দুতে পড়ে এমত কোন সরল রেখা ওচছ



টান। অপর কখগ বৃত্তের কেন্দ্র ও হওয়াতে ওগ ও ওচ পরস্পর সমান এবং গঘছ বৃত্তের কেন্দ্র ও হওয়াতে ওগ ও ওছ পরস্পর সমান। আর ওগ ওচ সমান উপপন্ন হইয়াছে, স্থতরাং ওচ ও ওছ পরস্পর সমান। কিন্তু লঘুতর বৃহত্তরের সমান হইতে পারে না, অতএব ও কথগ ও গঘছ উভয় বৃত্তের কেন্দ্র নহে। এই রূপে তুই বৃত্ত, ইত্যাদি।


সং উ.। যদি সাধ্য হয় তবৈ ও উভয়ের কেন্দু কল্পনা কর ∴ গও — ওচ (১। ১১ সং) এবং ওছ — গও ∴ ওচ — ওছ ইহা অসাধ্য (১। ৯ স্ব. সা.) ∴ চ উভয় ⊙ কেন্দু নহে।

৬ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ছুই বৃত্ত পরস্পরকে অন্তরে স্পর্শ করিলে উভয়ের কেন্দ্র এক হুইতে পারে না।

কখন ও গঘঙ ছুই বৃত্ত গ বিন্দুতে পরস্পরকে অন্তরে স্পর্শ করুক। তাহাদের উভয়ের কেন্দ্র এক হইবে না।

কেননা যদিগ্যাৎ হইতে পারে ৃতবে চ উভয়ের কেন্দ্র হউক। চ



also, because F is the centre of the circle CDE, CF is equal to FE: but CF was shown to be equal to FB; therefore FE is equal to FB, the less to the greater, which is impossible; wherefore F is not the centre of the circles ABC, CDE. Therefore, "if two circles," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. If possible, let F be the centre of both $\odot s$. CF = FE (11. Def. 1.) and also to FB. FE = FB which is impossible (9. Ax. 1.) F is not the centre of both $\odot s$.

PROP. VII. THEOR.

If any point be taken in the diameter of a circle, which is not the centre, of all the straight lines which can be drawn from it to the circumference, the greatest is that in which the centre is, and the other part of that diameter is the least; and, of any others, that which is nearer to the line passing through the centre is always greater than one more remote from it: And from the same point there can be drawn only two straight lines that are equal to one another, one upon each side of the shortest line.

Let ABCD be a circle, and AD its diameter, in which let any point F be taken which is not the centre: let the centre be E; of all the straight lines FB, FC, FG, &c. that can be drawn from F to the circumference, FA is the greatest and FD, the other part of the diameter AD, is the least: and of the others, FB is greater than FC, and FC than FG.

Join BE, CE, GE; and because two sides of a triangle are greater (20. 1.) than the third, BE, EF are greater than BF; but AE is equal to EB; therefore AE and EF, that is, AF is greater than BF; again, because BE is equal to CE, and FE com-

গ সংযুক্ত কর এবং ও ও থ বিল্কুতে উভয় বৃত্তের উপর পড়ে এমত কোন সরল রেখা চঙখ টান। কখগ বৃত্তের কেন্দ্র চ হওয়াতে চগ চখ সমান, এবং গঘও বৃত্তের কেন্দ্র চ হওয়াতে চগ চঙ সমান, আর চগ চখ সমান হওয়াতে চঙ চখ সমান, কিন্দ্র লঘ্তর বৃহত্তরের সমান হইতে পারে না, স্থতরাং চ কথগ ও গঘঙ উভয় বৃত্তের কেন্দ্র নহে। অতএব ছুই বৃত্ত, ইত্যাদি।

সং উ.। যদি সাধ্য হয় তবে চ উভয়ের কেন্দ্র হউক। গচ == ৩চ (১। ১১ সং) এবং খচ == গচ ∴ ৩চ == খচ ইহা অসাধ্য (১। ৯ স্ব. সা.) ∴ চ উভয় ⊙ কেন্দ্র নহে।


৭ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্তের ব্যাদেতে কেন্দু ভিন্ন অন্য কোন বিন্তুর নির্দেশ করিলে তথা হইতে পরিধি পর্যান্ত যত সরল রেখা টানা যায় তাহাদের সর্বাপেকা যাহাতে কেন্দু আছে সেই রেখা বৃহত্তন হইবে, এবং ঐ ব্যাদের অন্য অংশ সর্বাপেকা লঘুতম হইবে, আর অন্যান্য রেখার মধ্যে যাহাতে কেন্দু আছে তাহার নিকটতর রেখা সর্বাদা দূরতর হইতে বৃহৎ হইবে, আর ঐ এক বিন্তু হইতে লঘুতম রেখার প্রত্যেক পার্শ্বে একটা করিয়া কেবল ছই সরল রেখা পরস্পর সমান হইয়া অন্ধিত হইতে পারে।

কথগঘ এক বৃত্ত, তাহার কঘ ব্যাসে কেন্দু ভিন্ন অন্য এক বিন্দু চ লওয়া যাউক, এবং ও কেন্দু হউক। চথ, চন্ন, চছ ইত্যাদি যত সরল রেখা চ হইতে পরিধি পর্যান্ত টানা যায় তাহাদের মধ্যে চক বৃহত্তম হইবে, এবং কঘ ব্যাসের অন্যাংশ চঘ লঘুতম হইবে, আর অন্যান্য রেখার মধ্যে চথ চগ হইতে বৃহত্তর এবং চগ চছ হইতে বৃহত্তর হইবে।

े খঙ, গঙ, ছঙ, রেখাটান। অপর (১। ২০) ত্রিভুজের ছই বাছ তৃতীয় বাহু হইতে বৃহত্তর হওয়াতে খঙ ঙচ একত্র খচ হইতে বৃহত্তর, আর কঙ ঙখ সমান হওয়াতে কঙ ও ঙচ যোগ অর্থাৎ mon to the triangles BEF, CEF, the two sides BE, EF are equal to the two CE, EF; but the angle BEF is greater than the angle CEF; therefore the base BF is greater (24. 1.) than the base FC; for the same reason, CF is greater than GF. Again, because


GF, FE are greater (20. 1.) than EG, and EG is equal to ED; GF, FE are greater than ED, take away the common part FE, and the remainder GF is greater than the remainder FD, therefore FA is the greatest, and FD the least of all the straight lines from F to the circumference; and BF is greater than CF, and CF than GF.



Also, there can be drawn only two equal straight lines from the point F to the circumference, one upon each side of the shortest line FD: at the point E in the straight line EF, make (23. 1.) the angle FEH equal to the angle GEF, and join FH: Then because GE is equal to EH, and EF common to the two tris angles GEF, HEF: the two sides GE, EF are equal to the two HE, EF; and the angle GEF is equal to the angle HEF; therefore the base FG is equal (4, 1.) to the base FH: but besides FH, no straight line can be drawn from F to the circumference equal to FG; for, if there can, let it be FK; and because FK is equal to FG, and FG to FH, FK is equal to FH; that is, a line nearer to that which passes through the centre, is equal to one more remote, which is impossible. Therefore, "if any point be taken," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. BE = AE \therefore BE + EF = AE + EF = AF; BE + EF \nearrow BF (20. 1.) \therefore AF \nearrow BF Again BE = CE, EF common to \triangle s BEF, CEF but \angle BEF \nearrow \angle CEF \therefore (24. 1.) BF \nearrow CF. Similarly CF

কচ, খচ হইতে বৃহত্তর। এবং খণ্ড
পণ্ড সমান, এবং ওচ খণ্ডচ ও গণ্ডচ
ক্রিলুক্তের সামান্য বাহু, আর খণ্ডচ
কোণ গণ্ডচ হইতে অধিক হওয়াতে
(১। ২৪) থচ ভূমি গচ ভূমি হইতে
বৃহত্তর হইবে। ঐ কারণে গচ
চছ হইতে বৃহত্তর। অপর চছ
ও চণ্ড একত্র ওছ হইতে বৃহত্তর



(১। ২০), এবং ওছ ওঘ সমান, একারণ চছ ও ওচ একত্র ওঘ হইতে বৃহত্তর স্ক্তরাং সামান্য অংশ ওচ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট চছ চঘ হইতে বৃহত্তর হইবে। অতএব চ হইতে পরিধি পর্যান্ত যাবদীয় রেখার মধ্যে কচ বৃহত্তম ও চঘ লঘুত্ম এবং খচ, গচ হইতে, ও গচ, চছ হইতে বৃহত্তর।

পুনশ্চ চ বিন্দু হইতে চঘ লঘুতম রেখার প্রত্যেক পার্শ্বে একটা করিয়া কেবল ছই সরল রেখা পরস্পার সমান হইয়া অঙ্কিত হইতে পারে। ওচ রেখার ও চিহ্নেতে চঙজ কোণ ছঙচ সমান করিয়। (১। ২৩) আঁকিয়া চ জ সংযুক্ত কর। অতএব ছঙ ওজ সমান, এবং ওচ ছঙচ ও জওচ উভয় বিভুজের সামান্য বাহু হওয়াতে ছঙ ওচ ছুই বাহু জও ওচ ছুএর সমান, এবং ছঙচ কোণ জওচ কোণের তুল্য, স্মৃতরাং (১। ৪) চছ্ ভূনি চজ ভূমির সমান। অপর চজ ভিন্ন অন্য কোন রেখা চহুতে পরিধি পর্যান্ত চছ সমান টানা যায় না, যদি বল টানা যায় ভবে চট তৎসমান হউক, তাহাতে চট চছ সমান, এবং চছ চজ সমান হওয়াতে চট চজ সমান হইবে, কিন্তু পূর্বের দশিত হইয়াছে যে কেন্দুগত রেখার নিকটতর রেখা দূরতরের সমান হইতে পারে না স্মৃতরাং চট চছ সমান নহে। অতএব, বৃত্তের ব্যাসেতে ইত্যাদি।

े সং উ.। খণ্ড — কণ্ড :: খণ্ড + ওচ — কণ্ড + ওচ — কচ। খণ্ড + ওচ ৮ খচ (১।২০) :: কচ ৮ খচ। অপর খণ্ড — গণ্ড, ওওচ, গ্লণ্ডচ ও গণ্ডচ বিভূক্তের সামান্য বাহু, এবং 7 GF. Moreover, GF + FE7 GE (20.1.) \therefore GF + FE7 ED or EF + FD \therefore GF7 FD.

Again :: GE = EH and EF common to \triangle s GEF, HEF and \angle GEF = \angle FEH (by constr.) :: GF = FH (4. 1.) No other line can be = GF. If possible let FK = GF :: FK = FH. This is impossible from the above demonstration.

PROP. VIII. THEOR.

If any point be taken without a circle, and straight lines be drawn from it to the circumference, whereof one passes through the centre; of those which fall upon the concave circumference the greatest is that which passes through the centre; and of the rest, that which is nearer to that through the centre is always greater than the more remote: But of those which fall upon the convex circumference, the least is that between the point without the circle, and the diameter; and of the rest, that which is nearer to the least is always less than the more remote: And only two equal straight lines can be drawn from the point unto the circumference, one upon each side of the least.

Let ABC be a circle, and D any point without it, from which let the straight lines DA, DE, DF, DC be drawn to the circumference, whereof DA passes through the centre. Of those which fall upon the concave part of the circumference AEFC, the greatest is AD, which passes through the centre; and the line nearer to AD is always greater than the more remote, viz. DE than DF, and DF than DC: but of those which fall upon the convex circumference HLKG, the least is DG, between the point D and the diameter AG; and the nearer to it is always less than the more, remote, viz. DK than DL, and DL than DH.

Take (1.3.) M the centre of the circle ABC, and join ME, MF, MC, MK, ML, MH: And because AM


৮ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্তের বাহিরে কোন বিন্তুর নির্দেশ করিয়া তথা হইতে পরিধি পর্যন্ত কএক সরল রেখা টানিলে, এবং তাহাদের একটা কেন্দু দিয়া গেলে, যেং রেখা পরিধির অন্তর্দিকে পড়িবে তাহার নধ্যে ঐ কেন্দুগত রেখা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্ত্বন, এবং অন্যান্যের মধ্যে কেন্দুগতের নিকটতর রেখা সর্ব্বত্তি দূরতর হইতে বৃহৎ; কিন্তু যেই রেখা পরিধির বহির্দিকে পড়ে তাহার নধ্যে ঐ বহিন্দুরিন্তুর এবং ব্যাসের মধ্যন্ত রেখা সর্বাপেক্ষা লঘুতন, এবং অন্যান্য রেখার মধ্যে এই লঘুতমের নিকটতর রেখা দূরতর হইতে স্থান; আর ঐ বিন্তু হইতে লঘুতমের প্রত্যেক পার্শ্বে একটা করিয়া কেবল ছই সরল রেখা পরস্পর সমান করিয়া টানা যাইতে পারে।

কথগ এক বৃত্ত, ঘ ইহার বহিস্থ চিহ্ন, তথা হইতে ঘক, ঘঙ, ঘচ, ঘগ, এই রেখা পরিধি পর্যান্ত টান, তাহার মধ্যে ঘক কেন্দু দিয়া যাউক। কঙচগ পরিধির অন্তর্দিকে যেহ রেখা পড়ে তাহার মধ্যে কেন্দুগত কঘ বৃহত্তম, এবং কঘ রেখার নিকটতর রেখা সর্বাত্ত বৃহৎ; কিন্তু জঠটছ পরিধির বহিদিকে যেহ রেখা পড়ে তাহাদের মধ্যে ঘ বিন্তু ও কছ ব্যাসের মধ্য ঘছ লঘুতম, আর ইহার নিকটতর রেখা সর্বাত্ত লঘু অর্থাৎ ঘট, ঘঠ হইতে, এবং ঘঠ, ঘজ হইতে লঘু।

কথণ বৃত্তের কেন্দ্র• ড নির্ণয় (৩। ১) করিয়া ডঙ, উচ, ডগ,

is equal to ME, if MD be added to each, AD is equal to EM and MD: but EM and MD are greater (20. 1.) than ED; therefore also AD is greater than ED. Again, because ME is equal to MF, and MD common to the triangles EMD. FMD: EM, MD are equal to FM, MD; but the angle EMD is greater than C the angle FMD; therefore the base ED is greater (24. 1.) than the base FD. In like manner, it may be shown that FD is greater than CD. Therefore DA is




the greatest; and DE greater than DF, and DF than DC.

And because MK, KD are greater (20. 1.) than MD, and MK is equal to MG, the remainder KD is greater than the remainder GD. that is GD is less than KD: And because MK, DK are drawn to the point K within the triangle MLD from M, D, the extremities of its side MD; MK KD are less (21. 1.) than ML, LD; whereof MK is equal to ML; therefore the remainder DK is less than the remainder DL: In like manner, it may be shown, that DL is less than DH: Therefore DG is the least, and DK less than DL, and DL than DH.

Also, there can be drawn only two equal straight lines from the point D to the circumference, one upon each side of the least: at the point M, in the straight line MD, make the angle DMB equal to the angle DMK; and join DB; and because in the triangles KMD, BMD, the side KM, is equal to the side BM, and MD common to both, and also the angle KMD equal to the angle BMD, the base DK is equal (4.1.) to

ডজ, ডঠ, এই ২ রেথা টান।
অপর কড ডঙ সমান, তাহাদের
প্রত্যেকে ডঘ যোগ করিলে
কঘ, ওড ও ডঘ ছএর তুল্য
হইবে, পরন্ত ওড ও ডঘ একত
ওঘ হইতে বৃহৎ (১। ২০) স্থতরাং কঘ ওঘ হইতে বৃহত্র।
পুনশ্চ, ডও ডচ সমান ও ডঘ
ওচঘ ও চডঘ তিভুজের সামান্য
বাহু হওয়াতে ওড ও ডঘ ক্রমশ
ডচ ও ডঘ সমান, কিন্তু ওডঘ
কোণ চডঘ হইতে অধিক, স্থতরাং ওঘ ভূমি চঘ ভূমি হইতে
বৃহত্তর (১। ২৪), এবং ঐ



ক্লপৈ ইহাও উপপন্ন হইতে পারে যে চঘ গঘ হইতে বৃহত্তর। অতএব কঘ সর্কাপেকা বৃহত্তম, ও ঘঙ, ঘচ হইতে, ও ঘচ, ঘগ হইতে বৃহত্তর।

অপর ডট টঘ একত্র ডঘ হইতে বৃহত্তর (১। ২৪), এবং ডট ডছ সমান, অতএব সমানহ অংশ বিয়োগে অবশিই টঘ, ছঘ হইতে বৃহত্তর, অর্থাৎ ছঘ, টঘ হইতে ন্যান। এবং ডঠঘ ত্রিভুজের মধ্যে ডঘ বাছর ছই প্রান্ত ড ও ঘ হইতে ট বিন্তু পর্যান্ত ডট ঘট টানা গিয়াছে এনিমিত্রে (১। ২১) ডট ও টঘ একত্র ডঠ ও ঠঘ হইতে ন্যান, ইহার মধ্যে ডট ডঠ সমান, স্থতরাং অবশিই ঘট অবশিই ঘঠ হইতে ন্যান। এইরপে ইহাও উপপন্ন হইবে যে ঘঠ ঘজ হইতে ন্যান। অতএব ঘছ সর্ম্ব লঘুতন এবং ঘট, ঘঠ হইতে, ও ঘঠ, ঘজ হইতে লঘু। পুনশ্চ, ঘ বিন্তু হইতে ঘছ লঘুতন রেখার প্রত্যেক পার্শ্বে একটা করিয়া পরিধি পর্যান্ত কেবল ছই সরল রেখা পরস্পর সমান হইয়া অক্ষিত হইতে পারে। ডঘ সরল রেখার ড বিন্দুতে ঘডখ কোণ ঘডট কোণের সমান করিয়া ঘ খ সংযুক্ত কর। টডঘ ও খডঘ ছই ত্রিভুজে টড বাছ খড বাছর সমান, ও

the base DB. But, besides DB, no straight line can be drawn from D to the circumference, equal to DK: for, if there can, let it be DN: then because DN is equal to DK, and DK equal to DB, DB is equal to DN; that is, the line nearer to DG, the least, equal to the more remote, which has been shown to be impossible. "If," therefore, "any point," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. EM = $\Lambda M \cdot ...$ EM + MD = ΛM + MD = ΛD ; EM + $MD \cdot ED$ (20. 1.) ... $\Lambda D \cdot D$ ED. Again EM = FM, and MD common to $\triangle S$ EMD, FMD, but $\angle EMD \cdot D \cdot D$ (24. 1.) ED $\cdot D$ FD. Similarly FD $\cdot D \cdot D$ CD. Moreover MK + KD $\cdot D$ MD or MG + GD (20. 1.) and MK = MG $\cdot D \cdot D$ GD or GD $\triangle D \cdot D$ Also MK + KD $\triangle D \cdot D$ ML + LD (21. 1.) and MK = ML $\cdot D \cdot D$ Similarly LD $\Delta D \cdot D$ HD.


Again MK = MB and DM common to $\triangle s$ KDM, BDM, and $\angle DMK = \angle DMB$ (by constr.) $\therefore KD = BD$ (4. 1.) No other line can be = KD; if possible let DN = KD $\therefore DN = BD$ which from the above demonstration is impossible.

PROP. IX. THEOR.

If a point be taken within a circle, from which more than two equal straight lines fall upon the circumference, that point is the centre of the circle.

Let the point D be taken within the circle ABC, from which more than two equal straight lines, viz. DA, DB, DC, fall on the circumference, the point D is the centre of the circle.

For, if not, let E be the centre, join DE, and produce it to the circumference in F, G: then FG is a diameter of the




ডঘ উভয়ের সামান্য, এবং উডঘ কোণ ও খডঘ কোণের সমান হওরাতে ঘট ভূমি ঘথ ভূমির সমান (১। ৪)। আরে ঘথ ভিন্ন অন্য কোন রেখা ঘ হইতে পরিধি পর্যান্ত ঘট সমান টানা যায় না। যদি বল টানা যায় ভবে ঘঢ তৎসমান হউক, ভাহাতে ঘঢ ঘট সমান, ও ঘট ঘথ সমান হওরাতে, ঘথ ঘট সমান হইবে, কিন্তু পূর্বের দর্শিত হইয়াছে যে ঘছ লঘুতমের নিকটতর রেখা দূরভরের সমান হইতে পারে না, স্কুভরাং ঘট ঘট সমান নহে। অভএব বৃত্তের বাহিরে, ইভ্যাদি।

সং উ.। ওড = কড \therefore ওড + ঘড = কড + ঘড = কঘ। ওচ + ঘড \nearrow ওঘ (১। ২০) \therefore কঘ \nearrow ওঘ। অপর ওচ = চড, এবং ঘড, ওডঘ ও চডঘ ত্রিভুজের সামান্য বাছ এবং \angle ওডঘ \nearrow \angle চডঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ (১। ২৪) ওঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ চঘ। ঐ রূপে চঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ গঘ। পুনশ্চ ডট + টঘ \nearrow ডঘ, অর্থাং ওছ + ছঘ (১। ২০), এবং ডট = ওচ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ উঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ ছঘ অর্থাং ছঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ টঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ উঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ উঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ উঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ উঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ উঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ উঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ ও উট = ডঠ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ উঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ ঠঘ। ঐ রূপে ঠঘ $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ ওছে। পুনশ্চ ডট = ডথ এবং ঘড, টঘড ও থঘড ত্রিভুজের সামান্য বাছ ও $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ ঘড এ এবং ঘড, ত্রম্ভ ও থঘড ত্রিভুজের সামান্য বাছ ও $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ এঘড এবং ঘড, ত্রম্ভ ও গ্রম্ভ তিবে ঘড = টঘ, $\overset{\bullet}{\cancel{-}}$ ঘড = খঘ ইহা পূর্ম্বোক্ত উপপত্তিতে অসাধ্য।

৯ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্তের মধ্যে কোন বিন্দু লইলে তথা হইতে যদি ছুএর অধিক সরল রেখা পরিধি পর্যান্ত পরস্পার সমান হইয়া পড়িতে পারে তবে সেই বিন্দুই কেন্দ্র।

কখগ বৃত্তের মধ্যে ঘ বিন্দু
লও, তথা হইতে ছএর অধিক
রেখা অর্থাৎ ঘক, ঘথ, ঘগ,
পরস্পর সমান হইয়া পরিধির
উপর পড়ুক ভাহাতে ঘ বিন্দু
বৃত্তের কেন্দ্র ইইবে।



circle ABC: And because in FG, the diameter of the circle ABC, there is taken the point D which is not the centre, DG is the greatest line from it to the circumference, and DC greater (7 3.) than DB, and DB than DA; but they are likewise equal, which is impossible: Therefore E is not the centre of the circle ABC: In like manner, it may be demonstrated, that no other point than D is the centre. Wherefore, "if a point be taken," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. If D be not the centre, let it be E

∴ DG¬ DC and DC¬ DB and BB¬ DA (7.3.) But
DC = DB = DA (by Hyp.) which is impossible.


∴ E is not the centre, nor any other but D.

PROP. X. THEOR.

One circle cannot cut another in more than two points.

If it be possible, let the circumference FAB cut the circumference DEF in more than two points, viz. in B, G. F; take the centre K of the circle ABC, and join KB, KG, KF: and because within the circle

DEF the point K is taken, from which more than two equal straight lines, viz KB, KG, KF, fall on the circumference, DEF, the point K is (9.3.) the centre of the circle DEF; but E K is also the centre of the circle ABC; therefore the same point is the centre of two circles that cut one another, which is impossible (5.3.) Therefore



"one circumference of a circle cannot cut another in more than two points." Q. E. D.

Sym. Dem. If possible, then :: K is the centre of the \odot ABC, BK = GK = KF :: K is also the centre of the \odot DEF which is impossible (5.3.)


কেননা যদি না হয় তবে ও কেন্দ্র কল্পনা করিয়া ঘ ও সংযুক্ত কর, এবং পরিধিস্ত চ ছ পর্যান্ত ঘণ্ড বৃদ্ধি কর, তাহাতে চছ কথগ বৃত্তের ব্যাস হইবে। অপর কথগ বৃত্তের চা ব্যাসে কেন্দ্র ভিন্ন ঘ বিন্তু লওয়াতে ঘছ তথা হইতে পরিধি পর্যান্ত বৃহত্তন রেখা হইবে (১।৭), এবং ঘণ ঘথ হইতে বৃহত্তর ও ঘথ ঘক হইতে বৃহত্তর। কিন্তু তাহাদিগকে সমান করিয়া কল্পনা করা গিয়াছে স্কুতরাং ইহা অসাধ্যা অতএব বৃত্তের কেন্দু ও নহে। এই রূপে ইহাও পারে না। অতএব বৃত্তের মধ্যা, ইত্যাদি।

সং উ.। যদিগাং ঘ কেন্দ্র না হয় তবে ও হউক .. ঘছ সুগঘ, গঘ সুখঘ, ও খঘ সুক্য (৩। ৭) কিন্তু গঘ == খঘ = ক্য (কল্পনা) ইচা অসাধ্য .. ও কেন্দ্র নহে এবং ঘ ভিন্ন অন্য কোন বিন্দু ও হইতে পারেনা।

১০ প্রতিক্সা—উপপাদ্য।

এক বৃত্ত অন্য বৃত্তকে ছুএর অধিক বি**ন্তৃতে ছিল্ল করিতে** পারে না।

যদিস্যাৎ করিতে পারে তবে কথগ পরিধি ঘণ্ডচ পরিধিকে তুএর অধিক খ,ছ,চ বিন্দুতে ছিন্ন করুক। কথগ বৃত্তের কেন্দু ট নির্ণয় কর এবং টথ, টছ, টচ রেখা টান তাহাতে ঘণ্ডচ বৃত্তের মধ্যে ট বিন্দু হইতে তুএর অধিক সরল রেখা অর্থাৎ টথ, টছ, টচ ঘণ্ডচ পরিধি পর্যান্ত পরস্পর



সমান হওয়াতে (৩।৯) ট বিন্দু ঘণ্ডচ বৃত্তের কেন্দ্র হইবে।
কিন্তু ট কথণ বৃত্তেরও কেন্দ্র স্মৃত্যাং পরস্পর ছিন্ন করে এমত
ছই বৃত্তের কেন্দ্র এক হয়, ইহা অসাধ্য (৩।৫)। অতএব এক
বৃত্ত পরিধি অন্যকে ত্বএর অধিক বিন্দুতে ছিন্ন করিতে পারেনা।
সং উ। যদি সাধ্য হয় তবে ট কথণ ① কেন্দ্র হউক .. থট
= ছট = টচ .. ট ঘণ্ডচ ① কেন্দ্র, ইহা অসাধ্য (৩।৫)।


PROP. XI. THEOR.

If two circles touch each other internally, the straight line which joins their centres being produced, will pass through the point of contact.

Let the two circles ABC, ADE, touch each other internally in the point A, and let F be the centre of the circle ABC, and G the centre of the circle ADE: the straight line which joins the centres F, G, being produced, passes through the point A.

For, if not, let it fall otherwise, if possible, as FGDH, and join AF, AG: And because AG, GF are greater (20.

1.) than FA, that is, than FH, for FA is equal to FII, being radii of the same circle; take away the common part FG, and the remainder AG is greater than the remainder GH. But AG is equal to GD, therefore, GD is greater than GH; and it is also less, which is impossible. Therefore, the straight line which joins the points F and G cannot fall otherwise than on the point A: that is it



on the point A; that is, it must pass through A. Therefore, "if two circles," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. If possible, let it fall otherwise as FGDH; then $AG + GF_{7}$ AF (20.1), AF = FH (11. Def. 1.) \therefore $AG + GF_{7}$ FH or $HG + GF \therefore$ AG_{7} GH. But $AG = GD \therefore GD_{7}$ GH which is impossible (9. Ax. 1.)

PROP. XII. THEOR.


If two circles touch each other externally, the straight line which joins their centres will pass through the point of contact.

Let the two circles ABC, ADE touch each other externally in the point A; and let F be the centre of the circle ABC, and G the centre of ADE: The straight

১১ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

চুই বৃত্ত পরস্পর অন্তরে স্পর্শ করিলে তাহাদের কেন্দু সং-যোজক রেথা বৃদ্ধি পাইলে ঐ স্পর্শ চিহ্ন দিয়া যাইবে।

কথগ ও কঘও ছই বৃত্ত ক বিন্দুতে পরস্পর অন্তরে স্পর্শ করুক, এবং চকথগ বৃত্তের কেন্দ্র হউক ও ছ কঘও বৃত্তের কেন্দ্র হউক। চছ ছুই কেন্দ্রের সংযো-জক রেখা বৃদ্ধি পাইলে ক বিন্দ্র দিয়া বাইবে। যদি ঐ বিন্দ্র দিয়া না যায় তবে তাহা অন্য প্রকারে



চছঘজ ন্যায় পজুক। কচ কছ্ টান, অপর কছ ছচ একত্র চক হইতে বৃহত্তর (১।২০), স্থৃতরাং চজ হইতেও বৃহত্তর, কেননা চক চজ উভরে এক বৃত্তের কর্কট রেখা হওয়াতে পরস্পার সমান। তবে সামান্য অংশ চছ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট কছ ছজ হইতে বৃহত্তর হইবে। অপর কছ ছঘ সমান, স্থৃতরাং ছঘ ছজ হইতে বৃহত্তর, কিন্তু ইহা অসাধ্য কেননা ছঘ লঘুতর (১।৯ স্ব. সা.)। স্থৃতরাং চও ছ ছই চিহ্ন সংযোজক সরলরেখা ক বিন্তু ভিন্ন অন্যত্র পড়িতে পারে না অর্থাৎ ইহা অবশ্য ক দিয়া যাইবে। অতএব ছই বৃত্ত, ইত্যাদি।

সং উ। যদি সাধ্য হয় তবে প্রকারান্তরে পড়ুক যথা চছ্
যজ। কছ + চছ ৴ কচ (১। ২০), কচ == চজ (১। ১১ সং) ..
কছ + চছ ৴ চজ ∴ কছ ৴ ছজ, কিন্তু কছ == ছ্য ∴ ছ্য ৴
ছজ, ইহা অসাধ্য (১। ৯ শ্ব. সা.)।


১২ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

তুই বৃত্ত পরস্পর বাহিরে স্পর্শ করিলে তাহাদের কেব্রু সংযোজক রেথা বৃদ্ধি পাইলে ঐ স্পর্শ চিহ্ন দিয়া যাইবে।

কথণ কঘও ছুই বৃত্ত ক বিন্দুতে পরস্পার বাহিরে স্পার্শ করুক, এবং চ কথণা বৃত্তের ও ছ কঘও বৃত্তের কেন্দ্র line which joins the points F, G, must pass through the point of contact A.

For, if not, let it pass otherwise, if possible, as FCDG, and join FA, AG: and because F is the centre of the cir-

cle ABC, AF is equal to FC: Also, because G is the centre of the circle ADE, AG is equal to GD. Therefore FA, AG are equal to FC, DG:



wherefore the whole FG is greater than FA, AG; but it is also less (20. 1.), which is impossible: Therefore the straight line which joins the points F, G, cannot pass otherwise than through the point of contact Λ ; that is, it passes through A. Therefore, "if two circles" &c. Q. E. D.

Sym. Dem. If possible, let it fall otherwise as FCDG. Then F being the centre of the \bigcirc ABC, AF° = FC. Similarly AG = GD \therefore FA + AG = FC + DG \therefore FG + CD + DG or the whole FG7 FA + AG which is impossible (20. 1.)


PROP. XIII. THEOR.

One circle cannot touch another in more points than one, whether it touch it on the inside or outside.

For, if it be possible, let the circle EBF touch the circle ABC in more points than one, and first on the inside, in the points B, D; join BD, and draw (10, 11.1.) GH, bisecting BD at right angles: Therefore, because the points B, D, are in the circumference of each of the circles, the straight line BD falls within each (2.3.) of them; and therefore their centres are (Cor. 1.3.) in the straight line GII, which bisects BD

হউক। চ ছ সং-যোজক সরল রে-থা বৃদ্ধি পাইলে স্পর্শ চিহ্ন ক দিয়া যাইবে।

যদি এ চিহ্ন দিয়া না যায় তবে চগঘছ ন্যায় অন্য




প্রকারে যাউক। চক কছ টান. অপর কথগ বৃত্তের কেন্দু চ হওয়াতে কচ চগ সমান এবং কঘঙ বৃত্তের কেন্দু ছ হওয়াতে কছ ছঘ সমান, অতএব চক ও কছ, চগ ও ঘছ সহিত সমান স্থতরাং সমুদয় চছ, চক ও কছ হইতে বৃহত্তর, কিন্তু (১। ২০) তাহা লঘুতর ও বটে, অতএব ইহা অসাধ্য, স্থতরাং চ ছ ছই বিন্দু সংযোজক সরল রেখা স্পর্শ চিহ্ন ক দিয়া না গিয়া অন্য প্রকারে যাইতে পারে না, অর্থাৎ তাহা অবশ্য ক দিয়া যাইবে। অতএব ছই বৃত্ত, ইত্যাদি।

সং উ। যদি সাধ্য হয় তবে প্রকারাস্তরে পড়ুক যথা চগ ঘছ। চ কথগ⊙ কেন্দ্র হওয়াতে কচ == চগ। ঐ রূপে কছ == ছঘ ∴ চক + কছ == চগ + ঘছ ∴ চগ + গঘ + ঘছ অর্থাৎ সমুদ্য চছ > চক + কছ, ইহা অসাধ্য (১।২০)।

১৩ প্রতিজ্ঞা উপপাদ্য।

এক বৃত্ত অন্য বৃত্তকে একের অধিক বি**ন্দৃতে অন্তরে কিয়া** বাহিরে স্পর্শ করিতে পারে না।


যদি বল পারে, তবে ওখচ বৃত্ত কথগ বৃত্তকে একের অধিক বিন্দুতে স্পাশ করুক, প্রথমত যেন খ, ঘ, বিন্দুতে অন্তরে স্পাশ করিতেছে। খ ঘ সংযুক্ত কর এবং খঘ রেখাতে লম্বভাবে দিখণ্ড কারক ছজ রেখা টান (১। ১০ এবং ১১)। খ, ঘ, ছুই বিন্দু প্রত্যেক বৃত্তের পরিধিতে থাকাতে খঘ সরল রেখা প্রত্যেক বৃত্তের মধ্যে পূড়িতেছে (১। ২), স্কুত্রাং তাহাদের at right angles: Therefore GH passes through the point of contact (11.3.); but it does not pass through it, because the points B, D are without the straight



line GH, which is absurd: Therefore, one circle cannot touch another on the inside in more points than one.


Nor can two circles touch one another on the outside in more than one point: For, if it be possible, let the

circle ACK, touch the circle ABC in the points A, C, and join AC: Therefore, because the two points A, C, are in the circumference of the circle ACK, the straight line AC which joins them falls within (2.3.) the circle ACK: And the circle AKC is without the circle ABC; and therefore the straight line AC is also without ABC; but, because the points A, C. are in the circumference of the circle ABC, the straight line AC is within




(2.3.) the same circle, which is absurd: Therefore a circle cannot touch another on the outside in more than one point; and it has been shown, that a circle cannot touch another on the inside in more than one point. Therefore, "one circle," &c. Q. E. D.

কেন্দু সে রেখাতে আছে (৩।১ অফু.) কেননা ছজ, থঘ রেখাকে লয়ভাবে দ্বিখণ্ড করিতেছে, অতএব ছজ স্পর্শ চিহ্ন দিয়া যাইবে (৩। ১১), কিন্তু খ, ঘ দুই বিন্তু ছজ রেখার



বাহিরে থাকাতে তাহা স্পর্শ চিহ্ন দিয়া বাইতে পারে না স্কুতরাং এই ব্যভিচার দোষহেতু এক বৃত্ত অন্য বৃত্তকে একের অধিক বিন্তুতে অন্তরে স্পর্শ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এক বৃত্ত অন্য বৃত্তকে একের অধিক বিন্দুতে বাহিরেও স্পর্শ করিতে পারে না। যদি বল পারে তবে কগট বৃত্ত কথা বৃত্তকে ক, গ ছই বিন্দু কগট বৃত্তের পরিধিতে থাকাতে কগ রেখা কগট বৃত্তের মধ্যে পড়িবে (৩। ২) এবং কখা বৃত্ত কগট বৃত্তের বাহিরে থাকিবে, কিন্তু ক, গ ছই বিন্দু কথা বৃত্তের পরিধিতে আছে



এই হৈতুক কঁগও ঐ বৃত্তের মধ্যে পড়ে (৩। ২), ইহা অসাধ্য, অতএব এক বৃত্ত অন্য বৃত্তকে একের অধিক বিন্দুতে বাহিরে স্পর্শ করিতে পারে না এবং পূর্বে দর্শিত হইয়াছে যে এক বন্ত Sym. Dem. If ①s ABC, EBF touch one another internally in more points than one i. e. B, D, then BD must fall within each of them (2.3.) ... the centres of both ②s are in GH (cor. 1.3.) ... GH must pass through B, D, (11.3.) but it does not; ... the ③s cannot touch in more than one point.

Again; If ⊙s ACK, ABC touch one another externally in more points than one i. e. A, C, then AC is within ⊙ ACK and also within ⊙ ABC (2. 3.) and ∴ ⊙ ACK is without ⊙ ABC ∴ AC is without ⊙ ABC which is absurd; ∴ the ⊙s cannot touch externally in more than one point.


PROP. XIV. THEOR.

Equal straight lines in a circle are equally distant from the centre; and those which are equally distant from the centre, are equal to one another.

Let the straight lines AB, CD, in the circle ABDC, be equal to one another; they are equally distant from the centre.

Take E the centre (1.3) of the circle ABDC, and from it draw EF, EG, perpendiculars to AB, CD; join AE and EC. Then, because

join AE and EC. Then, because the straight line EF passing through the centre, cuts the straight line AB, which does not pass through the centre, at A right angles, it also bisects (3. 3.) it: Wherefore AF is equal to FB, and AB double of AF. For the same reason, CD is double of CG: But AB is equal to CD; therefore AF is equal to CG:



And because AE is equal to EC, the square of AE is equal to the square of EC: Now the squares of AF, FE are equal (47. 1.) to the square of AE, because the angle AFE is a right angle; and, for the like reason, the squares of EG, GC are equal to the square

অন্য বৃত্তকৈ একের অধিক বিন্দুতে অন্তরেও স্পর্শ করিতে। পারে না। অতএব এক বৃত্ত, ইত্যাদি।

সং উ.। যদি কখগ ও ওখচ ছুই⊙ একের অধিক খ, ঘ, বিন্দুতে অন্তরে স্পর্শ করে তবে খঘ প্রত্যেক ⊙ মধ্যে পড়িবে (৩। ১), ∴ ছুই ⊙ কেন্দ্র ছজ মধ্যে হুইবে (৩। ১০ অমু.) ∴ ছজ, খ, ঘ মধ্যদিয়া বাইবে (৩। ১১), কিন্তু তাহা নহে ∴ ঐ ছুই⊙ একের অধিক বিন্দুতে স্পর্শ করে না।


দিতীয়তঃ যদি কগট, কখগ ছুই⊙ একের অধিক ক, গ, বিন্তুতে বাহিরে স্পর্শ করে তবে কগ, কগট⊙ মধ্যে পড়িবে (১।২) এবং কখগ⊙ মধ্যেও পড়িবে। কিন্তু কগট⊙, কখগ⊙ বহিস্ত ∴ কগ, কখগ⊙ বহিস্ত, ইহা অসাধ্য ∴ ঐ ছুই⊙ একের অধিক বিন্তুতে বাহিরে স্পর্শ করে না।

১৪ প্রতিক্তা—উপপাদ্য।

বৃত্ত মধ্যস্থ যে২ সরল রেখা পরস্পার সমান তা**হারা কেন্দ্র** হউতে সমান২ দূরে থাকে; আর যাহারা কেন্দ্র হ**ইতে সমান** দূরস্থ তাহারা পরস্পার সমান।

িকথঘগ বৃত্তেতে কথ, গঘ সরল রেখা পরস্পর সমান আছে, তাহা-র। কেন্দ্র হইতে সমদূর হইবে।

কথঘণ বৃত্তের কেন্দ্র ও নির্ণয় কর
(৩।১), এবং তথা হইতে ওচ এবং
ওচ, কথ এবং গঘ রেখার উপর
লম্বভাবে টান। কও ও ওগ সংযুক্ত
কর, অপর ওচ বেখা কেন্দ্র দিয়া



আসিয়া কেন্দ্রগত নহে এমত কথ রেখার উপর লম্বভাবে পড়াতে (৩। ৩) তাহাকে দ্বিখণ্ড করিতেছে, স্মতরাং কচ চথ সমান, ও কথ, কচ রেখার দ্বিগুণ। ঐ কারণ গঘ, গছ রেখার দ্বিগুণ। এবং কথ গঘ সমান হওয়াতে কচ গছ সমান হইবে, আর কণ্ড ওগ সমান হওয়াতে কঙ সমচতুর্ভু জ ওগ সমচতুর্ভু জ সমান। অপর কচ ওচ স্মচতুর্ভু অকত্র কঙ সমচতুর্ভু জ of EC: Therefore, the squares of AF, FE are equal to the squares of CG, GE, of which the square of AF is equal to the square of CG, because AF is equal to CG; therefore the remaining square of FE is equal to the remaining square of EG, and the straight line EF is therefore equal to EG: But straight lines in a circle are said to be equally distant from the centre, when the perpendiculars drawn to them from the centre are equal (3. Def. 3.): Therefore AB, CD are equally distant from the centre.

Next. If the straight lines AB, CD be equally distant from the centre, that is, if FE be equal to EG, AB is equal to CD. For, the same construction being made, it may, as before, be demonstrated, that AB is double of AF, and CD double of CG, and that the squares of EF, FA are equal to the squares of EG, GC; of which the square of FE is equal to the square of EG, because FE is equal to EG; therefore the remaining square of AF is equal to the remaining square of CG; and the straight line AF is therefore equal to CG: But AB is double of AF, and CD double of CG: wherefore AB is equal to CD. Therefore, "equal straight lines," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. EF is \bot to AB \therefore AF = FB (3. 3.) and AB = 2AF. Similarly CD = 2CG. AB = CD. (Hyp.) \therefore AF = CG (7. Ax. 1.) AE = EC (11. Def. 1.) \therefore AE² = EC². Now AE² = AF² + FE² and EC² = CG² + EG² (47. 1.) \therefore AF² + FE² = CG² + EG². But AF = CG \therefore AF² = CG² \therefore EF² = EG² (3. Ax. 1.) \therefore EF = EG \therefore AB and CD are equidistant from the centre (3. Def. 3.)

Again, If AB and CD be equidistant from the centre, EF = EG (3. Def. 3.) It may be shown as before that AB = 2AF and CD = 2CG and $EF^2 + FA^2 = EG^2 + CG^2$. Now $EF^2 = EG^2 \cdot AF^2 = CG^2 \cdot AF = CG \cdot AB = CD$.

সমান (> 1 ৪৭) কেননা কচঙ এক সমকোণ। ঐ প্রকারে গুছ
ছগ সমচতুর্জ একত্র গঙ সমচতুর্জ সমান, অতএব কচ গুচ
সমচতুর্জ গছ ছঙ সমচতুর্জের সমান, ইহার মধ্যে কচ
সমচতুর্জ গছ সমচতুর্জ সমান; কেননা কচ গছ পরস্পর
সমান, স্বতরাং অবশিক্ত গুচ সমচতুর্জ ছঙ সমচতুর্জির
সমান, এবং তলিমিত্তে গুচ ছঙ ও সমান। অপর গে২ সরল
রেখার উপর কেন্দ্র ইতে সমান২ লম্বপাত হয় তাহাদিগকে
কেন্দ্র ইইতে সমদূর কহা যায় (৩। ৩ সং) স্বতরাং কখ, গ্য
কেন্দ্র ইইতে সমদূর।

পুনশ্চ, যদি কথ, গঘ রেখা কেন্দু হইতে সমদূর হয় অর্থাৎ যদি গুচ ও গুছ পরস্পার সমান হয় তবে কথা গঘও পরস্পার সমান, কেননা পূর্বাবৎ অস্কপাত করিলে দশিত হইতে পারে যে কথা কচ রেখার দিগুণ ও গঘ গছ রেখার দিগুণ, এবং গুচ কচ সমচতুর্ভু জ একতা গুছ গছ সমচতুর্ভু জের সমান, তাহার মধ্যে গুট সমচতুর্ভু জ গুছ সমচতুর্ভু জের সমান কেননা গুচ গুছ সমান, অতএব অবশিষ্ট কচ সমচতুর্ভু জ গছ সমচতুর্ভু জের সমান কেননা গুচ গুছ সমান, অতএব অবশিষ্ট কচ সমচতুর্ভু জ গছ সমচত্রভু জের সমান এবং তলিমিত্তে কচ রেখা গছ রেখার সমান, আর কথা কচ রেখার দিগুণ, স্থতরাং কথা ও গঘ পরস্পার সমান। অতএব বৃত্ত মধ্যক্ষ, ইত্যাদি।

मं छै.। इह ⊥ कथ ∴ कह = हथ (७। ७), ७ कथ =

>कह। ঐक्राल गंघ = २गंছ। कथ = गंघ (कल्लाना) ∴ कह

= गंছ (১। १ स. मा.) कंड = छगं (১। ১১ मर) ∴ कंड² =

छगं। अलात कंछ² = कह² + छह, धार धार छगं? = गंছ² +

उह² (১। ४१) ∴ कह² + छह² = गंছ² + छह²। किन्छ कह

गंছ ∴ कह² = गंছ² ∴ छह² = छहं (১। ७ स. मा.) ∴

उह = उह ∴ कथ धार गंघ किन्म इहेटि मममूत (७। ७ मर)।

लूनकह, यिन कथ ७ गंघ किन्म हहेटि मममूत इस उट्य छह

डह (১। ७ मर), श्रिंग मिर्गिंठ हहेटि शादि यि कथ =

२क्ड धार गंघ = २गंड धार छह² + कह² = छह² +

गंड²। अलात छह² = छह² ∴ कह² = गंड² ∴ कह = गंड


∴ कथ = गंघ।

PROP. XV. THEOR.

The diameter is the greatest straight line in a circle; and, of all others, that which is nearer to the centre is always greater than one more remote; and the greater is nearer to the centre than the less.

Let ABCD be a circle, of which the diameter is AD, and the centre E; and let BC be nearer to the centre than FG; AD is greater than any straight line BC which is not a diameter, and BC greater than FG.

From the centre draw EH, EK perpendiculars to BC, FG, and join EB, EC, EF; and because AE is equal to EB, and ED to EC, AD is equal to EB.



EC: But EB, EC are greater (20. 1.) than BC: wherefore, also AD is greater than BC.

And because BC is nearer to the centre than FG, EH is less (4. Def. 3.) than EK: but as was demonstrated in the preceding, BC is double of BH, and FG double of FK, and the squares of EH. HB are equal to the squares of EK, KF, of which the square of EH is less than the square of EK, because EH is less than EK; therefore the square of BH is greater than the square of FK, and the straight line BH greater than FK; and therefore BC is greater than FG.


Next, Let BC be greater than FG; BC is nearer to the centre than FG; that is, the same construction being made, EH is less than EK: Because BC is greater than FG. BH likewise is greater than KF; but the squares of BH, HE are equal to the squares of FK, KE, of which the square of BH is greater than the square of FK, because BH is greater than FK; therefore the square of EH is less than the square of EK, and the straight line EH less than EK. Wherefore, "the diameter," &c. Q. E. D.

১৫ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্তের মধ্যে ব্যাস বৃহত্তম সরলরেখা, এবং অন্যান্য রেখার মধ্যে যাহ। কেন্দ্রে নিকটতর তাহা সর্বাদা দূরতর হইতে বৃহৎ; আর বৃহত্তর রেখা লঘ্তর হইতে কেন্দ্রে নিকটতর।

কথগথ এক বৃত্ত, কথ তাহার
বাস এবং কেন্দ্র ও। থগ, চছ
অপেক্ষা কেন্দ্রের নিকটতর, কথ
বাসভিন্ন অন্য এক রেথা থগ হইতে বৃহত্তর, এবং খগ, চছ হইতে
বৃহত্তর।

্বর্ব।
থগ ও চছ রেখার উপর কে<u>ন্দু</u> হইতে ওজ ও ওট লম্বপাত হউক



এবং ও খ, ও গ, ও চ, সংযোগ কর। অপর কও ওখ সমান ও ওঘ ওগ সমান হওয়াতে কঘ, ওখ ও ওগ যোগ তুলা, কিন্তু ওখ ও ওগ একত খগ হইতে বৃহত্তর (১।২০), সূত্রাং কঘও খগ হইতে বৃহত্তর।

অপর খগ চছ অপেক্ষা কেন্দ্রের নিকটতর হওয়াতে (৩।
পি নং) ওজ টও হইতে লঘুতর, আর পূর্বে প্রতিজ্ঞাতে যে রূপ
দর্শিত হইয়াছে তদস্মারে খগ খজ রেখার দ্বিগুণ ও চছ চট
রেখার দ্বিগুণ, এবং ওজ ও খজ সমচতুর্ভুজ একত্র ওট ও চট
সমচতুর্ভুজের সমান, তাহার নধ্যে ওজ সমচত্র্ভুজ টঙ সমচতুর্ভুজের লঘুতর কেননা ওজ টঙ হইতে লঘুতর, স্মৃতরাং
খজ সমচতুর্ভুজ চট সমচতুর্ভুজ হইতে বৃহত্তর, তমিমিত্তে
খজ চট হইতে বৃহত্তর স্মৃতরাং খগ চছ হইতে বৃহত্তর।

পুনশ্চ, থগ যদি চছ হইতে বৃহত্তর হয় তবে থগ চছ হইতে কেন্দ্রের নিকটতর হইবে, যথা পূর্ববং অঙ্কপাত হইলে গুজ গুট হইতে লঘুতর হইবে। থগ চছ হইতে বৃহত্তর হওয়াতে খজ্প চট হইতে বৃহত্তর হইবে, কিন্তু খজ গুজ সমচতুর্জ একত্র চট টগু সমচতুর্জু কেননা, তাহার মধ্যে খজ সমচতুর্জ্ চট সমচতুর্জ হুইতে বৃহত্তর, কেননা খজ চট হইতে

Sym. Dem. AE = EB and ED = EC \therefore AE + ED = AD = EB + EC. Now EB + EC $_7$ BC (20. 1.) \therefore AD-BC. Moreover BC is nearer to the centre than FG (Hyp) \therefore EH \angle EK (4. Def. 3.) But (as shown in the preceding Prop.) BC = 2BH and FG = 2 FK and EH 2 + HB 2 = EK 2 + KF 2 . And \therefore EH \angle EK, EH 2 \angle EK 2 \therefore HB 2 FK 2 \therefore HB 7 FK \therefore BC 7 FG. Next, suppose BC 7 FG \therefore BH 7 FK. But (as shown before) BH 2 + HE 2 = FK 2 + EK 2 and BH 2 FK 2 \therefore HE 2 \angle EK 2 \therefore HE 2 \angle EK and so BC nearer the centre than FG.


PROP. XVI. THEOR.

The straight line drawn at right angles to the diameter of a circle, from the extremity of it, fulls without the circle; and no straight line can be drawn between that straight line and the circumference, from the extremity of the diameter, so as not to cut the circle.

Let ABC be a circle, the centre of which is D, and the diameter AB; and let AE be drawn from A perpendicular to AB, AE shall fall without the circle.

In AE take any point F, join DF, and let DF meet

the circle in C. Because DAF is a right angle, it is greater than the angle AFD (32.1.); but the greater angle of any triangle is subtended by the greater side (19.1.), therefore DF is greater than DA; now DA is equal to DC, therefore DF is greater than DC, and the point F is therefore without the circle. And F is any point whatever in the line AE, therefore AE, falls without the circle.



বৃহত্তর, স্কুতর।ং ওজ সমচজুরুজ ওট সমচজুরুজ হইতে লঘু-তর এবং ওজ রেখা ওট হইতে লঘুতর। অতএব বৃত্তের মধ্যে, ইত্যাদি।

সং উ.। কঙ = খঙ এবং ঘঙ = গঙ .. কঙ + ঘঙ = কঘ = খঙ + গঙ। খঙ + গঙ 7 খগ (১।২০) \cdot কঘ7 খগ। পুনশ্চ খগ, চছ অপেকা কেন্দ্রের নিকটতর (কল্পনা) \cdot ঙজ \angle ঙট (১।৪ সং) কিন্তু (পূর্বের প্রতিজ্ঞাতে দর্শিত হইয়াছে) খগ = ২খজ এবং চছ = ২চট এবং ওজ² + খজ² = ওট² + চট³। আর ওজ \angle ওট \cdot ওজ² \angle ওট² \cdot খজ² - চট² \cdot খজ - চট \cdot খগ - চছ।


দিতীয়তঃ খগত চছ ∴ খজ ত চট। কিন্তু (পূর্বের দর্শিত হইয়াছে) খজ² + ওজ² = চট² + ওট² এবং খজ² ত চট² ∴ ওজ² এওট³ ∴ ওজ এওট এবং খগ, চছ অপেকা কেন্দ্রের নিকটতর।

১৬ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্তের ব্যাসের প্রান্ত হইতে লম্বভাবে সরল রেখা টানিলে বিভ্রের বাহিরে পড়িবে, এবং ঐ রেখার ও পরিধির মধ্যে কোন সরল রেখা বৃত্তকে ছিল্ল না করিয়া ব্যাসের প্রান্ত হইতে টানা-যাইতে পারে না।

কথগ এক বৃত্ত, তাহার কেন্দ্র ঘ, এবং ব্যাস কথ ; ক বি**ন্দু** হইতে কথ উপর কঙ লম্ব টান, এই কঙ বৃত্তের বাহিরে পড়িবে।


কও মধ্যে চ এক বিন্দুর নির্দেশ
করিয়া ঘ চ সংযুক্ত কর, এবং ঘচ হা
যেন গ বিন্দুতে বৃত্তেতে সংলগ্ন
হইতেছে। ঘকচ সমকোণ হওয়াতে কচঘ হইতে অধিক হইতেছে
(১। ৩২), এবং ত্রিভুজের বৃহত্তর



Again, Between the straight line AE and the circumference, no straight line can be drawn from the point A, which does not cut the circle Let AG be drawn, in the angle DAE; from D draw DH at right angles

to AG; and because the angle DHA is a right angle, and the angle DAH is less than a right angle, the side DH of the triangle DAH is less than the side DA (19.1.). The point H, therefore, is within the circle, and therefore the straight line AG cuts the circle.

Cor. From this it is manifest, that the straight line which is drawn at right




angles to the diameter of a circle from the extremity of it, touches the circle; and that it touches it only in one point; because, if it did meet the circle in two, it would fall within it (2.3.). Also, it is evident, that there can be but one straight line which touches the circle in the same point.

Sym. Dem. DAF is a Rt. \angle ... (32. 1.) \angle DAF⁸ \neq \angle AFD ... (19. 1.) DF \neq DA, and so F and therefore AE are without the \bigcirc .

Next, \angle DHA is a Rt. \angle :. \angle DAH \angle \angle DHA (32. 1) :. DH \angle DA (19 1). H then is within the \odot and AG cuts it.

কোণের সম্মুখস্থ বাছও বৃহত্তর (১।১৯), একারণ ঘচ কঘ হইতে অধিক। অপর কঘ গঘ সমান অতএব ঘচ গঘ হইতেও অধিক, স্মৃতরাং চ বিন্দু বৃত্তের বাহিরে পড়িতেছে, আর কঙ রেখার মধ্যে যত্রতক্ত চ এক বিন্দু, একারণ কঙ রেখাও বৃত্তের বাহিরে পড়িতেছে।

পুনশ্চ, ক বিন্দু হইতে কঙ রেখার ও পরিধির মধ্যে কোন সরল
রেখা বৃত্তকে ছিল্ল না করিয়া অঙ্কিত
হইতে পারে না। খকঙ কোণের
মধ্যে কছ রেখা টান এবং ঘ হইতে
ঘজ কছ রেখার উপর লম্বভাবে
টান। ঘজক সমকোণ হওয়াতে
ঘকজ সমকোণ হইতে ন্যুন এবং
তলিনিত্তে ঘকজ ত্রিভুজে ঘজ বাছ
ঘক বাছ হইতে (১।১৯)লঘ্তর।



স্কুতরাং জ বিন্দু বৃত্তের মধ্যে আছে এবং তন্নিমিত্তে কছ্ সরল মরেখা বৃত্তকে ছিন্ন করিতেছে।

অন্থমান। অতএব স্পাই বোধ হইতেছে যে ব্যাসের প্রাপ্ত হইতে লম্ব টানিলে সে রেখা বৃত্তকে স্পার্শ করিবে এবং কেবল এক বিন্দুতে স্পার্শ করিবে, কেননা ছুই বিন্দুতে বৃত্তের সহিত সংলগ্ন হইলে বৃত্তের মধ্যে পড়ে। আরো স্পাই হইতেছে যে এক বিন্দুতে কেবল এক সরল রেখা বৃত্তকে স্পার্শ করিতে পারে।

সং উ। \angle ঘকচ এক সমকোণ \therefore (১।৩২) \angle ঘকচ \nearrow \angle কচঘ \therefore (১।১৯) ঘচ \nearrow ঘক, স্থতরাং চ বিন্দু এবং কঙ রেখা \bigcirc বহিন্থ। দ্বিতীয়তঃ \angle ঘজক এক সম \angle \therefore \angle ঘকজ \angle \angle ঘজক (১।৩২) \therefore ঘজ \angle ঘক (১।১৯) \therefore জ \bigcirc মধ্যস্থ এবং কছ তাহাকে ছিন্ন করে।


PROP. XVII. PROB.

To draw a straight line from a given point, either without or in the circumference, which shall touch a given circle.

First, Let A be a given point without the given circle BCD; it is required to draw a straight line from A which shall touch the circle.

Find (1.3.) the centre E of the circle, and join AE; and from the centre E, at the distance EA, describe the circle AFG; from the point D draw (11.1.) DF at right angles to EA; join EBF, and draw AB. AB touches the circle BCD.

Because E is the centre of the circles BCD, AFG, EA is equal to EF, and ED to EB; therefore the two sides AE, EB are equal to the two FE, ED, and they contain the angle at E common to the two triangles AEB, FED; therefore the base DF is equal to the base AB, and the triangle FED to the triangle AEB, and the other angles to the other angles (4.1.): Therefore the angle



EBA is equal to the angle EDF; but EDF is a right angle, wherefore EBA is a right angle; and EB is drawn from the centre: but a straight line drawn from the extremity of a diameter, at right angles to it, touches the circle (Cor. 16. 3.): Therefore AB touches the circle; and is drawn from the given point A. Which was to be done.

But, if the given point be in the circumference of the circle, as the point D, draw DE to the centre E, and DF at right angles to DE; DF touches the circle (Cor. 16.3.)


Sym. Dem. EA = EF, ED = EB, and $\angle E$ com-

১৭ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

পরিধির বহিত্ত কিয়া মধ্যত্ত কোন নির্দিটি বি**ন্তু** হইতে এক নির্দিন্ট বৃত্তকে স্পর্শ করে এমত এক সরল রেখা টানিতে হইবে।

প্রথমতঃ। খগঘ নির্দ্দিই বৃ-তের বহিন্ত বিন্তুক। বৃত্তকে স্পর্শ করে এমত এক সরল রেখা ক হইতে টানিতে হইবে।

বৃত্তের কেন্দু ও নির্দেশ করিয়া ক ও সংযুক্ত কর। ও বিন্তু হইতে ওক দূরে কচছ বৃত্ত অক্ষিত কর, এবং ঘ বিন্তু হইতে ওঘ রেখার উপর ঘচ লম্ব টান, পরে



ঙথা ও কথ রেখা টান। কথ খগঘ বৃত্তকে স্পর্শ করিতেছে।
খগঘ কচছ ছই বৃত্তের কেন্দু ও হওয়াতে ওক ও ওচ সমান
এবং ওথ ও ওঘ সমান, স্মৃতরাং কও ওখ ছই বাছ ক্রমণ চঙ
ভিঘ সমান এবং ভাহাদের অন্তর্গত্তি ও কোণ কওখ ও চওঘ
উভয় ত্রিভুজের সামানা কোণ, স্মৃতরাং ঘচ ভূমি কথ ভূমির
সমান এবং চঙঘ ত্রিভুজ কঙখ ত্রিভুজের সমান, এবং একটার
অন্যান্য কোণ অন্যান্য কোণের সমান (১।৪), তরিমিত্তে ওথক কোণ ওঘচ সমান, অপর ওঘচ এক সমকোণ,
স্মৃতরাং ওখক কোণও সমকোণ, এবং ওখ কেন্দ্র হইতে টানা
গিয়াছে, আর (৩।১৬ অন্থ) ব্যাসের প্রান্ত হইতে লম্ম
টানিলে সে রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করে, স্মৃতরাং কথ বৃত্তকে স্পর্শ
করিতেছে এবং ক নির্দ্দি ট বিন্দু হইতে টানা গিয়াছে, ইহাই
এ স্থলে সম্পাদ্য।

দ্বিতীয়তঃ। ঘ বিল্ফুর ন্যায় কোন বিল্ফু পরিধিতে নির্দিষ্ট থাকিলে ঘ ও কেন্দ্র পর্যান্ত টনিয়া তাহার উপর ঘচ লম্বভাবে টান, স্মৃতরাং ঘচ বৃত্তকে স্পর্শ করিবে (৩। ১৬ অন্থ)।

সং উ.। ওক 🕳 ওচ, ওঘ 🖚 ওখ, এবং 🚣 ও, কওখ ও চঙ্ঘ

mon to \triangle s AEB, FED \therefore (4.1) \angle EBA $= \angle$ EDF Now \angle EDF is a Rt. $\angle \therefore$ EBA is a Rt. $\angle \therefore$ AB touches the \bigcirc (cor. 16.3.)


PROP. XVIII. THEOR.

If a straight line touch a circle, the straight line drawn from the centre to the point of contact is perpendicular to the line touching the circle.

Let the straight line DE touch the circle ABC in the point C; take the centre F, and draw the straight line FC: FC is perpendicular to DE.

For, if it be not, from the point F draw FBG perpendicular to DE; and because FGC is a right angle,

angle; and to the greater angle the greater (19. 1.) side is opposite: Therefore FC is greater than FG; but FC is equal to FB; therefore FB is greater than FG, the less than the greater, which is impossible; wherefore FG is not perpendicular to DE: In the same manner, it may be shown, that no other line



than FC can be perpendicular to DE; FC is therefore perpendicular to DE. Therefore, "if a straight line," &c. Q. E. D.


Sym. Dem. If FC be not \bot to DE let FBG be so. Then \angle FGC is a Rt. $\angle \therefore \angle$ GCF is an acute angle \therefore FC \nearrow FG (19. 1.) FC \Longrightarrow FB \rightarrow FB \rightarrow Which is impossible (9. Ax. 1,) \therefore FG is not \bot to DE nor any other but FC.

ত্রিভুজের সামান্য কোণ ∴ (১।৪) ∠ঙথক == ∠ওঘচ। ওঘচ এক সম ∠ ∵ ∴ওথক এক সম ∠ ∴ কথ ⊙ স্পর্শ করে (৩।১৩ হান্ত)।

১৮ প্রতিক্রা উপপাদা।

কোন সরল রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করিলে কেন্দ্র হইতে স্পর্শ চিহ্ন পর্যান্ত যদি সরল রেখা টানা যায় তবে তাহা ঐ বৃত্ত স্পর্শক রেখার লম্ম হইবে।

ঘঙ রেখা কখণ বৃত্তকে গ বিনতুতে স্পর্শ করুক। চ কেন্দ্র
নির্ণয় করিয়া চগ রেখা টান, গচ
ঘঙ রেখার লম্ম হইবে। কেননা
চগ যদি লম্ম না হয় তবে চ বিন্তু
ছইতে ঘঙ রেখার উপর চুখছ
লম্ম টান। অপর চুছ্গ স্মকোণ
হওয়াতে (১।১৭) চগছ অবশ্য
লঘ্ কেন্ হইবে,এবং (১।১৯)



বৃহত্তর কোণের সম্মুখন্ত বাহ্নও বৃহত্তর হওয়াতে চপা চছ হইতে বিহত্তর হইবে, এবং চপা চথা সমান হওয়াতে চথা চছা হইতে বৃহত্তর হইতে বৃহত্তর হইতে পারে না, স্ত্তবাং চছা ঘঙা রেখার লয় নহে। এই রূপে উপপন্ন হইতে পারে যে চপা ভিন্ন অন্যা কোনে রেখা ঘঙা রেখার উপর লয় হইবে না, অতএব চপা ঘঙা রেখার লয়। অতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।

সং উ.। চগ যদি ⊥ ঘণ্ড না হয় তবে চখছ লয় হেউক, তাহাতে এচছগ এক সম এ ত ছগচ লঘুকোণ এ চগ চ চছ (১।১৯)। চগ == চখ এ চখ বি চছ, ইহা অসাধ্য (১।৯ ম.স৷) এচছ ⊥ ঘণ্ড নহে, এবং চগ ভিন্ন অন্য কোন রেখাও নহে।


PROP. XIX. THEOR.

If a straight line touch a circle, and from the point of contact a straight line be drawn at right angles to the touching line; the centre of the circle is in that line.

Let the straight line DE touch the circle ABC, in C, and from C let CA be drawn at right angles to DE; the centre of the circle is in CA.

For, if not, let F be the centre, if possible, and join

CF: Because DE touches the circle ABC, and FC is drawn from the centre to the point of contact, FC is perpendicular (18.3.) to DE; therefore FCE is a right angle: But ACE is also a right angle; therefore the angle FCE is equal to the angle ACE, the less to the greater, which is impossible: Wherefore F is not the centre of the circle ABC: In



the same manner, it may be shown, that no other point which is not in CA, is the centre; that is, the centre is in CA. Therefore, "if a straight line," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. If the centre be not in AC, let it be at F. .. FC is \bot to DE (18.3.) and \bot FCE is a Rt. \angle . But AC is \bot to DE (Hyp.) .. \bot ACE is a Rt. \angle ... FCE \Longrightarrow \bot ACE which is impossible. ... the centre is not at F nor any where else but in AC.

PROP. XX. THEOR.

The angle at the centre of a circle is double the angle at the circumference, upon the same base, that is, upon the same part of the circumference.


Let ABC be a circle, and BDC an angle at the centre, and BAC an angle at the circumference which

১৯ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করিলে স্পর্শ চিহ্ন হইতে যদি স্পর্শক রেখার লম্ব টানা যায় তবে ঐ লম্বের মধ্যে কেন্দ্র থাকিবে।

যেও সরল রেখ। কখণ বৃত্তকে গ বিন্তুতে স্পর্শ করুক। পরে গ হইতে কগ রেখ। ঘঙ রেখার লয় করিয়া টান। কগ রেখার মধ্যে বৃত্তের কেন্দু থাকিবে।

যদি কর্ম রেখাতে কেন্দু না থাকে তবে অন্যত্র যথা চ কেন্দু করিয়া চ গ সংযুক্ত কর। ঘঙ কথগ বৃভকে স্পাশ করিতেছে



এবং কেন্দু হইতে স্পর্শ চিচ্ছ পর্যান্ত চগ টানা গিয়াছে একারণ
(৩।১৮) চগ ঘণ্ড রেখার লম্ব, স্থতরাং চগণ্ড এক সমকোণ,
কিন্দু কগণ্ডও সমকোণ, তনিনিতে চগণ্ড কগণ্ড সমান, ইহা
অসাধ্য, কেননা চগণ্ড লঘুতর, স্থতরাং চ কখণ বৃত্তের কেন্দু
। এইরূপে উপপন্ন হইতে পারে যে কগ রেখান্থ না
হইলে কোন বিন্দু কেন্দু হইতে পারে না অর্থাং কগ রেখাতেই কেন্দু আছে। অতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।


সং উ.। যদি কগ রেখাতে কেন্দুনা থাকে তবে চ কেন্দু হউক ∴ চগ ⊥ ঘঙ (৩। ১৮) এবং ∠চগঙ এক সম ∠। অপর কগ ⊥ ঘঙ (কল্পনা) ∴ ∠কগঙ এক সম ∠ ∴ ∠চগঙ — _কগঙ, ইহা অসাধ্য, ∴ চ কেন্দ্র নহে এবং কগ ভিন্ন অন্যত্র কেন্দ্র হুইতে পারে না।

২০ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

ু এক ভূমির উপর অর্থাৎ পরিধির এক অংশের উপর বৃত্তের কেন্দুস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণের দ্বিগুণ হইবে। কথ্য এক বৃত্ত, খ্যুগ কেন্দ্রস্থ এক কোণ এবং খুক্য পরিধিস্থ have the same circumference, BC for their base; the angle BDC is double of the angle BAC.

First, Let D, the centre of the circle, be within the angle BAC, and join AD, and produce it to E: Be-


cause DA is equal to DB, the angle DAB is equal (5.1.) to the angle DBA; therefore the angles DAB, DBA taken together, are double of the angle DAB; but the angle BDE is equal (32.1.) to the angles DAB, DBA; therefore also, the angle BDE is double of the angle DAB: For the same reason, the angle EDC is double of the angle DAC: Therefore the



of the angle DAC: Therefore the whole angle BDC is double of the whole angle BAC.

Again, Let D, the centre of the circle, be without

the angle BAC, and join AD and produce it to E. It may be demonstrated, as in the first case, that the angle EDC is double of the angle DAC, and that EDB, a part of the first, is double of DAB, a part of the other; therefore the remaining angle BDC is double of the remaining angle BAC. Therefore, "the angle at the centre," &c. Q. E. D.




Sym. Dem. First Case. $DA = DB \therefore \angle DAB = \angle DBA \ (5.1.) \therefore \angle DAB + \angle DBA = 2 \angle DAB \therefore \angle BDE = \angle DAB + \angle DBA \ (32.1.) = 2 DAB.$ Similarly $\angle EDC = 2 \angle DAC \therefore \angle BDC = 2 \angle BAC.$

Second Case. It may be shown as before that $\angle EDC = 2 \angle EAC$ and $\angle EDB = 2 \angle EAB \therefore \angle BDC = 2$. $\angle BAC (3. Ax. 1.)$

এক কোণ, উভয়েরি ভূমি এক পরিধি খগ। খঘগ কোণ খকগ কোণের দ্বিগুণ হইবে।


প্রথমতঃ, বৃত্তের কেন্দু ঘ যেন
থকগ কোনের মধ্যে আছে। ক ঘ
গং যুক্ত করিয়া ওপর্যান্ত বৃদ্ধি কর।
ঘক ঘথ সনান একারণ (১।৫)
ঘকথ কোন ঘথক সনান, এবং
ঘকথ ও ঘথক ছুই কোন একত্র
ঘকথ কোনের দিগুল। অপর (১।
১২) থঘঙ কোন ঘকথ ও ঘথক
উভয়ের যোগ তুল্য স্মৃত্রাং থঘঙ



কোণও ঘকথ কোনের দিগুল। ঐ কারনে গঘণ্ড কোণও গকণ্ড কোনের দিগুল, স্থতরাং সমুদয় গঘথ কোন থকগ কোনের দিগুল।

দিতীয়তঃ, বত্তের কেন্দ্র যেন থকগ কোণের বাহিরে আছে,

ক ঘ সংযুক্ত করিয়া ও পর্যান্ত বৃদ্ধি কর। ইহাতে পূর্ব্বং উপপন্ন হইতে পারে যে গঘঙ কোন গকঘ কোনের দ্বিগুন এবং প্রথমোক্তের একাংশ খঘঙ দ্বিতীয়োক্তের একাংশ খকঘ কোনের দ্বিগুন স্থতরাং অবশিষ্ট গঘখও গকখ কোনের দ্বিগুন। অত এব এক ভ্রির উপর, ইত্যাদি।



সং উ, প্রথমতঃ। ঘক = ঘথ :. ∠ঘকথ == ∠ঘথক (> 1 ৫), :. ∠ঘকথ + ∠ঘথক == २ ∠ঘকথ :. ∠ঙঘথ == ∠ঘকথ + ∠ঘথক (> 1 ৬২) == २ ∠ঘকথ | তদ্রপ ∠ঙঘগ == ২ ∠ঘকগ :. ∠খঘগ == ২ ∠থকগ |

্দিতীয়তঃ। পূর্ববিৎ দর্শিত হইতে পারে যে ∠ঙ্ঘণ == ২∠ঙ্কণ এবং ∠ঙ্ঘথ == ২∠ঙ্কথ ∴ ∠থ্ঘণ == ২∠খকণ (১। ১ স্থানাঃ)।


PROP. XXI. THEOR.

The angles in the same segment of a circle are equal to one another.

Let ABCD be a circle, and BAD, BED, angles in the same segment BAED: The angles BAD BED

are equal to one another.


Take F the centre of the circle ABCD: And, first, let the segment BAED be greater than a semicircle, and join BF, FD: And because the angle BFD is at the centre, and the angle BAD at the circumference, both having the same part of the circumference, viz. BCD, for their base; therefore the angle BFD is double (20.3.) of the angle BAD: for the same reason, the



angle BFD is double of the angle BED: Therefore the angle BAD is equal to the angle BED.

But, if the segment BAED be not greater than a

semicircle, let BAD, BED be angles in it; these also are equal to one another. Draw AF to the centre, and produce it to C, and join CE: Therefore the segment BADC is greater than a semicircle; and the angles in it, BAC, BEC are equal, by the first case: For the same reason, because CBED is greater than a semicircle, the angles CAD, CED are



equal: therefore the whole angle BAD is equal to the whole angle BED. Wherefore, "the angles in the same segment," &c. Q. E. D.


Sym. Dem. First Case. $\angle BFD = 2 \angle BAD$ (20. 3). $\angle BFD = 2\angle BED ... \angle BAD = \angle BED (7. Ax. 1.)$

২১ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

এক বৃত্তথণ্ডের মধ্যে যত কোণ থাকে সকলি পরস্পর সমান।

কথগঘ এক বৃত্ত, তাহার এক খণ্ড থকণ্ডঘ মধ্যে খকঘ ও খণ্ডঘ ছুই কোণ আছে, এই ছুই কোণ পরস্পার সমান হুইবে।


কথগঘ বৃত্তের চকেন্দু নির্ণয় কর। প্রথমতঃ, খকঙঘ থণ্ড অর্দ্ধ বৃত্তের অধিক হউক, তাহাতে চ খ ও চঘ সংযুক্ত কর। এস্থলে কেন্দুস্থ



খচঘ কোণ ও পরিধিস্থ খকঘ কোণ উভয়ের ভূমি পরিধির এক অংশ অর্থাৎ খগঘ, স্মৃতরাং (৩.২০) খচঘ কোণ খকঘ কোণের দিগুণ। ঐ কারণে খচঘ কোণ খঙ্ঘ কোণেরও দিগুণ। অতএব খকঘ ও খঙ্ঘ পরস্পার সমান।

দিতীয়তঃ, খকঙঘ খণ্ড যদি অর্দ্রের অধিক না হয় আর তাহাতে যদি থকঘ ও খঙ্ঘ ছুই কোণ থাকে তবে ইহারাও

শিমান হইবে কচ কেন্দু পর্যান্ত
টানিয়া গ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর ও
গ ও সংযুক্ত কর, স্মৃতরাং থকষণ ধ
খণ্ড অর্দ্ধবৃত্তের অধিক হইবে, এবং
তক্রস্থ চুই কোণ খকগ খণ্ডগ প্রথম
ধারামুদারে সমান হইবে। ঐ কারণে
গখণ্ডঘ অর্দ্ধবৃত্তের অধিক হওয়াতে
গকঘ গণ্ডঘ কোণ সমান হইবে, অত-



এব সমুদয় খকঘ ও খঙ্ঘ কোণ পরস্পর সমান। এই রূপে এক বৃত্তখণ্ডের, ইত্যাদি।

সং উ.। প্রথমতঃ, ∠খচঘ = ২∠খকঘ (৩। ২০), ∠খচঘ == ২∠খঙঘ ∴ ∠খকঘ = ∠খঙঘ (১। ৭ মৃ. সা.)।

Second Case. $\angle BAC = \angle BEC$ (by the first case) $\angle CAD = \angle CED$ (by the same) $\therefore \angle BAC + \angle CAD$ or the whole $\angle BAD = \angle BEC + \angle CED$ or the whole $\angle BED$.


PROP. XXII. THEOR.

The opposite angles of any quadrilateral figure described in a circle, are together equal to two right angles.

Let ABCD be a quadrilaterial figure in the circle ABCD; any two of its opposite angles are, together equal to two right angles.

Join AC, BD. The angle CAB is equal (21.3.) to the

angle CDB, because they are in the same segment BADC, and the angle ACB is equal to the angle ADB, because they are in the same segment ADCB; therefore the whole angle ADC is equal to the angles CAB, ACB: To each of these equals add the angle ABC; and the angles ABC, ADC, are equal to the angles ABC, CAB, BCA. But ABC, CAB, BCA are equal



to two right angles: therefore also the angles ABC, ADC are equal to two right angles: In the same manner, the angles BAD, DCB may be shown to be equal to two right angles. Therefore "the opposite angles," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. $\angle BDC = \angle BAC$ (21. 3.) $\angle ADB = \angle ACB$ (21. 3.) $\therefore \angle ADC = \angle BAC + \angle ACB \therefore \angle ADC + \angle ABC = \angle BAC + \angle ACB + \angle ABC = 2 \text{ Rt. } \angle s$ (32. 1.)

PROP. XXIII. THEOR.

Upon the same straight line, and upon the same side of it, there cannot be two similar segments of circles, not coinciding with one another.


If it be possible, let the two similar segments of circles, viz. ACB, ADB, be upon the same side of the

২২ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্তের মধ্যে কোন চতুর্জু ক্ষেত্র অঙ্কিত হুইলে তাহার সন্মু-খস্থ কোণদ্বয় একত্র ছুই সমকোণ তুল্য হুইবে।

কখগঘ বৃত্তের মধ্যে কখগঘ এক চতুর্জ ক্ষেত্র, ইহার সম্মুখস্থ যে ছুই কোণ লও একত্র ছুই সমকোণ তুলা হুইবে।

ক গ ও খ ঘ সংযুক্ত কর। গকখ \
কোণ গঘখ সমান কেননা ভাহারা ক
এক বৃত্তখণ্ড থকঘগ মধ্যে আছে (৩।
২১), এবং কগখ কোণ কঘখ সমান




কেননা তাহারাও এক খণ্ড কঘগখ মধ্যে আছে, স্নতরাং সমুদ্রম কঘগ কোণ গকথ ও কগথ ছই কোণের তুল্য; আর উভয়ে কথগ কোণ যোগ করিলে কথগও কঘগ ছই কোণে একত্র কথগ, গকথ ও খগক কোণের তুল্য। অপর (১। ৩২) কথগ, গকথ, ও খগক একত্র ছই সমকোণ তুল্য, স্নতরাং কথগ ও কঘগ কোণও একত্র ছই সমকোণ তুল্য। এই রূপে থকঘ ও ঘগথ কোণও ছই সমকোণ তুল্য। এই রূপে থকঘ ও ঘগথ কোণও ছই সমকোণ তুল্য। এই রূপে থকঘ ও ঘগথ কোণও ছই সমকোণ তুল্য উপপন্ন হইতে পারে। অতএব বৃত্তের মধ্যে, ইত্যাদি।

े मং উ.। \angle থঘণ = \angle থকণ (৩।২১) \angle কঘথ = \angle কণথ (৩।২১) \therefore \angle কঘণ = \angle থকণ + \angle কথণ = \angle কথণ = \angle কমণ + \angle কথণ = \angle সম \angle (১। ৩২)।

২৩ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

এক সরল রেখার উপর এক পার্শ্বে ছই সদৃশ বৃত্তথগু পরস্পর না মিলিয়া থাকিতে পারে না। same straight line AB, not coinciding with one another: then, because the circles ACB, ADB, cut one another in the two points A, B, they cannot cut one another in

in any other point (10.3.): one of the segments must therefore fall within the other: let ACB fall within ADB, draw the straight line BCD and join CA, DA: and because the segment ACB is similar to the segment ADB, and similar segments of cir-



cles contain (9. def. 3.) equal angles, the angle ACB is equal to the angle ADB, the exterior to the interior, which is impossible (16. 1.). Therefore, "there cannot be two similar segments of circles upon the same side of the same line, which do not coincide." Q. F. D.

Sym. Dem. If possible, then one of them must fall within the other. $\angle ADB = \angle ACB$ (9. Def. 3.) but $\angle ACB \neq \angle ADC$ (16. 1.) which is absurd.


PROP. XXIV. THEOR.

Similar segments of circles upon equal straight lines are equal to one another.

Let AEB, CFD be similar segments of circles upon the equal straight lines AB, CD; the segment AEB is equal to the segment CFD.


For, if the segment AEB be applied to the segment CFD, so

that the point A may be on C, and the straight line A B



upon CD, the point B will coincide with the point D, because AB is equal to CD: Therefore the straight line AB coinciding with CD, the segment AEB must

যদি স্যাৎ পারে তবে কথ সরল রেখার উপর এক পার্শ্বে কগথ ও কঘথ ছই সদৃশ বৃত্তথণ্ড পরস্পর না মিলিয়া থাকুক, তাহাতে কগথ ও কঘথ বৃত্ত ক ও খ বিক্তুতে পর-



স্পরকে ছিন্ন করিতেছে একারণ (৩। ১০) আর কোন বিন্দুতে ছিন্ন করিতে পারে না স্কৃতরাং এক খণ্ড অন্য খণ্ডের মধ্যে পড়িবে। কগখ যেন কঘখ মধ্যে পড়িতেছে, পরে খগঘ সরল রেখা টান ও কগ, এবং ক ঘ সংযুক্ত কর। অপর কগখণ্ড কঘখ ছই সদৃশ খণ্ড স্কৃতরাং সদৃশ বৃত্ত খণ্ডম্থ কোণে মমূহ সমানু হওয়াতে (৩। ৯ সং) কগখ কোণ কঘখ কোণের সমান, কিন্তু (১। ১৬) তিভুজের বহিস্থ কোণ অন্তরম্ভের সমান হইতে পারেনা, অতএব এক রেখার উপর এক পার্শ্বে ছই সদৃশ বৃত্ত-খণ্ড না নিলিয়া থাকিতে পারে না।

সং উ.। যদিস্যাৎ সাধ্য হয় তবে একটা অন্যটার মধ্যে পড়িবে। ∠কঘথ == ∠কগথ (৩।৯ স্ব. সা.) কিন্তু ∠কগথ → ∠কঘথ (১।১৬) ইহা অসাধ্য।


২৪ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

সমান২ সরল রেখার উপর সদৃশ বৃত্তথণ্ড থাকিলে তাহারা পরস্পর সমান হইবে।

কখ, ও গঘ সমান সরলরেখার উপর কঙখ ও গচঘ ছুই

সদৃশ বৃত্তখণ্ড হউক। কঙ্থ খণ্ড গচঘ স-মান হইবে।





(कनन। यमि

কঙ্ব ধণ্ড গচঘ খণ্ডের উপর এমত প্রকারে রাখা যায় যে ক গ বিন্দুর উপর এবং কথ রেখা গঘ রেখার উপর পড়ে তবে কথ গঘ সমান হওয়াতে থ ঘ বিন্দুর উপর পড়িবে, স্মতরাং (23.3.) coincide with the segment CFD, and therefore is equal to it. Wherefore, "similar segments," &c. Q. E. D.


Sym. Dem. If segment AEB be applied to CFD so that A may be on C and AB on CD, B must coincide with D: AB = CD. ... AEB must coincide with CFD (23.3)... AEB = CFD.

PROP. XXV. PROB.

A segment of a circle being given, to describe the circle of which it is a segment.

Let ABC be the given segment of a circle; it is required to describe the circle of which it is a segment.

Bisect (10. 1.) AC in D, and from the point D draw (11.1.) DB at right angles to AC, and join AB; First, Let the angles ABD, BAD be equal to one another; then the straight line BD is equal (6. 1.) to DA, and therefore to DC; and because the three straight lines DA, DB, DC, are all equal, D is the centre of the circle (9.3); from the centre D, at the distance of any of the three DA, DB, DC, describe a circle; this shall pass



through the other points; wherefore the circle of which ABC is a segment is described: and because the centre D is in AC, the segment ABC, is a semicircle. Next, Let the angles ABD, BAD be unequal; at the point A, in the straight line AB, make (23. 1.) the angle BAE equal to the angle ABD, and produce BD, if necessary, to E, and join EC: and because the angle ABE is equal to the angle BAE, the straight line BE

কর্থ সরল রেখা গঘ সহিত মিলিলে কঙ্থ থণ্ড গচ্ঘ সহিত না মিলিয়া থাকিতে পারিবে না (৩। ২৩) একারণ ইহারা সমান। অতএব সমান্থ সরল রেখার, ইত্যাদি।


সং উ.। যদি কঙখ খণ্ড গচঘ খণ্ডের উপর এমত করিয়া রাখা যায় যে ক গ উপর ও কখ গঘ উপর পড়ে তবে খ ঘ উপর পড়িবে ∵ কথ — গঘ ∴ কঙখ অবশ্য গচঘ সহিত মিলিবে (৩। ২৩) ∴ কঙখ — গচঘ।

২৫ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক বৃত্তখণ্ড নির্দিষ্ট হ্ইলে সে যে বৃত্তের খণ্ড তাহা অক্ষিত করিতে হইবে।

কথগ এক নির্দিঊ বৃত্তথণ্ড, ইহা যে বৃত্তের **খণ্ড তাহা** অক্ষিত করিতে হইবে।

কগ ঘ বিন্দুতে দ্বিও কর (১। ১০), এবং ঘ হইতে খঘ (১। ১১) কগ উপর লয় ভাবে টানিয়া ক খ সংযুক্ত কর। প্রথমতঃ যেন কথঘ ও খকঘ ছুই কোণ পরস্পর সমান হউক তাহাতে (১। ৬) কঘ ও খঘ সমান হইবে স্থতরাং খঘ গঘও



সমান হইবে, এবং থঘ, কঘ, গঘ, তিন রেখা সমান হওয়াতে (৩। ৯) ঘ বৃত্তের কেন্দু হইবে, এবং ঘ হইতে এই তিনের কোন রেখা পর্য্যন্ত বৃত্ত আঁকিলে অন্যান্য বিন্দু দিয়া যাইবে স্তত্ত্বাং কখগ যে বৃত্তের খণ্ড তাহা এইরূপে অঙ্কিত হইল, আর কগ মধ্যে কেন্দু থাকাতে কখগ খণ্ড অর্দ্ধ বৃত্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ কখঘ ও ঘকখ দুই কোণ যেন অসমান হউক, পরে কগ রেখার ক বিন্দুতে কখুঘ সমান করিয়া থকঙ কোণ অঙ্কিত কর

is equal (6. 1.) to EA: and because AD is equal to DC, and DE common to the triangles ADE, CDE, the two sides AD, DE are equal to the two CD, DE, each to each; and the angle ADE is equal to the angle CDE, for each of them is a right angle; therefore the base AE is equal (4.1.) to the base EC: but AE was shown to be equal to EB, wherefore also BE is equal to EC: and the three straight lines AE, EB, EC, are therefore equal to one another; wherefore (9. 3.) E is the centre of the circle. From the centre E, at the distance of any of the three AE, EB, EC, describe a circle: this shall pass through the other points; and thus the circle of which ABC is a segment is described: also, it is evident, that if the angle ABD be greater than the angle BAD, the centre E falls without the segment ABC, which therefore is less than a semicircle; but if the angle ABD be less than BAD, the centre E falls within the segment ABC, which is therefore greater than a semicircle: Wherefore, a segment of a circle being given, the circle is described of which it is a segment. Which was to be done.

Sym. Dem. First Case. $\angle ABD = \angle DAB :$. AD = DB (6. 1.) AD = DC (by constr.) $\therefore BD = DC = AD$ \therefore D is the centre of the \bigcirc required (9. 3.)

Second Case. $\angle ABE = \angle BAE$.: AE = BE (6. 1.) And AD = DC (by constr.), DE common to $\triangle s$ ADE and EDC, and $\angle ADE = \angle EDC$ (being Rt. $\triangle s$) : (4. 1.) AE = EC = EB .: E is the centre of the \bigcirc required.

PROP. XXVI. THEOR.

In equal circles, equal angles stand upon equal arches, whether they be at the centres or circumferences.

Let ABC, DEF be equal circles, and the equal angles BGC, EHF at their centres, and BAC, EDF at their circumferences: the arch BKC is equal to the arch ELF.

(১। ২৩), এবং প্রয়োজন থাকিলে খণ্ড ঘ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর, ও ঙ গ সংযুক্ত কর। অনন্তর কথঘ কোণ থকঙ সমান হও-য়াতে খণ্ড ও কণ্ড সমান (১। ৬) আর কঘ গঘ সমান, এবং ঘঙ কঘঙ ও গঘঙ উভয় ত্রিভূজের সামান্য বাহু এবং কঘঙ কোণ গঘণ্ড সমান, কেননা ইহারা প্রত্যেকে সমকোণ, একারণ (১। ৪) কণ্ড ভূমি গণ্ড সমান। কিন্তু কণ্ড খণ্ড সমান দৰ্শিত হইতেছে স্তর্ণ খঙ গঙ সমান এবং কঙ, খঙ, গঙ, এই তিন রেখা পরস্পর সমান অতএব ড(৩।৯) বৃত্তের কেন্দ্ হইবে এবং ও কেন্দু হইতে কঙ, খঙ, গঙ, এই তিনের কোন রেখা পর্যন্ত বৃত্ত জাকিলে অন্যান্য বিন্দু দিয়া যাইবে এবং যে বত্তের খণ্ড কখণ তাহা এই রূপে অঙ্কিত হইল। আর স্পাই দেখা যাইতেছে যে কথঘ কোণ থক্য কোণের অধিক হইলে ঙ বিন্দু খণ্ডের বাহিরে পড়িবে স্মৃতরাং এখণ্ড অন্ধ্ বৃত্ত হইতে ম্থান কিন্তু কথঘ কোণ খকঘ কোণের ম্থান হইলে ও বিন্দ খণ্ডের মধ্যে পড়িবে এবং এ খণ্ড তখন অর্দ্ধবৃত্ত হইতে অধিক হইবে। অতএব এক বৃত্তখণ্ড নির্দিষ্ট হওয়াতে সে যে বৃশ্তের খণ্ড তাহা অন্ধিত হইল, ইহাই এম্বলে সম্পাদ্য।


সং উ। প্রথমতঃ ∠ কথঘ == ∠ ঘকথ ∴ কঘ == ঘথ (১।৬) কঘ == ঘগ (অস্কপাত) ∴ থঘ == ঘগ == ক্ঘ ∴ ঘ অভীষ্ট ⊙ কেন্দু (৩।৯)। ---

দিতীয়তঃ \angle কথঙ — \angle থকঙ \therefore কণ্ড — থঙ (১।৬)। অপর কঘ — ঘণ (অঙ্কপাত) ঘঙ কঘঙ ও ঙঘণ ত্রিভুজের সামান্য বাহু এবং \angle কঘঙ — \angle ঙঘণ (কেননা সমকোন) \therefore (১।৪) কঙ — ঙগ \therefore ঙ অভীয় \odot কেন্দু।

২৬ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

সমান২ বৃত্তেতে সমান২ কোণ, কেন্দুস্থ হউক বা পরিধিস্থ হউক, সমান২ চাপের উপর থাকিবে।

কথগ ঘঙচ সমান২ বৃত্ত, এবং খছগ, ওজচ কেন্দুস্থ সমান২ কোন, ও থকগ, ওঘচ পরিধিস্থ সমান২ কোন কল্পনা কর, ভাহাতে থটগ চাপ ওঠচ চাপের সমান হইবে। Join BC, EF; and because the circles ABC, DEF are equal, the straight lines drawn from their centres are equal; therefore the two sides BG, GC, are equal to the two EII, HF; and the angle at G is equal to



the angle at H; therefore the base BC is equal (4. 1.) to the base EF: and because the angle at A is equal to the angle at D, the segment BAC is similar (9. def. 3.) to the segment EDF; and they are upon equal straight lines BC, EF; but similar segments of circles upon equal straight lines are equal (24. 3.) to one another; therefore the segment BAC is equal to the segment EDF: but the whole circle ABC is equal to the whole DEF; therefore the remaining segment BKC is equal to the remaining segment ELF, and the arch BKC to the arch ELF. Wherefore, "in equal circles," &c. Q. E. D.


Sym. Dem. \bigcirc ABC $= \bigcirc$ DEF (Hyp.) \therefore BG =EH and GC = HF. \angle G $= \angle$ H (Hyp.) \therefore (4. 1.) BC =EF. \angle A $= \angle$ D (Hyp.) \therefore seg. BAC is similar to seg. EDF (9. Def. 3.) \therefore seg. BAC = seg. EDF (24. 3.) \therefore \bigcirc ABC = seg. BAC = \bigcirc DEF = seg. EDF, or are BKC = arc ELF.

PROP. XXVII. THEOR.

In equal circles, the angles which stand upon equal arches are equal to one another, whether they be at the centres or circumferences.

Let the angles BGC, EHF at the centres, and BAC,

থ গ এবং ও চ সংযুক্ত কর। কথাগ ঘওচ ছই বৃত্ত সমান হওয়াতে তাহাদের কেন্দু হইতে অঙ্কিতে রেখাও সমান হইবে একারণ থছ, গছ ছই বাহু ওজ, জচ সমান এবং ছ কোণ্ড



ক্ষ সহিত সমান, স্থাতরং (১। ৪) থগ ভূমিও ওচ সমান। অপর ক কোণ ঘ কোণ সমান হওয়াতে থকগ থওা ওঘচ থওার সমান (৩। ৯ সং)। আর ইহারা থগ, ওচ সমান২ রেখার উপরিস্থার আছে, এবং সদৃশ বৃত্তথও সমান২ সরল রেখার উপরিস্থা হইলে সমান হয় (৩। ২৪), স্থাতরাং থকগ থওা ওঘচ থওার সমান। আর সমুদ্য বৃত্ত কথাগ সমুদ্য ঘঙচ সমান এবং থকাগ থওা ওঘচ থওার সমান স্থাতরাং অবশিক্ত থওা থটাগওা ওচচ সমান হইবে। অতএব সমান হাবের, ইত্যাদি।

সং উ। কথগ ে = ঘঙচ ে (কল্পনা) .. থছ = ঙক্ত এবং ছগ = জচ এবং ∠ছ = এজ (কল্পনা) .. (১।৪) থগ = ঙচ। ∠ক = ∠ঘ (কল্পনা) .. থকগ থণ্ড ঙঘচ থণ্ডের সদৃশ (১।৯ সং) : থকগ খণ্ড = ঙঘচ খণ্ড (১।২৪) .. কথগ ে — থকগ খণ্ড = ঘঙচ ে — ঙঘচ খণ্ড অর্থাৎ খটগ চাপ = ঙঠচ চাপ।


২৭ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

সমানহ বৃত্তেতে সমানহ চাপের উপরিস্থ কোণ কেন্দ্রেই হউক কিয়া পরিধিতেই হউক পরস্পার সমান হইবে।

কথগ, ঘণ্ডচ সমান২ বৃত্ত, ইহাদের কেন্দুস্থ কোণ থছগ ও

EDF at the circumferences of the equal circles ABC, DEF, stand upon the equal arches BC, EF; the angle BGC is equal to the angle EHF, and the angle BAC to the angle EDF.

If the angle BGC be equal to the angle EHF, it is manifest (20.3.), that the angle BAC is also equal to EDF. But, if not, one of them is the greater: let BGC be the greater, and at the point G, in the straight line BG, make the angle (23.1.) BGK equal to the angle EHF. And because equal angles stand upon equal arches (26.3.), when they are at the centre, the arch BK is equal to the arch EF: but EF is equal to BC; therefore also BK is equal to BC, the less to the greater, which is impossible. Therefore the angle BGC is not unequal to the angle EHF; that





is, it is equal to it: and the angle at A is half the angle BGC, and the angle at D half the angle EHF: therefore the angle at A is equal to the angle at D. Wherefore, "in equal circles" &c. Q. E. D.

Sym. Dem. If $\angle BGC \neq \angle EHF$, let $\angle BGK = EHF \therefore$ are BK = arc EF (26.3) But are $BC = EF (Hyp.) \therefore$ are BK = arc BC which is impossible $(9. Ax. 1.) \therefore \angle BGC = \angle EHF$. $\angle BAC = \frac{1}{2} \angle BGC$ and $\angle EDF = \frac{1}{2} \angle EHF (20.3.) \therefore \angle BAC = \angle EDF$.

ঙজচ, এবং পরিধিস্থ কোণ খকগ ও ওঘচ, খগ ও ওচ সমান২ চাপের উপরিস্থ হউক, তাহাতে খছগ কোণ ওজচ কোণের সমান হইবে এবং খকগ কোণ ওঘচ সমান হইবে।

খছগ কোণ যদি ওজচ কোণের সমান হয় তবে স্পাই দেখা যাইতেছে যে (৩।২০) খকগ কোণ ওঘচ কোণের সমান হইবে। যদি তাহা না হয় তবে একটা অন্যাপেক্ষা অধিক হইবে, খছগ যেন অধিক, পরে খছ রেখার ছ বিল্যুতে খছট কোণ ওজচ সমান কর (১।২০), এবং সমানহ কোণ সমানহ চাপের উপর থাকাতে (৩।২৬) খট চাপ ওচ চাপের সমান। কিন্তু ওচ খগ সমান, স্মত্রাং খট ও খগ সমান, ইহা অসাধ্য কেননা খট লঘুতর, অতএব খছগ কোণ ওজচ কোণের





অসনান নহে অর্থাৎ ইহারা সমান। অনন্তর ক কোণ ধছগ কোণের অর্দ্ধ এবং ঘ কোণ ওজচ কোণের অর্দ্ধ স্থতরাং ক কোণ ও ঘ কোণ পরস্পার সমান। অতএব সমান২ বৃত্তেতে, ইত্যাদি।


সং উ। যাঁদি \angle থছণ \neq \angle ওজচ তবে \angle থছট — ওজচ হউক \therefore থট চাপ — ওচ চাপ (৩। ২৬) কিন্তু খণ চাপ — ওচ (কল্পনা) \therefore থট চাপ — থণ চাপ, ইহা অসাধ্য (১। ৯ ম. সা.) \therefore \angle থছণ — \angle ওজচ। \angle থকণ — \oint \angle থছণ এবং \angle ওঘচ — \oint \angle ওজচ (৩।২০) \therefore \angle থকণ — \angle ওঘচ।

PROP. XXVIII. THEOR.

In equal circles, equal straight lines cut off equal arches, the greater equal to the greater, and the less to the less.

Let ABC, DEF be equal circles, and BC, EF equal straight lines in them, which cut off the two greater arches BAC, EDF, and the two less BGC, EHF: the greater BAC is equal to the greater EDF, and the less BGC to the less EHF.

Take (1.3.) K, L, the centres of the circles, and join BK, KC, EL LF: and because the circles are equal, the straight lines from their centres are equal;



therefore BK, KC are equal to EL, LF; but the base BC is also equal to the base EF: therefore the angle BKC is equal (8.1.) to the angle ELF: and equal angles stand upon equal (26.3.) arches, when they are at the centres: therefore the arch BGC is equal to the arch EHF. But the whole circle ABC is equal to the whole EDF: the remaining part therefore, of the circumference, viz. BAC, is equal to the remaining part EDF. Therefore, "in equal circles," &c. Q. E. D.


Sym. Dem. ⊙ABC = ⊙DEF (Hyp.) ∴ BK = EL, and KC = LF. And BC = EF (Hyp.) ∴ ∠BKC = ∠ELF (8.1.) ∴ arc BGC = arc EHF (26.3.) ∴ ⊙ABC—arc BGC = ⊙DEF—arc EHF, that is arc BAC = arc EDF.

২৮ প্রতিজ্ঞা উপপাদ্য।

সমান্থ বৃত্তেতে সমান্থ সরল রেখা সমান্থ চাপ ছেদ করে, ভাহাতে বৃহত্তর বৃহত্তরের, ও লঘ্তর লঘ্তরের সমান হয়।

কথণ, ঘণ্ডচ ছুই সমানং বৃত্ত, এবং খণ, ওচ তাহাদের মধ্যে ছুই সমানং সরল রেখা খকণ ও ওঘচ ছুই বৃহত্তর খণ্ড এবং খছণ ও ওজচ ছুই লঘুতর খণ্ড ছেদ করিতেছে। থকণ বৃহত্তর খণ্ড ওঘচ বৃহত্তরের সমান, এবং খছণ লঘুতর খণ্ড ওজচ লঘুত্তরের সমান হইবে।

ছই বৃত্তের কেন্দু ট, ঠ, নির্ণয় কর পরে খট, গট, ঠচ ওঠ, রেখা টান। ছই বৃত্ত সমান হওয়াতে তাহাদের কেন্দু হইতে



অস্কিত রেখাও সমান ছইবে একারণ খট ও টগ, ওঠ ও ঠচ সমান এবং খগ ভূমিও ওচ সমান ,তল্লিনিত্তে (১।৮) খটগ কোণ ওঠচ কোণের সমান। আর কেন্দুস্থ কোণ সমান ছইলে সমান২ চাপের উপরিস্থ হয় (৩।৬) স্থতরাং খছগ চাপ ওজচ চাপের সমান। অপর সমুদয় কখগ ঘঙচ সমান, একারণ পরিধিস্থ অবশিফিখকগ চাপও ওঘচ চাপের সমান ছইবে। অতএব সমান২ বৃত্তেতে, ইত্যাদি।


সং উ। কথগ \odot = ঘঙচ \odot (কল্পনা) \therefore থট = ঙঠ, এবং টগ = ঠচ। অপর থগ = ঙচ (কল্পনা) \therefore \angle থটগ = \angle ঙঠচ (১।৮) \therefore থছগ চাপ = ঙজচ চাপ (৩। ২২) \therefore কথগ \odot — থছগ চাপ = ঘঙচ \odot — ঙজচ চাপ, অথাৎ থকগ চাপ = ঙঘচ চাপ।


PROP. XXIX. THEOR.

In equal circles equal arches are subtended by equal straight lines.

Let ABC, DEF be equal circles, and let the arches BGC, EHF also be equal; and join BC, EF: the straight line BC is equal to the straight line EF.

Take (1.3.) K, L, the centres of the circles, and join BK, KC, EL, LF; and because the arch BGC is equal to the arch EHF, the angle BKC is equal (27.3.) to the angle ELF: also because the circles ABC, DEF are equal, their radii are equal: therefore BK,





KC are equal to EL, LF; and they contain equal angles: therefore the base BC is equal (4.1.) to the base EF. Therefore, "in equal circles," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. Arc BGC = arc EHF (Hyp.) \therefore \angle BKC = \angle ELF (27. 3.) and \bigcirc ABC = \bigcirc DEF (Hyp.) \therefore BK = EL, KC = LF, \therefore (4. 1.) BC = EF.

PROP. XXX. PROB.

To bisect a given arch, that is, to divide it into two equal parts.

Let ADB be the given arch; it is required to bisect it.

Join AB, and bisect (10. 1.) it in C; from the point C draw CD at right angles to AB, and join AD, DB: the arch ADB is bisected in the point D.


Because AC is equal to CB, and CD common to the


২৯ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

সমানং বৃত্তেতে সমানং চাপের সম্মুখস্থ সরল রেখাও সমান হইবে।

কথগ, ঘণ্ডচ সমান২ বৃত্ত, তাহার নধ্যে খছগ চাপ ওজচ চাপের সমান। খ গ ও ও চ সংযুক্ত কর। খপ সরল রেখা ওচ সরল রেখার সমান হইবে।

ছুই বৃত্তের কেন্দ্র ট ঠ নির্ণয় কর খট, টগ, ও ঙঠ, ঠচ রেখা টান। অপর খছগ চাপ গুজচ চাপের সমান হওয়াতে (৩। ২৭) খটগ কোণও ঙঠচ কোণের সমান, আর ছুই বৃত্ত সমান






হওয়াতে তাহাদের কর্কট রেখাও সমান এজন্য খট ও টগ, ৬১ ও ১৮ সমান, এবং ইহাদের মধ্যস্থ কোণ্ড সমান, স্মৃতরাং খগ ভূমি ৬৮ ভূমির সমান (১। ৪)। অতএব সমানং বৃত্তেতে, ইত্যাদি।

সং উ.। থছণ চাপ = গুজচ চাপ (কল্পনা) ∴ ∠খটণ == ∠ঙঠচ (৩। ২৭) এবং কখণ⊙ = ঘণ্ডচ⊙ (কল্পনা) ∴ খট == গুঠ, টগ == ঠচ ∴ (১। ৪) খণ = গুচ।

৩০ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক নির্দ্দিত চাপকে দিখণ্ড অর্থাৎ ছুই সমান ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

কঘখ নির্দ্দিন্ট চাপ, ইহাকে দ্বিখণ্ড করিতে হইবে। কথ রে,খা টানিয়া গ বিন্দুতে দ্বিখণ্ড কর (১। ১০) এবং গ হইতে গক্ষ রেখা কথ উপর লম্বভাবে টান এবং ক ম triangles ACD, BCD, the two sides AC, CD are equal to the two BC, CD; but the angle ACD is also equal to the angle BCD, because each of them is a right angle; therefore the base AD is equal (4. 1.) to the base



BD. But equal straight lines cut off equal (28.3) arches, the greater equal to the greater, and the less to the less; and AD, DB are each of them less than a semicircle, because DC passes through the centre (Cor. 1.3). Wherefore the arch AD is equal to the arch DB: and therefore the given arch ADB is bisected in D. Which was to be done.

Sym. Dem. AC = CB by (constr.) DC common to \triangle s ACD, DCB and \angle ACD = \angle DCB (being Rt. \angle s) \therefore (4.1) AD = DB \therefore are AD = are DB (28.3.) each being less than $\frac{1}{2}\bigcirc$ for DC passes through the centre (cor. 1.3.)

PROP. XXXI. THEOR.


In a circle, the angle in a semicircle is a right angle; but the angle in a segment greater than a semicircle is less than a right angle; and the angle in a segment' less than a semicircle is greater than a right angle.

Let ABCD be a circle, of which the diameter is BC, and centre E; draw CA dividing the circle into the segments ABC, ADC, and join BA, AD, DC; the angle in the semicircle BAC is a right angle, and the angle in the segment ABC, which is greater than a semicircle, is less than a right angle: and the angle in the segment ADC, which is less than a semicircle, is greater than a right angle.

Join AE, and produce BA to F; and because BE is equal to EA, the angle EAB is equal (5.1.) to EBA; also because AE is equal to EC, the angle EAC is equal to ECA: wherefore the whole angle BAC is equal to the two angles ABC, ACB. But FAC, the exterior

ও ঘ খ সংযুক্ত কর। কঘখ চাপ ঘ বিন্তুতে দ্বিখণ্ড হইল।

কগ গখ সমান, এবং গঘ কঘগ ও গঘখ ত্রিভুজের সামান্য বাস্থ্য, একা-রণ কগ গঘ ক্রমশ খগ গঘ সমান, এবং কগঘ কোণ্ও খগঘ কোণের সমান কেননা ইহারা প্রত্যেকে সম-



কোণ, স্তরাং (১। ৪) কঘ ভূমি খঘ ভূমির সমান। অপর সমানং সরল রেখা সমানং চাপ ছেদ করিলে, বৃহত্তর বৃহত্তরের, ও লঘুতর লঘুতরের সমান হয় (৩।২৮), আর কঘ, খঘ প্রত্যেকে অর্ক্রবৃত্ত হইতে লঘুতর কেননা (৩। ১ অন্থ) গঘ কেন্দ্র দিয়া যাইবে, অতএব কঘ চাপ খঘ সমান স্থতরাং কঘখ চাপ ঘ বিন্দুতে দ্বিখণ্ড হইয়াছে, ইহাই এস্থলে সম্পাদ্য।

সং উ.। কগ = গখ (অস্ক পাত) ঘগ, কগঘ ও ঘগথ ত্রিভূ-জের সামান্য বাহু, এবং ∠কগঘ = ∠ঘগথ (কেননা সম কোণ) ∴ (১।৪) কঘ == ঘখ ∴ কঘ চাপ == ঘখ চাপ (৩।২৮) কেননা প্রত্যেকে

(৩।১, অমু)।

৩১ প্রতিজ্ঞ;—উপপাদ্য।

বৃত্তের মধ্যে অর্দ্ধবৃত্তস্থ কোণ সমকোণ, অর্দ্ধবৃত্তের অধিক খণ্ডত্ব কোণ সমকোণের স্থান, এবং অর্দ্ধ বৃত্তের লঘুতর খণ্ডস্থ কোণ সমকোণের অধিক হইবে।

কখগঘ এক বৃত্ত, খগ ভাহার ব্যাস এবং ও কেন্দ্র। বৃত্তকে কখগ, কঘগ দুই থণ্ডে বিভক্ত করত কগ রেখা টান এবং ক খ, ও ক ঘ, ও গ ঘ সংযুক্ত কর। খকগ অন্ধর্বত্তম্ব কোন সম-কোন, অন্ধর্বত্তর অধিক কখগ খণ্ডম্ব কোন লঘুকোন, এবং অন্ধ্বিত্তর লঘ্তর কঘগ খণ্ডম্ব কোন অধিক কোন।

ক ও সংযুক্ত করিয়া কথ চ পর্যান্ত বৃদ্ধি কর। খণ্ড কণ্ড সমান হওয়াতে (১।৫) ওকথ কোণ ওখক সমান হইবে, এবং কও গও সমান হওয়াতে ওকগ কোণ ওগক সমান, স্নৃতরাং সমুদ্য থকগ কোণ কথগ ও কগথ ছই কোণের যোগ তুলা। angle of the triangle ABC, is also equal (32.1.) to the two angles ABC, ACB; therefore the angle BAC is equal to the angle FAC, and each of them is therefore a right (7. Def. 1.) angle: wherefore the angle BAC in a semicircle is a right angle.

And because the two angles ABC, BAC of the triangle ABC are together less (17.1.) than two right angles, and BAC is a right angle, ABC must be less than a right angle; and therefore the angle in a segment ABC, greater than a semicircle, is less than a right angle.

Also, because ABCD is a quadrilateral figure in a

circle, any two of its opposite angles are equal (22. 3.) to two right angles; therefore the angles ABC, ADC are equal to two right angles; and ABC is less than a right angle; wherefore the other ADC is greater than a right angle. Therefore, "in a circle," &c. Q. E. D.

 \mathbf{B}


COR From this it is manifest, that if one angle of a triangle be equal to the other two it is a right angle, because the angle adjacent to it is equal to the same two; and when the adjacent angles are equal, they are right angles.

Sym. Dem. BE = AE \therefore \angle ABE = \angle BAE (5. 1.) Similarly \angle ACE = \angle EAC \therefore \angle ABC + \angle ACB = \angle BAC. But \angle FAC = \angle ABC + \angle ACB (32. 1.) = \angle BAC \therefore \angle BAC is a Rt. \angle (7. Def. 1.)

Next $\angle ABC + \angle BAC \angle 2$ Rt. $\angle s$ (17. l.) and $\angle BAC$ is a Rt. $\angle ... \angle ABC \angle a$ Rt. $\angle ... \angle ADC = 2$ Rt. $\angle ... \angle ADC = 3$ Rt.

অপর কথা তিভুজের বহিস্থ চকণ কোণও (১। ৩২) কথা, কণথ ছই কোণের যোগ তুল্য, অতএব থকণ কোণ চকণ কোণের সমান, স্থৃত্রাং (১। ৭ সং) ইহারা প্রত্যেকে সম-কোণ, অতএব অদ্ধ্ বৃত্তস্থ থকণ কোণ এক সমকোণ।

অপর কথা তিভুজের কথা ও থকা ছই কোন একত্র ছই সম-কোন হইতে স্থান (১। ১৭), এবং থকা স্বয়ং এক সমকোন, স্কৃত্রাং কথা কোন অবশ্য সমকোন হইতে স্থান হইবে, এই রূপে অদ্ধৃ বৃত্তের অধিক কথা খণ্ডস্থ কোন সমকোন হইতে স্থান হইতে স্থান হইবে।



পুনশ্চ (৩। ২২) বৃত্তের মধ্যে

চতুর্তুজ ক্ষেত্র থাকিলে তাহার সম্মুখস্থ ছই কোণ একত্র ছই সমকোণ তুলা, একারণ কথগ, কঘগ ছই কোণ একত্র ছই সমকোণ তুলা তাহার মধ্যে কথগ সমকোণ হইতে আন স্মৃতরাং কঘগ সমকোণ হইতে অধিক হইবে। অতএব বৃত্তের মধ্যে, ইত্যাদি।

অনুমান। এন্থলে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ত্রিভুজের এক কোণ যদি অন্য তুই কোণের সমান হয় তবে সে সমকোণ, কেননা তাহার সমীপত্ব কোণও ঐ তুই কোণের তুল্য, আর সমীপত্ব তুই কোণ সমান হইলে প্রত্যেকে সমকোণ হয়।

সং উ.। খণ্ড — কণ্ড \cdot . \angle কখণ্ড — \angle খকণ্ড (১।৫) তদ্ধপ্প \angle কগণ্ড — * \angle গ্ডকগ \cdot . \angle কখণ + \angle কগণ্থ = \angle থকগ । অপর \angle চকণ — \angle কখণ + \angle কগণ্থ (১। ৩২) — \angle থকগ সমকোণ (১। ৭ সং)।


পুনশ্চ, \angle কথগ + \angle থকগ \angle ২সমকোণ (১। ১৭) এবং \angle থকগ এক সমকোণ \cdot . \angle কথগ \angle সমকোণ \cdot অপিচ, \angle কথগ + \angle কঘগ = ২সম \angle (৩।২২) এবং \angle কথগ \angle সমকোণ \cdot . \angle কঘগ \neg সমকোণ \cdot

PROP. XXXII. THEOR.

If a straight line touch a circle, and from the point of contact a straight line be drawn cutting the circle, the angles made by this line with the line which touches the circle, are equal to the angles in the alternate segments of the circle.

Let the straight line EF touch the circle ABCD in B, and from the point B let the straight line BD be drawn cutting the circle: The angles which BD makes with the touching line EF are equal to the angles in the alternate segments of the circle: that is, the angle FBD is equal to the angle which is in the segment DAB, and the angle DBE to the angle in the segment BCD. From the point B draw (11. 1.) BA at right angles to EF, and take any point C in the arch BD, and join AD, DC, CB: and because the straight line EF touches the circle ABCD in the point B, and BA is drawn at right angles to it, from the point of contact

B, the centre of the circle is (19.3.) in BA; therefore the angle ADB, in a semicircle, is a right (31.3.) angle, and consequently the other two angles BAD, ABD are equal (32.1.) to a right angle: but ABF is likewise a right angle: therefore the angle ABF is equal to the angles BAD, ABD: Take from these equals the




common angle ABD; and there will remain the angle DBF equal to the angle BAD, which is in the alternate segment of the circle. And because ABCD is a quadrilateral figure in a circle, the opposite angles BAD, BCD are equal (22. 3.) to two right angles; therefore the angles DBF, DBE, being likewise equal (13. 1.) to two right angles, are equal to the angles BAD, BCD; and DBF has been proved equal to

৩২ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

কোন সরল রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করিলে যদি স্পর্শচিহ্ন হইতে বৃত্তকে ছেদে করিয়া সরল রেখা টানা যায় তবে সেই রেখা ও স্পর্শক রেখাতে উৎপন্ন কোণ অপর পার্শ্বের খণ্ডস্থ কোণের স্থান হইবে।

ওচ সরল রেখা কথগঘ বৃত্তকে থ বিন্দুতে স্পর্শ করুক এবং থ বিন্দু হইতে থঘ রেখা বৃত্তকে ছেদ করিয়া টানা যাউক, তাহাতে থঘ ও স্পর্শক ওচ রেখার সম্পাতে যে২ কোণ উৎপন্ন হইবে তাহারা অপর পর্শের থওস্থ কোণের সমান হইবে, অর্থাৎ চথঘ কোণ ঘকথ থওস্থ কোণের সমান এবং ঘথও কোণ, খগঘ থওস্থ কোণের সমান হইবে।

খ বিশ্চুতে খক, ওচ উপর
লয় তাবে টান (১। ১১) এবং
খঘ চাপের মধ্যে কোন বিশ্চু
যথা গলও এবং কঘ, গঘ, খগ
রেখা টান। ওচ সরল রেখা খ
বিশ্চুতে কখগঘ বৃত্তকে স্পাশ
কৈরিতেছে এবং খক ভাহার উপর স্পাশ চিহ্ন খ হইতে লয়- ড



ভাবে অক্ষিত হইয়াছে একারণ (৩। ১৯) বৃত্তের কেন্দ্র কথা রেখাতে আছে, অতএব অর্ক্বৃত্তম্থ কঘথ কোণ এক সমকোণ (৩। ৩১), সূত্রাং থকঘ ও কথঘ অন্য ছই কোণ একত্র এক সমকোণ (১,৩২)। অপর কথচ এক সমকোণ একারণ কথাচ কোণ থকঘ ও কথঘ ছই কোণের যোগ তুল্য, অতএব সামান্য কথঘ কোণ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ঘথচ কোণ থকঘ সমান হইবে, ইহাই অপর পার্শ্বের থণ্ডম্থ কোণ। অপর কথ-গঘ বৃত্তের মধ্যে এক চতুর্জ ক্ষেত্র হণ্ডয়াতে থকঘ, থগঘ ছই সম্মুথম্ব কোণ একত্র ছই সমকোণ তুল্য (৩।২২), আরু ঘখঙ্গু ঘ্রাণ (১।১৩) ছই সমকোণ তুল্য হইয়া থক্য প্রগঘ ছই কোণের যোগ সমান হইবে তাহার মধ্যে ঘ্র

BAD: therefore the remaining angle DBE is equal to the angle BCD, in the alternate segment of the circle. Wherefore, "if a straight line," &c. Q. E. D.

Sym. Dem. BA \perp EF (by constr.) \therefore the centre is in AB (19.3.) \therefore \angle ADB is a Rt. \angle (31.3.) \therefore \angle BAD + \angle ABD = a Rt. \angle (32.1.) = ABF \therefore \angle BAD = \angle DBF. Again, \angle BAD + \angle BCD = 2Rt. \angle s (22.3.) = \angle DBF + \angle DBE (13.1.) \therefore \angle BCD = \angle DBE.


PROP. XXXIII. PROB.

Upon a given straight line to describe a segment of a circle, containing an angle equal to a given rectilineal angle.

Let AB be the given straight line, and the angle at C the given rectilineal angle; it is required to describe upon the given straight line AB a segment of a circle, containing an angle equal to the angle C.

First, Let the angle at C be a right angle; bisect (10.1.) AB in F, and from the centre F, at the distance FB, describe the semicircle AHB; the angle

AHB being in a semicircle is (31. 3,) equal to the right angle at C. But, If the angle C be not a right angle, at the point A, in the straight line* AB, make (23. 1.) the angle BAD equal to the



angle C, and from the point A draw (11. 1.) AE at right angles to AD; bisect AB (10. 1.) in F, and from F. draw (11. 1.) FG at right angles to AB and join GB: Then because AF is equal to FB, and FG common to the triangles AFG, BFG, the two sides AF, FG are equal to the two BF, FG; but the angle AFG is also equal to the angle BFG; therefore the base

থক্য সনান উপপন্ন হইয়াছে স্কুত্রাং অবশিকী ঘথঙ তাহার অপর পার্শ্বের খণ্ডস্থ খগ্য কোণ সমান হইবে। অতএব কোন সরল রেখা, ইত্যাদি।


সং উ.। থক \bot ওচ (অস্ক পাত) \therefore কথ নধ্যে কেন্দ্র হইবে (১।১৯) \therefore \angle কঘথ এক সনকোন (৩।৩১) \therefore \angle থকঘ + \angle কথয == সন \angle (১।৩২) == কথচ \therefore \angle থকঘ == \angle ঘথচ। পুন*চ, \angle থকঘ + \angle থগঘ == ২মনকোন (৩।২২) == \angle ঘথচ + \angle ঘথঙ (১।১৩) \therefore \angle থগঘ == \angle ঘথঙ।

৩৩ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক নির্দ্দিন্ট সরল রেখার উপর এক নির্দ্দিন্ট সরলবৈথিক কোণের সমান কোণ বিশিক্ট বৃত্তথণ্ড অঙ্কিত করিতে হইবে। কথ নির্দ্দিন্ট সরল রেখা এবং গ নির্দ্দিন্ট সরলরৈথিক কোণ।

কথ নির্দিউ সরল রেখা এবং গ নির্দিউ সরলরৈখিক কোণ। কথ নির্দিউ সরল রেখার উপর গ কোণের সমান কোণ বিশিষ্ট এক বৃত্তখণ্ড অঙ্কিত করিতে হইবেক।

প্রথমতং, গ কোণ যেন সমকোণ কল্পনা কর। কথ চ
বিন্তুতে দিখণ্ড কর (১। ১০),
এবং চ কেন্দ্র হইতে চথ দূরে
কজথ অন্ধৃত্ত অক্ষিত কর।





কজখ অন্ধ বৃত্তত্ব হওয়াতে গ সমকোণ তুলা হইতেছে (৩। ৩১)। দিতীয়তঃ গ যদি সমকোণ না হয় তবে * কখ রেখায় ক বিন্দৃতে ঘকখ কোণ গ সমান অঙ্কিত কর (১।২৩) এবং ক বিন্দু হইতে কঙ, কঘ উপর লম্বভাবে টান (১।১১), কখ রেখা চ বিন্দুতে দিখণ্ড কর, (১।১০), এবং চ হইতে চছ কখ উপর লম্বভাবে টানিয়া ছ খ সংযুক্ত কর। কচ চখ সমান, ও চছ কচছ, খচছ ত্রিভুজের সামান্য বাছ স্মতরাং কচ, চছ ছই বাছ ক্রমশ খচ, চছ তুলা, এবং কচছ কোণ্ড, খিচছ সমান,

^{*} পর পৃষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃষ্টি কর।

AG is equal (4.1.) to the base GB; and the circle described from the centre G, at the distance GA, will

pass through point B: let this be the circle AHB: And because from point A, the extremity of the diameter AE, AD is drawn at C right angles to AE, therefore AD (Cor. 16. 3.) touches the circle: and because AB, drawn from the point of contact A. cuts the circle, the angle DAB is equal to the angle in the alternate segment AHB (32, 3.); but the angle DAB is equal to the angle C, therefore also the angle C is equal to the angle in the segment AHB: Wherefore, upon the given straight line AB, a segment, AHB, of






a circle is described which contains an angle equal to the given angle at C. Which was to be done.


Sym. Dem. First. $\angle C$ is a Rt. \angle (Hyp.) $\angle AHB$ is a Rt. \angle (31. 3.) \therefore $\angle AHB = \angle C$.

Secondly. $\angle C \neq a$ Rt. \angle (Hyp.) AF = FB (by constr.) GF common to $\triangle s$ AFG, GFB and \angle AFG = \angle BFG (by constr.) \therefore AG = GB (4. 1.), \therefore a \odot described from centre G at the distance GA will pass through B, and AD will touch it (cor. 16. 3.) \therefore \angle BAD = \angle in seg. AHB (32. 3.) But \angle BAD = \angle C \therefore \angle C = \angle in seg. AHB.

একারণ (১। ৪) কছ ভূমি খছ ভূমির সমান, স্থতরাং ছ কেন্দ্র হইতে ছক দূরে বৃত্ত জাঁকিলে খ বিন্দু দিয়া যাইবে। সে বৃত্ত

যেন কজথ ইউক। অপর কণ্ড ব্যাসের ক প্রান্ত হই-তে কঘ কণ্ড উপর লয় অঙ্কিত হওয়াতে কঘ বৃত্ত-কে স্পর্শ করিতেছে (৩) ১৬ অনু), আর স্পর্শ চিহ্ন ক হইতে কথ অক্সিত হইয়া বত্তকে ছেদ করিতেছে এ-জন্য ঘকথ কোণ অপর পার্শ্বের কজথ খণ্ডস্থ কো-ণের সমান হইতেছে (৩। ৩২), এবং ঘকথ কোণ গ কোণ সমান হওয়াতে কজ-খ খণ্ডস্থ কেণ্ডিগ কোণ সমান হইতেছে। অতএব 🖛 খ নির্দ্দি ভাসরল রেখার উপর গ কোণ সমান কোণ বিশিষ্ট কজখ এক বৃত্তখণ্ড অন্ধিত হইয়াছে, ইহাই এন্তলে সম্পাদ্য।





সং উ.। প্রথমতঃ, ∠গ সমকোণ (কল্পনা) ∠কজখ এক সম ∠ (৩।৩১) ∴ ∠কজখ = ∠গ। দ্বিতীয়তঃ, ∠ গ ≠ সমকোণ (কল্পনা) কচ = চথ (অঙ্কপাত) ছচ, কচছ, ছচখ বিভুজের সামান্য বাহু এবং ∠কচছ = ∠খচছ (অঙ্কপাত) ∴ কছ = ছখ (১।৪), ∴ ছ কেন্দু ইইতে ছক দূরে ⊙অঙ্কিত ইইলে খ দিয়া যাইবে এবং কঘ তাহাকে স্পর্শ করিবে (৩।১৬ অফু) ∴ ∠থকঘ = কজখ খণ্ডন্থ কোণ (৩।৩২) কিন্তু ∠খকঘ = ∠গ ∴ ∠গ = কজখ খণ্ডন্থ কোণ।


PROP. XXXIV. PROB.

To cut off a segment from a given circle which shall contain an angle equal to a given rectilineal angle.

Let ABC be the given circle, and D the given rectilineal angle; it is required to cut off a segment from the circle ABC which shall contain an angle equal to the angle D.

Draw (17. 3.) the straight line EF touching the cir-

cle ABC in the point B, and at the point B, in the straight line BF, make (23.1.) the angle FBC equal to the angle D; therefore, because the straight line EF touches the circle ABC, and BC is drawn from the point of contact B, the angle FBC is equal (32.3.) to the



angle in the alternate segment BAC: but the angle FBC is equal to the angle D: therefore the angle in the segment BAC is equal to the angle D: wherefore the segment BAC is cut off from the given circle ABC, containing an angle equal to the given angle D. Which was to be done.

Sym. Dem. $\angle FBC = \angle$ in seg. BAC (32.3.) $\angle FBC = \angle D$ (by constr.) $\therefore \angle D = \angle$ in seg. BAC.

PROP. XXXV. THEOR.

If two straight lines within a circle cut one another, the rectangle contained by the segments of one of them is equal to the rectangle contained by the segments of the other.

Let the two straight lines AC, BD, within the cir-


৩৪ প্রতিজ্ঞা—সম্পাদ্য।

এক নির্দ্দিষ্ট বৃত্ত হইতে নির্দ্দিষ্ট সরলরৈথিক কোণের সমান কোণ বিশিষ্ট খণ্ড ছেদ করিতে হইবে।

কথগ নির্দ্দি কৃত্ত এবং ঘ নির্দ্দি করলরৈথিক কোণ। কথগ বৃত্ত হইতে ঘ কোণ সমান কোণ বিশিক্ট এক খণ্ড ছেদ করিতে হইবেক।

কথা বৃত্তকেখ বিন্তুতে

স্পর্শ কারক ওচ সরল
রেখা টান (৩। ১৭),
এবং ওচ সরল রেখার খ
বিন্তুতে চখাগ ঘ কোণ
সমান অঙ্কিত কর (১।
২৩)। অপর ওচ সরল রেখা
খকগ বৃত্তকে স্পূর্শ করি
সকাব বৃত্তকে স্পূর্ণ করি
সকাব বিত্তক সকাব বিত্তক সকাব বিত্তক সকাব বিত্তক সকাব বিত্তক ব



তেছে এবং স্পর্শ চিহ্ন থ হইতে খগ টানা গিয়াছে একারণ চখগ কোণ অপর পার্শ্বের খণ্ডন্থ খকগ কোণের সমান (৩। ৩২), কিন্তু চখগ কোণ ঘ কোণ মমান, স্মৃতরাং খকগ খণ্ডন্থ কোণ ঘ কোণের সমান, অতএব নিদ্দিষ্ট কখগ বৃত্ত হইতে নিদ্দিষ্ট ঘ কোণ সমান কোণ বিশিষ্ট খকগ খণ্ড ছিন্ন হইয়াছে, ইহাই এন্থলে সম্পাদ্য।

সং উ.। ∠চথগ — থকগ খণ্ডস্থ কোণ (৩।৩২) ∠চথগ — ∠ঘ (অঙ্কপাত) ∴ ∠ঘ — থকগ খণ্ডস্থ কোণ।


৩৫ প্রতিজ্ঞা—উপপাদ্য।

বৃত্ত নধ্যস্থ ছুই সরল রেখা পরস্পর ছিন্ন করিলে একটীর ছুই খণ্ডের আয়ত অন্যটীর ছুই খণ্ডের আয়ত তুল্য হুইবে।

কথগঘ বৃত্তের মধ্যে কগ, খঘ, ছুই সরলরেখা ও বিন্দুতে পরস্পরকে ছিন্ন করুক, কঙ, ঙগ অন্তর্গত আয়ত খঙ, ঙঘ অন্তর্গত আয়তের সমান।


cle ABCD, cut one another in the point E: the rectangle contained by AE, EC is equal to the rectangle contained by BE, ED.

If AC, BD pass each of them through the centre, so that E is the centre, it is evident, that AE. EC, BE, ED, being all equal, the rectangle AE.EC is equal to the rectangle BE.ED.




But, Let one of them BD pass through the centre. and cut the other AC, which does not pass through the centre, at right angles in the point E: then, if

BD be bisected in F, F is the centre of the circle ABCD; ioin AF: and because BD. which passes through the centre. cuts the straight line AC. which does not pass through the centre, at right angles in E, **AE**, EC are equal (3.3.) to one another: and because the straight line BD is cut into two equal parts, in the point F, and into two unequal, in the point E,




 $BE.ED + EF^2 = (5, 2.) FB^2 = AF^2$. But AF^2 = (47. 1.) $AE^2 + EF^2$, therefore $BE.ED + EF^2 =$ $AE^2 + EF^2$, and taking EF^2 from each, BE.ED = $AE^2 = AE.EC.$


Next, Let BD, which passes through the centre, cut the other AC, which does not pass through the centre, in E, but not at right angles: then, as before, if BD be bisected in F, F is the centre of the circle. Join AF, and from F draw (12. 1.) FG perpendicular to AC: therefore AG is equal (3. 3.) to GC; wherefore AE.EC + (5. 2.) $EG^2 = AG^2$, and adding GF^2 to both, AE.I.C + EG²



যদি কগ, খঘ প্রত্যেকে কেন্দু দিয়া যায় অর্থাৎ ও যদি কেন্দ্র হয় তবে স্পাফ দেখা যাইতেছে যে কঙ, ওগ, খঙ, ওঘ সকলি সমান হওয়াতে কঙ, ওগ আয়ত খঙ, ওঘ আয়তের সমান হইবে।




অনন্তর ইহাদের একটা অর্থাৎ
থঘ কেন্দুগত হইয়া অন্যটা অর্থাৎ
কগ কেন্দুগত না হইলে তাহাকে
ও বিন্দুতে লম্বভাবে ছেদ করুক,
তাহাতে থঘ চ বিন্দুতে দিখণ্ডিত
হইলে চ কথগঘ বৃত্তের কেন্দু
হইবে। পরে ক চ সংযুক্ত কর
এবং থঘ কেন্দুগত হইয়া কগ রেখা



কেন্দুগত না ইইলে তাহাকে ও বিন্দুতে লয়ভাবে ছেদ করাতে কঙ, ওগ পবস্পর সমান হইতেছে (৩।৩), এবং খঘ সরল রেখা চ বিন্দুতে দুই সমান ভাগে ও ও বিন্দুতে দুই অসমান ভাগে বিভক্ত হওয়াতে (২।৫) খঙ.ঙঘ + ৬ $5^2 = 5$ ৩ $^2 = 6$ 0

পুনশ্চ, খঘ কেন্দুগত হইয়া কণ কেন্দুগত না হইলে তাহাকে ও বিন্তু তে লম্বভাব ব্যতিরেকে ছিন্ন করুক, তাহাতে পূর্ক্বং খঘ চ বিন্তুতে দিখণ্ডিত হইলে চ বৃত্তের কেন্দু হইবে। ক চ সংযুক্ত কর, কগ উপর চ হইতে চছ লম্বপাত কর (১।




১১), অতএব কছ ছগ সমান (৩। ৩), একারণ কণ্ড.ঙগ

+ GF^2 = AG^2 + GF^2 . Now, EG^2 + GF^2 = EF^2 , and AG^2 + GF^2 = AF^2 ; therefore AE.EC + EF^2 = AF^2 = FB^2 . But FB^2 = BE.ED + (5. 2.) EF^2 , therefore AE.EC + EF^2 = BE.ED + EF^2 , and taking EF^2 from both, AE.EC = BE.ED.

Lastly, Let neither of the straight lines AC, BD

pass through the centre: take the centre F, and through E, the intersection of the straight lines AC, DB, draw the diameter GEFH: and because, as has been shown, AE.EC=GE.EH, and BE.ED=GE.EH; therefore AE.EC=BE.ED. Wherefore, "if two straight lines," &c. Q. E. D.




PROP. XXXVI. THEOR.

If from any point without a circle two straight lines be drawn, one of which cuts the circle, and the other touches it; the rectangle contained by the whole line which cuts the circle, and the part of it without the circle, is equal to the square of the line which touches it.


Let D be any point without the circle ABC, and CA, DB two straight lines

DCA, DB two straight lines drawn from it, of which DCA cuts the circle, and DB touches it: the rectangle AD DC is equal to the square of DB. Either DCA passes through the centre, or it does not; first, Let it pass through the centre E, and join EB; therefore the angle EBD is a right (18.3.) angle: and because the straight line AC is bisected in E, and produced to the point D, AD.DC + EC² (6.2.) ED². But EC



+ ওছ' = কছ' (২।৫), এবং উভয়ে চছ' যোগ করিলে
কড.৬গ + ওছ' + চছ' = কছ' + চছ'। অপর ওছ' + চছ'
= ৬৮' এবং কছ' + চছ' = কচ' অতএব কঙ.ওগ + ৬৮'
= কচ' = চখ'। কিন্তু চখ' = খড.ওঘ + ৬৮' (২।৫)
স্থৃতরাং কড.ওগ + ৬৮' = খড.ওঘ + ৬৮' এবং উভয়তঃ
৬৮' বিয়োগ করিলে কড়.ওগ = খড.ওঘ।

অবশেষে, কগা, খ্য জুই সরল রেখার মথ্যে কোনটা যেন কেন্দু নিয়ানা যায়। চ কেন্দু নির্ণায় কর এবং কগা, খ্য জুই রেখার ছেদ চিহ্ন ও হইতে ছঙ্চজ ব্যাস টান, ভাহাতে পূর্ব্বোক্ত উপপত্যানুমারে ক কঙ্ঞা — ছঙ্জজ এবং খ্ডুড্ঘ — ছঙ্জজ একারণ কণ্ডাঙ্গ — খঙ্ড্য। অত্রব বৃত্ত মধ্যক্ত ইত্যাদি।




৩৬ প্রতিক্রা—উপপাদ্য।

বৃত্তের বহিস্থ কোন বিন্তু হইতে ছই সরলরেখা টানিলে যদি তাহাদের একটা বৃত্তকে ছিন্ন করে অন্যটা স্পর্ম করে, তবে যে রেখা বৃত্তকে ছিন্ন করে তাহার সমুদ্র এবং বহিস্থ অংশের আয়ত স্পূর্শক রেখার সমচতুর্জ তুলা হইবে।

কথগ বৃত্তের বহিস্ত এক চিহ্নু ঘ,
তথা হইতে অক্সিত ঘগক, ও ঘথ
ছুই সরলরেখা তাহার মধ্যে ঘগক
বৃর্ত্তকে ছেদ করিতেছে এবং ঘথ
স্পর্শ করিতেছে। কঘ.ঘগ আয়ত
ঘথ সমচতুর্ভুক্ত তুল্য।


ঘণক কেন্দুগত হইতে পারে না, হইতেও পারে প্রথমতঃ যেন ও কেন্দু দিয়া যায় তাহাতে ও খ সংযুক্ত কর, স্থতরাং ওখঘ এক সম-কোণ (৩ ৷ ১৮) এবং কগ সরলরেখা



= EB, therefore AD.DC + EB² = ED². Now ED² = (47. 1.) EB² + BD², because EBD is a right angle; therefore AD.DC + EB² = EB² + BD², and taking EB², from each AD.DC = BD².


But, if DCA do not pass through the centre of the

circle ABC take (1. 3.) the centre E, and draw EF perpendicular (12. 1.) to AC, and join EB, EC, ED: and because the straight line EF, which passes through the centre, cuts the straight line AC which does not pass through the centre at right angles, it likewise bisects (3. 3.) it; therefore AF is equal to FC; and because the straight line AC is bisected in F, and produced to D (6. 2.), AD. DC + FC² = FD²; add FE² to both, then AD.DC + FC² +




 $FE^2 = FD^2 + FE^2$. But (47. 1.) $EC^2 = FC^2 + FE^2$, and $ED^2 = FD^2 + FE^2$, because DFE is a right angle; therefore AD.DC + $EC^2 = ED^2 + Now$, because EBD is a right angle, $ED^2 = EB^2 + BD^2 = EC^2 + BD^2$, and therefore AD.DC + $EC^2 = EC^2 + BD^2$, and AD.DC = BD². Wherefore, "if from any point," &c. Q. E. D.

Con. If from any point without a circle, there be drawn two straight lines cutting it, as AEB, AFC, the rectangles contained by the whole lines and the parts of them without the circle, are equal to one another, viz. BAAE = CA.AF; for each of these rectangles is equal to the square of the straight line AD, which touches the circle.




ড বিন্দুতে দিখণ্ডিত হইয়া ঘ পর্যান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে একারণ (২।৬) কঘ.ঘগ + ঙগ² = ডঘ²। কিন্তু ডগ = ডথ স্ততরাং কঘ.ঘগ + ঙখ² = ডঘ²। অপর (১।৪৭) ডঘ² = ডথ² + থঘ² কেননা ওথঘ সমকোন স্ত্তরাং কঘ.ঘগ + ডথ² = ডথ² + থঘ² এবং উভয়তঃ ওথ² বিয়োগ করিলে কঘ.ঘগ = খঘ²।

দিতীয়তঃ, ঘগক যদি কখগ বৃত্তের কেন্দুগত ন। হয় তবে (৩।১) ও কেন্দু নির্ণয় কর এবং কগ উপর ওচ লয়পাত কর এবং ও খ, ও গ, ও ঘ সংযুক্ত কর। ওচ সরলরেখা কেন্দুগত হইয়া কগ কেন্দুগত না হইলে তাহাকে লয়ভাবে ছেদ করাতে দিখওও করিতেছে (৩।৩), স্মৃতরাং কচ চগ সমান, পরে কগ সরলরেখা চবিন্দুতে দিখওিত হইয়া ঘ পর্যান্ত



অমু.। বৃত্তের বহিস্থ কোন বিন্দু হইতে তুই সরলরেখা যথা কঙ্থ কচন যদি তাহাকে ছেদ করিয়া অঙ্কিত হয় তবে ঐ২ সমুদয় রেথা এবং তাহা-দের বৃত্তবহিস্থ অংশের অন্তর্গত আয়ত পরস্পার সমান অর্থাৎ থক.কঙ — গক.কচ কেননা এই প্রত্যেক আয়ত কঘ স্পাশ রেখার সমচতুতু জ তুল্য।




PROP. XXXVII. THEOR.

If from a point without a circle there be drawn two straight lines, one of which cuts the circle, and the other meets it; if the rectangle contained by the whole line, which cuts the circle, and the part of it without the circle, be equal to the square of the line which meets it, the line which meets also touches the circle.

Let any point D be taken without the circle ABC, and from it let two straight lines DCA and DB be drawn, of which DCA cuts the circle, and DB meets it; if the rectangle AD.DC be equal to the square of DB, DB touches the circle.

Draw (17. 3.) the straight line DE touching the circle ABC; find the centre F, and join FE, FB, FD; then FED is a right (18. 3.) angle; and because DE touches the circle ABC, and DCA cuts it, the rectangle AD.DC is equal (36. 3.) to the square of DE; but the rectangle AD.DC is, by hypothesis, equal to the square of DB, therefore the square of DE is equal to

the square of DB, and the straight line DE equal to the straight line DB; but FE is equal to FB, wherefore DE, EF are equal to DB, BF; and the base FD is common to the two triangles DEF, DBF; therefore the angle DEF is equal (8.1.) to the angle DBF; and DEF is a right angle, therefore also DBF is a right angle; but FB, if produced, is a diameter, and the straight line which is drawn at right angles to a diameter, from the extremity




of it, touches (16.3.) the circle: therefore DB touches the circle ABC. Wherefore, "if from a point," &c. Q. E. D.

৩৭ প্রতিজ্ঞা—উপপাদা।

বৃত্তের বহিন্ত কোন বিন্তু হইতে ছই সরলরেখা একটা বৃত্তকে ছিন্ন করিয়া অন্যটা বৃত্তেতে সংলগ্ন হইয়া অঙ্কিত হইলে যে রেখা বৃত্তকে ছিন্ন করে তাহার সমুদয় ও বহিন্ত অংশের আয়ত যদি সংলগ্ন রেখার সমচত্তুজ তুল্য হয় তবে সেই সংলগ্ন রেখা বৃত্তকে স্পাশ করিবে।

কথগ বৃত্তের বাহিরে ঘ এক বিন্তুর নিদেশ কর এবং তথা হইতে ঘণক ও ঘথ তুই সরলরেখ। টান তাহার মধ্যে ঘণক যেন বৃত্তকে ছেদ করে ও ঘথ বৃত্তে সংলগ্ন হয়। যদি কঘ.ঘণ আয়ত ঘথ সমততুর্গু জের সমান হয় তবে ঘথ বৃত্তকে স্পর্শ করিবে। কখণ বৃত্তের স্পর্শক ঘণ্ড রেখা টান, এবং চ কেন্দু নির্ণয় করিয়া চ ঙ, চ খ, চ ঘ সংযুক্ত কর, তাহাতে চণ্ডঘ সমকোণ লইবে (৩। ১৮)। এবং ঘণ্ড বৃত্তকে স্পর্শ করিতেছে ও ঘণক ছেদ করিতেছে একারণ কঘ.ঘণ আয়ত ঘণ্ড সমচতুভুজ তুলা (৩। ৩৬), কিন্তু কঘ.ঘণ আয়ত কল্পনামূসারে ঘখ

সমচত্ত্র তুলা স্তরাং ঘঙ সমচত্ত্র ঘথ সমচত্ত্র সমান, এবং
তমিনিভে ঘঙ সরলরেখা ঘথ রেখার
সমান, আর চঙ চথ সনান অতএব
ঘঙ, ওচ ক্রমশ ঘথ, থচ সহিত সমান,
এবং ঘচ, ঘঙচ ও ঘখচ উভয় ত্রিভ্
জের সামান্য ভূমি একারণ (১।৮)
ঘঙচ কোণ ঘথচ কোণের সমান, আর
ঘঙচ সমকোণ হওয়াতে ঘথচও সমকোণ। অপর খচ বৃদ্ধি পাইলে ব্যাস
হইবে, এবং ব্যাসের প্রান্ত হইতে লম্ব



টানিলে সেলম্ব বৃত্তকে স্পর্শ করে (৩। ১৬) স্থতরাং ঘথ কথগ বৃত্তকে স্পর্শ করিতেছে, অতএব বৃত্তের বহিস্থ, ইত্যাদি। Sym. Dem. AD.DC = BD² (Hyp.) AD.DC = DE² (36.3.) \therefore BD² = DE² \therefore BD = DE. BF = =EF (11. Def. 1.) FD common to \triangle s BFD, EFD \therefore (8.1.) \angle DEF = \angle DBF. But \angle DEF is a Rt. \angle (18.3.) \therefore DBF is a Rt. \angle \therefore DB touches the \bigcirc (16.3.)

END OF NO. II.



	ERR	ATA.	-
page	line	for	read
36	29	∠BDC	- BCD
37	11	DEF	EDF
52	16	DE	DF
64	33	DE	DF
58	85	BE	BF
90	22	2CB.BD2	SCB BD
107	30	\angle_{EFA}	\angle_{FEA}

সং উ.। কঘ.ঘগ = থঘ' (কল্পনা) কঘ.ঘগ = ঘঙ' (৩।৩৬) \cdot . থঘ 2 = ঘঙ' \cdot . থঘ = ঘঙ। থচ = ঙচ (১।১১ সং) চঘ, থচঘ, ওচঘ ত্রিভুজের সামান্য বাহু \cdot (১।৮) \angle ঘঙচ = \angle ঘথচ কিন্তু \angle ঘঙচ এক সমকোণ (৩।১৮) \cdot . ঘখচ এক সমকোণ \cdot . ঘথ \bigcirc স্পাশ করে (৩।১৬)।

সমাপ্তোয়ং কাওঃ।



পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ક્રેષ્ઠ	১৩, ১৪	কখগখ	কথগ
৬ ৪	২৯	কগঘ	কগধ
৫৩	>9	ঘচ	ঘঙ
49	२०	কডছ	গডছ
28 4	२९,२৮	পারে না,	পারে, না

No. III. (MISCELLANEOUS READINGS) will be published in June.

SCHOOL BOOKS, &c.

**Committees to the prices of the undermentioned Books.	Scho	ool
Shakspeare's Dramatic Works, large 8vo. cloth, Ditto, per dezen,		0
Bacon's Advancement of Learning. A new Edition, with Notes, and the Latin Quotations translated, Ditto, per dozen,	.2	0:
Bacon's Essays, and Locke on the Understanding,	1	4
Milton's Poetical Works, comprising Paradise Lost, Paradise Regained. Samson Agonistes, Lycidas, L'Allegro, Il Penseroso, Arcades, Comus. Sonnets, Odes, Miscellanies, Trans-	•	
' lations: with a Life of the Author, and Commendatory Verses, 18mo, cloth, Ditto, per dozen.	1	
Ditto, per dozen. Addison's Essays from the Spectator, 2 vols. 18mo. cloth, The Spectator, a new edition, with Biographical Notices of	3	0
the Contributors, and Engravings, complete in one vol. large 8vo cloth. Rasselas and Finarbas, royal 32mo. cloth.		0
Rasselas and Binarbas, royal 32mo. cloth, Campbell's Philosophy of Rhetoric, eleventh edition, 8vo. cl. Adam Smith's Theory of Moral Sentiments,	. 4	4 8 0
Ditto, per dozen. Hume and Smollett's England, 3 vols. 8vo. cloth,	36	0
Rollin's Ancient History, 3 vols. 8vo. or 1 vol. royal 8vo. cl. Miller's Philosophy of History, 4 vols. Tytler's Elements of General History, Ancient and Modern.	. 12 21	0
to which are added a Comparative View of Ancient and Modern Geography, and a Table of Chronology, with two Maps, a new edition, corrected and improved, 24mo. cloth.	ĺ	8 '
Peacock's Algebra (shortly expected.) Lennie's Grammar, 18mo, sheep.	0	14
Chambers' Exemplary and Instructive Biography, for the Study and Entertainment of Youth, Chambers' Educational Course, in sets of 38 vols.	1	12
Smith's Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, with a Life of the Author, complete in one	3	0
volume, 8vo, cloth, Pinnock's Catechism of the History of England,	. 4	8
Bitto, per dozen, Goldsmith's Miscellaneous Works, including his Essays, &c.	. 3	8
Hallam's Literary History, 4 vols. Svo. cloth, Edwards on Composition, Crombie's Etymology and Syntax,	. i	0 ' 8 8
h	. •	_

Large Alphabet, Capitals and Small Letters, printed on paper, royal 8vo. size, one pice each, or one rupee eight	th an	ick nas
Larger ditto ditto, imperial 4to. size, two pice each, or three		
per nungrea.		
Very large ditto ditto, four annas each. A large letter Primer, eight royal 8vo. pages, thick paper, two		;
each or twelve rupees per hundred.	an	nas
Arithmetical Tables, fourteen 12mo, pages, one anna each,	or	six
rupees per hundred. Buffon's Natural History containing a full and accounts		
Buffon's Natural History, containing a full and accurate Description of all the Animated beings in Nature, illustrated		
with two hundred engravings, 16mo. cloth,	2	o;
Burke's Philosophical inquiry into the origin of our Ideas	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
of the Sublime and Beautiful: with an Introductory Dis-		
course on Taste, 32mo, cloth, gilt edges.	0	12
names' Elements of Criticism, eleventh edition, with the		
Author's last Corrections and Additions, Svo. cloth.	5	-0
Locke's Essay on the Human Understanding, new edition,		- 1
8vo. cloth,	5	0
Ainsworth's Latin and English and English and Latin Dic-		- 1
tionary, by Thomas Morell, D. D. Stereotype Edition,		- 1
carefully revised, corrected and compared with the best		(
Authorities; to which are now added a complete List of Latin Abbreviations, and other important and useful Ta-		
bles, by William Duncan, E. C. P. 8vo. cloth,	G	οĘ
Alison's History of Europe from the commencement of the		Ϋ́Ì
French Revolution in 1789 to the Restoration of the		- 1
Bourbons in 1815, sixth edition, 10 vols. 8vo. cloth,	90	oʻ
ATLASES,—		. 1
Arrowsmith's New General Atlas, with Fifty-four Maps		35
engraved by Sidney Hall, from Drawings made especi-		
ally for this work, royal quarto, neatly half bound. co-		.1
loured, (Publishing price £2. 12×. 6d.)	12	0
New Edinburgh School Atlas, consisting of 35 Maps of		7
the different Empires, Kingdoms and States through-	^	~
out the World, 4to. half bound,	9	ų
New General Atlas, exhibiting the various Geographical Features and Kingdoms of the World in 31 Maps,		
adapted to Ewing's and Modern Geographics, 4to. half		
bound,	6	ď
Tassin's School Atlas, 8vo. half cloth,	3	Ð
Berquin's Children's Friend : consisting of a variety of		- 1
Moral and Interesting Stories, for the Amusement and		1
Instruction of Youth, with Illustrations, 32mo. cloth, gilt,	1	9
Bonnycastle's Arithmetic, 12mo. bound, (3s. 6d.)		19
Key to ditto, 12mo. bound, (4s. 6d.)	2	7
Bonnycastle's Introduction to Algebra, enlarged and im-	2	•••
proved by Tyson, 12mo. bound, (4s.) Key to ditto, 12mo. bound, (4s. 6d.)	$\tilde{2}$	
110) 10 MINO, 12110, DOULLO, (43, Ou.)	~	

Bonnycastle's Introduction to Practical Geometry and Men-		
· suration, enlarged and improved by Tyson, with an Ap-		
	3	-8
pendix, 12mo. bound,	2	8
Book of Notable things, comprising Biographies, Humor-		
ous and Instructive Anecdotes, Essays, Historical Facts,		
calculated to afford innocent amusement or useful instruc-		
tion, with curious and rare Receipts, 8vo	4	O
This work contains a fund of amusing, instructive and use	ful	in-
formation.		
look of Fun; or, Laugh and Learn, for Boys and Girls,		
with plates, 2 vols, 12mo, cloth, (10s.)	4	0
Boy's Book of Science; a familiar introduction to the Prin-		
ciples of Natural Philosophy, comprising Mechanics, Hy-		
drostatics, Hydraulics, Pneumatics, Acoustics, Pyrono-		
mics, Electricity, Galvanism, Magnetism, Optics, &c.		
square cloth, \dots (7s. 6d.)	3	8
Boy's Own Book: a complete Encyclopædia of all the Di-		
versions, Athletic, Scientific, and Recreative, of Boyhood		
and Youth, 16mo. fancy boards.	3	8
Cabinet, (The) a series of Essays, Moral and Literary, 2 vols.		
Svo. cloth,	6	O
Campbell's Philosophy of Rhetoric, eleventh edition, 8vo.		
	4	8
cloth, (Oxford) (9s.) Cooke's Letter Writer, Illustrated Edition, with Letters		
from the Writings of Bishop Heber, Robert Hall, Han-		
nah More, Dr. Johnson, Sir Walter Scott, Kirke White,		
Cowper, &c. 32mo. cloth,	1	4
Cowper's Poenis, 18mo. cloth,	2	0
Dodd's Beauties of Shakspeare, with a General Index, a new		
edition, Ismo. cloth,	2	IJ
Dodd's Beauties of History; or, Pictures of Virtue and		
Vice, 32mo. cloth, gilt edges.	1	0
Dolby's Shaksperian Dictionary, forming a General Index		
to all the popular expressions, and most striking passages		
in the Works of Shakspeare, from a few words to Fifty		
or more Lines, an appropriate Synonym being affixed to		
each extract, with a reference to the context. The whole		
designed to introduce the Beauties of Shakspeare in the		
familiar intercourse of Society, 12mo. cloth, (7s. 6d.)	3	12
Dryden's Virgil, 18mo, cloth,	2	O
Enfield's Speaker; or, Miscellaneous Pieces, selected from	_	
the best English Writers, and disposed under proper		
heads, with a view to facilitate the Improvement of Youth		
in Reading and Speaking: to which is prefixed an Essay		
on Elocution, 12mo. roan,	2	0
"Enfield's Speaker is the best selection for practice, in the E	no!	ı.h
language. The pieces in that compilation have this peculiar charm	abo)1 e
those in every other, that they never tire; and almost all of them ar	e e	ni-

nently adapted for exercises in reading. In other works, the selection have been made with a primary reference either to taste or institute in this, while both these objects are combined, the editor's chief pears to have been, to collect those pieces which would prove best the purposes of elocution. In this view, the work is in my judgment	ructi Rim Suite	ap-
out a parallel."—Practical Essay on Intellectual Education, by Wim Franklin's Life and Essays, Humorous, Moral, and Literary, 18mo, cloth,	. Jaq 1	ues à
It has been well observed of Franklin, that his whole hecture against idleness and extravagance, and in favor of industry gality; no biography, therefore, can with so much advantage be in	and t	as a. fru-
subject of study by the Young. Franklin in his Memoirs, tells us learned the art of constructing sentences and improving his style of which he did by the perusal of some of the most elegantly written F	how writi issay	be ing, s of
Addison in the Spectater, and by afterwards endeavouring to write d same Essays, in his own language, from memory and an exection of tellect. This we conceive to have been an excellent plan of impic in the art of writing English correctly, and minitely superior to the:	the even	m-
dry rules. Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, 4 vols. 8vo. cloth,	•	0
Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, abridged by the late Rev. C. Hereford, with Maps and General In-		0
dex, 18mo. neat cloth, Ditto, per dozen. "This edition is valuable for those who have neither time clination to wade through Gibbon's voluminous work: the brilliant	32 nor	U in-
his history, where the decay of an empire appears as visible as tha human frame, is fully preserved: whatever remarks of Gibbon offer to religion have been carefully expunged while his cloquence has a no curtailment."—Literary Gazette.	t of a offer	ine
Goldsmith's Grammar of Geography, for the use of Schools and Young Persons, with Maps, &c. 18mo. roan, Hooke's Roman History, from the Building of Rome to the	2	
Commonwealth, with Maps and Engravings, 3 vols. 8vo. cl. Johnson's Diamond Dictionary, to which is added a Dictionary of Quotations, Mottos of the Nobility, Classical	12	C
Mythology, &c., 32mo. neatly bound in embossed roan, gilt edges, Johnson's Dictionary of the English Language: imperial,	I	4
8vo. cloth, lettered, • (£2 2s.) Kames' Elements of Criticism, eleventh edition, with the Author's last Corrections and Additions, 8vo. cloth, (10s.)	18	d ij
Kenny's Grammatical Spelling Assistant, on the plan of C: penter, 12mo bound, (1s. 6d.) Knights' Store of Knowledge for all Readers, small folio,	0	13
cloth, (6s. 6d.) Langhorne's Plutarch's Lives, with Notes, Critical and Historical, with numerous Portraits, a new edition, carefully	3;	4
revised and corrected, 8vo. cloth, (14s.) Looking-Glass for the Mind; or, Intellectual Mirror, being an elegant Collection of the most delightful little stories	.6	0
and interesting Tales, 18mo. cloth,	ļ	4

•Lempriere's Classical Dictionary, revised and considerably		
enlarged by the Rev. T. Smith, Cambridge, 8vo. cloth,	6	0
Locke's Philosophical Works, containing the Conduct of		
the Understanding, Essay on the Human Understanding,		
Natural Philosophy, &c. royal 8vo. cloth, (14s.)	7	C
Mackenzie's Natural History of all the most remarkable	•	•
Marketine's Natural History of all the most remarkable		
Quadrupeds, Birds, Fishes, Reptiles and Insects, abridg-		
ed, from Buffon, Goldsmith, Cuvier and other Eminent		
Naturalists, upwards of one hundred beautiful Cuts,		
12mo, cloth,	3	C
Mangnall's Historical and Miscellaneous Questions, cor-		
rected, enlarged, and continued to the present time, by		
	2	12
Wright, 12mo, neatly bound, Martin's Holiday Book; or, "Educator," being a Treasury	~	-~
of Knowledge: with two hundred illustrations, 16mo. cl.	.,	10
	3	12
Materials for Thinking, extracted from the Works of the		
Learned of all Ages, 12mo, cloth,	ι	12
Learned of all Ages, 12mo, cloth, Mavor's English Spelling Book, 12mo, bound,	O	8
Ditto ditto, a superior edition,	U	12
Ditto ditto, a superior edition, Murray's English Grammar, new edition, 12mo. neatly		
bound (4s.)	2	0
	ĩ	4
bound, (4s.)	-	_
Key to ditto, 12mo. cloth, (2s. 6d.)	1	4
Murray's abridged Grammar, with an Appendix; contain-		
ing Exercises in Orthography, in Parsing, in Syntax,		
and in Punctuation: designed for the Younger Classes		
of Learners, a new edition, 18mo, sheep,	0	7
Maunder's Treasury of Knowledge, new edition, 12mo. cl.	6	Ó
Geographical and Historical Treasury,	6	ŏ
43 - 1 de 4 44 - 10 m	6	
Scientific Treasury,		0
Pele's Lectures on English Poetry, foolscap, 8vo. cl. (5s.)	2	0
Mey's Moral and Political Philosophy, 24mo. cl. (4s. 6d.)	2	0
Works, complete in 1 vol. 8vo. cloth (12s.)	4	8
Paul and Virginia; and Elizabeth, 32mo. cloth, gilt		
edges, (2s.)	1	0
Ditto, with Engravings. 18mo. cloth, gilt edges,	1	8
Peter Parley's Popular Works, 14 vols. in a Mahogany Book	-	Ŭ
* Case, Glass Door, Lock and Key,	50	Δ
cket Book of Anecdotes of Literary Men and Literature,	JU	0
cket book of Anecdotes of Literary Men and Literature,	_	_
y one of the Profession, 32mo. cloth.	0	8
ket Manual of Manners; or, Rules of Conduct for both		
rexes, 32mo. stiff cloth,	0	10
ocket Lacon, comprising nearly one thousand Extracts	. '>	
from the best Authors, selected by John Taylor, third edi-		
	2	0
Proceed Wisdom, or the Manual of Life, being the	ت	v
Reactical Wisdom; or, the Manual of Life; being the Counsels of Eminent Men to their Children, 12mo. half		
Counsels of Emment Men to their Unitaren, 12mo, half	_	• -
cloth,	3	12
Present for an Apprentice; to which is added, Franklin's		
Way to Wealth, by a Citizen of London, square 16mo	2	0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	•

Fretty Stories for Chadren, with 100 engravings, square	
cloth $(2s.)$	1
Reid's Essays on the Intellectual Powers of Man; to which	_
is annexed an Analysis of Aristotle's Logic, Svo. cloth, Essays on the Active Powers of the Human Mind.	7
new edition by Wright, 8vo. cloth,	7
Rudiments of English Composition; designed as a	4
Practical Introduction to Correctness and perspicuity of	
Writing and to the study of Criticism; with copious Exer-	
cises, 18mo. cloth,	1
Robertson's Works, to which is prefixed an Account of his	
Life and Writings, by Dugald Stewart, and a Portrait, a	
	12
Richardson's English Dictionary, 2 vols. 4to (£5-5s.)	
Robinson Crusoe, with Illustrations, 24mo. cloth,	I.
Russel's Modern Europe, to the Accession of Queen Victo-	. :
ria, 4 vols. Svo. cloth, Scenes of Modern Travel and Anventure; a Selection of	¥.
Interesting Extracts from Celebrated Travellers, foolscap	i.
0 1-41 (1.)	1.
Scenes and Stories from European History, ditto ditto, (4s.)	2
Self-formation, intended as a Guide for the Intellect through	~
difficulties to success, 2 vols. post 8vo (16s)	6
Stewart's (Dugald) Philosophy of the Human Mind, new	·
edition, with the Latin Quotations translated by the Rev.	,
G. N. Wright, 8vo. cloth,	
Stewart's Compendium of Modern Geography, illustrated	
by ten Maps, 12mo. roan,	
Taylor's Manual of Laconics; or, many things for many	
minds; selected from a great variety of Authors, 18mo, cloth,	۷,
Telemachus, translated by Hawkesworth, with a Life of the Author, and Remarks on Epic Poetry, and on the excel-	1
lence of Telemachus, 18mo. cloth,	٠,,
Telescope's (Tom) Newtonian Philosophy, and Natural His-	٠,
tors in Canaval evaluined and illustrated by Familiar Ob-	
jects, in a series of Entertaining Lectures, 16mo. cloth,	2,
Thomson's Seasons and Castle of Indolence; with the Life	
of the Author, by Samuel Johnson, foolscap 8vo (6s.)	3
Ditto, ditto, 24mo. cloth, gilt edges,	Ę
Tiler's Natural History of Dirds, Deasts, and Fishes, 12110.	
Olothi, O. Altaboundary	(
Ditto ditto, small edition, with Engravings,	ţ
I HOLIHOIT & LITSUST AT THE THE TANK A THE T	ì
Walker's Critical Pronouncing Dictionary, and Expositor	-
of the English Language; corrected and enlarged, with	
upwards of 3,000 Words, by the Rev. John Davis, A.M.	
London, 1844, 8vo. cloth,	3
Ditto ditto, per dozen.	Q.

Vebster's English Dictionary, by Barker, 2 vols. 4to	36	0	
Valkinghame's Tutor's Assistant, 12mo, bound, (2s.)	1	0	
"cy to ditto, (3s.) Watts' Logic, 24mo. cloth,	1	8	
Watts' Logic, 24mo. cloth, watts on the Mind, 24mo. cloth, Youth's Holiday Book, with Illustrations, 12mo. cloth, gilt.	1	8	
Watts on the Mind. 24mo, cloth,	1	4	
Youth's Holiday Book, with Illustrations, 12mo. cloth,			
gilt,	2	0	
Young Man's Own Book, a Manual of Politeness, Intellec-			
tual Improvement and Moral Deportment, 24mo. cloth	1	4	
'orrall's Diamond Edition of Johnson's Dictionary with	_	_	
Walker's Pronunciation of all the difficult or doubtful			
Words, and Marks to show where to double the Consonant			
in the Participle, to which is added Quotations and Phra-			
ses in frequent use, &c. &c. 32mo. roan,	2	0	
vier's Animal Kingdom, arranged according to its or-	-	v	
mization, forming the basis for a Natural History of			
nimals and an Introduction to Comparative Anatomy.			
10 illustrations, royal 8vo. cloth,	11	0	
on's Book of Experiments with Introductory Observa-	**	v	
tions on each Science, and upwards of 300 Experiments,		۵	
with numerous wood cuts, 12mo. cloth,	2	0	
lowers of Fable, selected from the best sources, second			
edition, with one hundred and eighty engravings on		_	
ood, 18mo. cloth,	2	0	
is from Living Poets, 32mo. cloth, gift,	. 1	0	
is from American Poets, 32mo. gilt,	1	0	
smith's History of England: from the Invasion of Ju-			
s Casar to the Death of George the Second; conti-			
n ed to the Marriage of the Queen, 1840, with Questions			
for Examination, by W. S. Kenny, Esq. 12mo. roan,	2	0	
History of the Earth and Animated Nature,			
with a Portrait of the Author, and numerous Plates, 8vo.			•
roth, gilt edges, *ervey's Meditations and Contemplations, with a Sketch	8	0	
*ervey's Meditations and Contemplations, with a Sketch			
of the Author's Life, 18mo. cloth,	2	0	
se and Adventures of Robinson Crusoe, who lived twen-			
y-eight years on an uninhabited Island, with an Account			
of his Deliverance, with Illustrations, 18mo. cloth,	1	12	
mual of Politeness and Etiquette, containing hints for			
he improvement of the manners and appearance of both			
exes, by a Barrister of the Middle Temple, 32mo. cloth,			
; ilt edges,	1	0	
etical Works of Henry Kirke White, with a Memoir of		•	
the Author, royal 32mo. cloth, gilt edges,	1	0-	
	_	-	
PARADISE LOST, WITH WOTES.			1
Paradise Lost a Poem in Twelve Rooks by John Milt	Λn	Δ.	

Paradise Lost, a Poem in Twelve Books, by John Milton. A w Edition, with an abridgment of the learned and copious Notes elected by Bishop Newton, together with additions, and a Sketch the Life and Writings of the Author. For the use of Schools, 2. cloth, 3 Rs. per copy, or 32 Rs. per dozen.

THE WRITING	G COMPANION.
Containing a Penknife, an	ever-nointed German Silver
Pencil case, a Wafer Stamp	o, and a Card of Steel Pens
with Holder	1 0
THE PENN'S Twenty-seven vols. cloth,	100
I wenty-seven vois. crom,	100 0
Reeves and Sons' Pe	ermanent Water Colors.
	T EMINENT ARTISTS FOR THEIR
	AND EDEEDON OF WORKING
•	in the second se
rs. a	s. rs. ass.
Atnwerp Blue, 1	0 Naples Yellow, 0 12;
Bistre 0	S Orango A St
Black O	8 Permanent Green, 0 💵
Blue Verditer 0	8 Permanent White 0 89
Brown Pink,	0 Prussian Blue, 2 8
Burnt Sienna, 0 1	0 Prussian Blue, 2 89 2 Prussian Green, 1 10
Burnt Umber 9	8 Purple 0 &
Burnt Ochre 0	8 Raw Sienna O St
Carmine 3	8 Raw Umber, 0 12
Burnt Ochre 0 Carmine, 3 Chrome Yellow, No. 1 1	0 Red Chalk,
Chrome Yellow, No. 2, . 1	O Roman Ochre O S
	0 Royal Blue, 3 0
Cobalt 1	8 San Green 0 10 V
Cobalt, 1 Coburg Yellow, 0 Flake White, 1	8 Scarlet Lake, 1 8
Flake White 1	⁰ Sepia, 1 0
Gallstone 3	0 Sepia, 1 0 0 Vandyke Brown, 1 0 0 Venetian Red, 0 1 2 Vermillion, 0 1
Gamboge 1	0 Venetian Red, 0 19
Gallstone, 3 Gamboge, 1 Green Bice, 0 1	2 Vermillion, 0.14
Green Verditer, 0	2 Vermillion, 0, 16 8 Yellow Ochre, 0*12
Indian Red, 0 15	Ultramarine, 7 6
Indian Red, 0 1:	
Indigo 0 1	2
Indigo, 0 1 Intense Blue, 1	Roger's Prepared Water
King's Yellow, 0 1	Malana
) IN HALF CAKES.
Lamp Black, 0	Carmine, 1 0
Light Prussian Blue, . 0 19	
Tight Rad 1 (Cobalt 0 🚪
Madder Brown, 0	8 Italian Pink 0
Madder Lake, 0	8 Italian Pink, 0 8 Naples Yellow, 0
Madder Purple, 0	Grimson Lake, 0
	Sepia, 0
Reeves and Sons' Porcelain Siz	
TACALOR WINE DOLLO T ALCOHOLIS (A)	

A COMPLETE CATALOGUE OF BOOKS, STATE TIONERY, DRAWING MATERIALS, &c. no be had by applying to Messrs. D'Rozario and Co.